



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.





16

RESULTATE
DER
RECHNUNGS-AUFGABEN IN DER SAMMLUNG
VON
AUFGABEN UND BEISPIELEN
AUS DER
TRIGONOMETRIE UND STEREOMETRIE

HERAUSGEGEBEN
VON
DR. FRIEDRICH REIDT,
OBERLEHRER AM GYMNASIUM UND DER HÖHEREN BÜRGERSCHULE IN HAMM.

I. THEIL: TRIGONOMETRIE.

ZWEITE AUFLAGE.



LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1878.

Mathematics

QA

537

.R361

1878

Mathematics

Bemen

4-4-24

10207

2pts. Trigonometrische Aufgaben.

A. Goniometrie.

§. 1.

1. $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{4}$, 3, $3\frac{3}{4}$ und $1\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, 5, $6\frac{1}{4}$. 2. $7\frac{1}{2}$. 3. 4:5, 3:5, 4:3 etc. 4. $\sin \beta = \cos \alpha$, $\cos \beta = \sin \alpha$, $\tan \beta = \cot \alpha$, etc.

5.	sinus	cosinus	tangens	cotang.	secans	cosecans
a)	$\frac{1}{17}$ oder 0,47059	$\frac{1}{17}$ 0,88235	$\frac{1}{17}$ 0,53333	$\frac{1}{17}$ 1,87500	$\frac{1}{17}$ 1,13333	$\frac{1}{17}$ 2,12500
b)	$\frac{1}{17}$ 0,97561	$\frac{1}{17}$ 0,21951	$\frac{1}{17}$ 4,44444	$\frac{1}{17}$ 0,22500	$\frac{1}{17}$ 4,55556	$\frac{1}{17}$ 1,02500
c)	0,52830	0,84906	0,62222	1,60714	1,17778	1,89286
d)	$\frac{1}{17}$ 0,24615	$\frac{1}{17}$ 0,96923	$\frac{1}{17}$ 0,25397	$\frac{1}{17}$ 3,93750	$\frac{1}{17}$ 1,03175	$\frac{1}{17}$ 4,06250
e)	$\frac{1}{17}$ 0,89888	$\frac{1}{17}$ 0,43820	$\frac{1}{17}$ 2,05128	$\frac{1}{17}$ 0,48750	$\frac{1}{17}$ 2,28205	$\frac{1}{17}$ 1,11250
f)	0,86154	0,50769	1,69697	0,58929	1,96970	1,16071
g)	0,99792	0,06445	15,48387	0,06458	15,51613	1,00208
h)	$\frac{1}{17}$ 0,87404	$\frac{1}{17}$ 0,48586	$\frac{1}{17}$ 1,79894	$\frac{1}{17}$ 0,55588	$\frac{1}{17}$ 2,05820	$\frac{1}{17}$ 1,14412
i)	0,29340	0,95599	0,30691	3,25833	1,04604	3,40833
k)	0,15898	0,98728	0,16103	6,21000	1,01288	6,29000
l)	0,74844	0,66320	1,12853	0,88611	1,50784	1,33611
m)	$\frac{1}{17}$ 0,12451	$\frac{1}{17}$ 0,99222	$\frac{1}{17}$ 0,12549	$\frac{1}{17}$ 7,96875	$\frac{1}{17}$ 1,00784	$\frac{1}{17}$ 8,03125
n)	$\frac{1}{17}$ 0,62769	$\frac{1}{17}$ 0,77846	$\frac{1}{17}$ 0,80632	$\frac{1}{17}$ 1,24020	$\frac{1}{17}$ 1,28458	$\frac{1}{17}$ 1,59314
o)	$\frac{1}{17}$ 0,29340	$\frac{1}{17}$ 0,95599	$\frac{1}{17}$ 0,30691	$\frac{1}{17}$ 3,25833	$\frac{1}{17}$ 1,04604	$\frac{1}{17}$ 3,40833
p)	$\frac{1}{17}$ 0,92308	$\frac{1}{17}$ 0,38462	$\frac{1}{17}$ 2,40000	$\frac{1}{17}$ 0,41667	$\frac{1}{17}$ 2,60000	$\frac{1}{17}$ 1,08333
q)	$\frac{1}{17}$ 0,84453	$\frac{1}{17}$ 0,53551	$\frac{1}{17}$ 1,57706	$\frac{1}{17}$ 0,63409	$\frac{1}{17}$ 1,86738	$\frac{1}{17}$ 1,18409

Es muss $a^2 + b^2 = c^2$ sein, was hier auch überall der Fall ist. H. K. A.

6. a) $\frac{p}{r}, \frac{q}{r}, \frac{p}{q}, \frac{q}{p}, \frac{r}{q}, \frac{r}{p}$. b) $\frac{q}{r}, \frac{q}{p}, \frac{p}{r}, \frac{r}{p}, \frac{p}{q}, \frac{r}{q}$. c) $\frac{q}{s}, \frac{q}{p}, \frac{p}{s}, \frac{s}{p}, \frac{p}{q}, \frac{s}{q}$. d) $\frac{ps}{qr}, \frac{qs}{r^2}, \frac{pr}{q^2}, \frac{q^2}{pr}, \frac{r^2}{qs}, \frac{rq}{ps}$. e) $\frac{m(m+n)}{p(p+q)}, \frac{m(n+p)}{q(p+q)}, \frac{q(m+n)}{p(n+p)}, \frac{p(n+p)}{q(m+n)}$, u. s. w. f) $\frac{ms}{qr}, \frac{mp}{nq}, \frac{ns}{pr}, \frac{pr}{ns}$. g) $\frac{2mn}{m^2+n^2}, \frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}, \frac{2mn}{m^2-n^2}$. h) $\frac{2mn}{m^2+n^2}, \frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}, \frac{2mn}{m^2-n^2}$. i) $\frac{m^2-n^2}{\sqrt{2(m^4+n^4)}}, \frac{m^2+n^2}{\sqrt{2(m^4+n^4)}}, \frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}, \frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}$. k) $\frac{m-n}{m+n}, \frac{2\sqrt{mn}}{m+n}, \frac{m-n}{2\sqrt{mn}}, \frac{2\sqrt{mn}}{m-n}$. l) $\frac{p-q}{p+q}, \frac{2\sqrt{pq}}{p+q}, \frac{p-q}{2\sqrt{pq}}, \frac{2\sqrt{pq}}{p-q}$. m) $\left(\frac{m-n}{m+n}\right)^2, \frac{2\sqrt{mn}}{(m+n)^2}, \frac{(m-n)^2}{2\sqrt{mn}}, \frac{2\sqrt{mn}}{(m-n)^2}$. Frage, wie vorher.

7. a) $c = 6,29; \frac{190}{199}, \frac{621}{629}, \frac{190}{621}, \frac{621}{190}$. b) $c = 4,93; \frac{493}{155}, \frac{155}{188}, \frac{155}{493}$. c) $c = 46,1; a : b : c = 380 : 261 : 461$. d) $c = 8,81; a : b : c = 800 : 369 : 881$. e) $b = 64,6; 36 : 323 : 325$. f) $b = 3,01; 900 : 301 : 949$. g) $b = 0,49; 1200 : 49 : 1201$. h) $b = 31\frac{7}{8}; 32 : 255 : 257$. i) $a = 39,9; 399 : 40 : 401$. k) $a = 4,29; 429 : 700 : 821$. l) $a = 4,81; 481 : 600 : 769$.

8. a) $c = m + n; a : b : c = \sqrt{m^2 + n^2} : \sqrt{2mn} : (m + n)$.

b) $c = p - q; \sqrt{p^2 - 2pq} : q : (p - q)$.

c) $b = \sqrt{q(p+q)}; \sqrt{\frac{p}{p+q}}, \sqrt{\frac{q}{p+q}}, \sqrt{\frac{p}{q}}$.

d) $c = \sqrt{2(p^2 + q^2)}; (p - q) : (p + q) : \sqrt{2(p^2 + q^2)}$.

e) $b = (m + n)\sqrt{m^2 - n^2}; \frac{n}{m}, \frac{\sqrt{m^2 - n^2}}{m}, \frac{n}{\sqrt{m^2 - n^2}}$.

f) $a = \frac{p}{qr}\sqrt{q^2 - r^2}; \frac{\sqrt{q^2 - r^2}}{q}, \frac{r}{q}, \frac{\sqrt{q^2 - r^2}}{r}$.

g) $a = \frac{p}{qr}\sqrt{r^4 - q^4}; \frac{\sqrt{r^4 - q^4}}{r^2}, \frac{q^2}{r^2}, \frac{\sqrt{r^4 - q^4}}{q^2}$.

h) $a = n(m - n); n : \sqrt{m^2 - n^2} : m$.

i) $b = pq\sqrt{2}$.

9. $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2} = 0,70711; \tan 45^\circ = \cot 45^\circ = 1$.

$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0,5; \cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} = 0,86603;$

$$\operatorname{tang} 30^\circ = \operatorname{cotg} 60^\circ = \frac{1}{3} \sqrt{3} = 0,57735; \operatorname{cotg} 30^\circ = \operatorname{tang} 60^\circ = \sqrt{3} = 1,73205.$$

$$\sin 18^\circ = \cos 72^\circ = \frac{1}{4} (\sqrt{5} - 1) = 0,30902; \cos 18^\circ = \sin 72^\circ = \frac{1}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = 0,95106; \operatorname{tang} 18^\circ = \operatorname{cotg} 72^\circ = \sqrt{\frac{5 - 2\sqrt{5}}{5}} = 0,32492; \operatorname{cotg} 18^\circ = \operatorname{tang} 72^\circ = \sqrt{5 + 2\sqrt{5}} = 3,07768.$$

$$10. \text{ a) } \sin \alpha = \frac{2}{3} \sqrt{5} = 0,89443; \cos \alpha = \frac{1}{3} \sqrt{5} = 0,44721; \operatorname{tang} \alpha = 2; \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{2}.$$

$$\text{ b) } \sin \alpha = \frac{2}{3} = 0,66667; \cos \alpha = \frac{1}{3} \sqrt{5} = 0,74536; \operatorname{tang} \alpha = \frac{2}{3} \sqrt{5} = 0,89443; \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{2} \sqrt{5} = 1,11803.$$

$$\text{ c) } \sin \alpha = \frac{1}{3} (5 + \sqrt{7}) = 0,95572; \cos \alpha = \frac{1}{3} (5 - \sqrt{7}) = 0,29428; \operatorname{tang} \alpha = \frac{1}{3} (16 + 5\sqrt{7}) = 3,24764; \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{3} (16 - 5\sqrt{7}) = 0,30792.$$

$$\text{ d) } \sin \alpha = \frac{\sqrt{2m^2 - 1} + 1}{2m}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{2m^2 - 1} - 1}{2m}, \operatorname{tang} \alpha = \frac{m^2 + \sqrt{2m^2 - 1}}{m^2 - 1}, \operatorname{cotg} \alpha = \frac{m^2 - \sqrt{2m^2 - 1}}{m^2 - 1}.$$

$$11. \text{ a) } \sin \alpha = \sqrt{a^2 - h^2} : a, \cos \alpha = h : a, \operatorname{tang} \alpha = \sqrt{a^2 - h^2} : h, \operatorname{cotg} \alpha = h : \sqrt{a^2 - h^2}.$$

$$\text{ b) } \sin \alpha = \sqrt{p : (p + q)}, \cos \alpha = \sqrt{q : (p + q)}, \operatorname{tang} \alpha = \sqrt{p : q}, \operatorname{cotg} \alpha = \sqrt{q : p}.$$

$$\text{ c) } \sin \alpha = \frac{\sqrt{4a^2 + q^2} - q}{2a}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{\frac{1}{2}q(\sqrt{4a^2 + q^2} - q)}}{a}, \text{ u. s. w.}$$

$$\text{ d) } \sin \alpha = \frac{\sqrt{c^2 + 4F} + \sqrt{c^2 - 4F}}{2c}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{c^2 + 4F} - \sqrt{c^2 - 4F}}{2c}, \operatorname{tang} \alpha = \frac{c^2 + \sqrt{c^4 - 16F^2}}{4F}, \operatorname{cotg} \alpha = \frac{c^2 - \sqrt{c^4 - 16F^2}}{4F}.$$

$$12. \text{ a) } 12,3. \text{ b) } 1,54. \text{ c) } 9. \text{ d) } 0,03804. \text{ e) } 128,38384. \text{ f) } 3,22581.$$

$$13. \text{ a) } a = 6, b = 4. \text{ 14. a) } a = 1,05, b = 1, F = 0,525. \text{ b) } c = 25, b = 7, F = 84. \text{ c) } c = 125, a = 44, F = 2574.$$

$$18. \text{ a) } 0,087; \text{ b) } 0,996; \text{ a) } 0,176; \text{ b) } 3,732.$$

§. 2.

5. 45° . 6. $\frac{180^\circ}{n}$. 7. Vergl. §. 1, 9. 12. $r \cdot a$. 13. $a = mc$;
 $b = nc$. 14. a) $S = r \cdot s$; b) $\frac{r^2 \pi \alpha}{360^\circ} - \frac{1}{4} r^2 s \sqrt{4 - s^2}$, wenn
 s die zugehörige Sehne der Tafel bedeutet. 15. $\sin \frac{1}{2} \alpha =$
 $\frac{1}{2}$ Sehne α . 16. $\sin \frac{1}{2} \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

§. 3.

1. Sinus, Tangente und Secante.

2. Sinus und Cosecante, Tangente und Cotangente, Cosinus und Secante.

3. Cosinus und Secante.

4. 4. 5. 2, im ersten und vierten. 6. Für $\sin \alpha$ zwei, sonst einer.

7. Sinus und Cosecante zweideutig, die übrigen Functionen eindeutig.

8. Cosinus, Tangente, Cotangente und Secante für stumpfe Winkel.

9. a) 0, b) 0, c) $(a - b)^2$, d) 0, e) $a^2 - b^2 + 4ab$,
 f) $(m - n)^2$, g) ∞ , h) 0, i) $2 \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}$, k) $-xy$, l) $(a + b)^3$,
 m) 0, n) ab , o) b .

10. 1, 0, 0, ∞ , 1, ∞ .

11.

1. $\sin 8^\circ = \cos 82^\circ$

6. $\sin 35^\circ = \cos 55^\circ$

2. $-\cos 80^\circ = -\sin 10^\circ$

7. $-\tan 81^\circ = -\cotg 9^\circ$

3. $-\tan 55^\circ = -\cotg 35^\circ$

8. $-\sec 80^\circ = -\operatorname{cosec} 10^\circ$

4. $-\cotg 85^\circ = -\tan 5^\circ$

9. $\operatorname{cosec} 23^\circ = \sec 67^\circ$

5. $-\cos 1^\circ = -\sin 89^\circ$

10. $-\cotg 89^\circ = -\tan 1^\circ$

11. $-\tan 65^\circ 2' = -\cotg 24^\circ 58'$

12. $-\cos 47.49 = -\sin 42.11$

13. $\operatorname{cosec} 80.31 = \sec 9.29$

14. $\sin 44.48 = \cos 45.12$

15. $-\cotg 40.43 = -\tan 49.17$

16. $\sin 35^\circ 50' 27'' = \cos 54^\circ 9' 33''$

17. $-\tan 27.11.53 = -\cotg 62.48.7$

18. — cotg 10. 38. 12 = — tg 79. 21. 48
 19. — cos 75. 8. 49 = — sin 14. 51. 11
 20. sin 57. 37. 43 = cos 32. 22. 17
 21. — cos 83° 37' 48",6 = — sin 6° 22' 11",4
 22. — tang 83. 34. 59,3 = — cotg 6. 25. 0,7
 23. sin 46. 10. 38,2 = cos 43. 49. 21,8
 24. — cotg 58. 58. 12,4 = — tg 31. 1. 47,6
 25. — cos 52. 0. 0,1 = — sin 37. 59. 59,9
 26. — cos 14° = — sin 76° 29. — sin 24° 12' = — cos 65° 48'
 27. — tg 60° = — cotg 30° 30. cotg 84. 39 = tg 5. 21
 28. — cosec 89° = — sec 1° 31. — sec 65. 19 = — cosec 24. 41
 32. sec 15° 41' 28" = cosec 74° 18' 32
 33. tg 32. 48. 44 = cotg 57. 11. 16
 34. cos 85. 50. 8 = sin 4. 9. 52
 35. — sin 76° 10' 28" = — cos 13° 49' 32"
 36. — cosec 1. 1. 1 = — sec 88. 58. 59
 37. tang 89. 15. 15 = cotg 0. 44. 45
 38. — cotg 86° 8' 40",6 = — tang 3° 51' 19",4
 39. — cos 15. 33. 7,7 = — sin 74. 26. 52,3
 40. — sin 9. 49. 38,1 = — cos 80. 10. 21,9.

12. a) $(a - b) \sin \alpha$; b) $m \sin \alpha \cos \alpha$; c) $(a - b) \cotg \alpha - (a + b) \tang \alpha$; d) $a^2 + b^2 + 2ab \cos \gamma$; e) $\frac{a \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha}$; f) $-\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$; g) $\cos \alpha \cdot \sin \beta - \sin \alpha \cdot \cos \beta$; h) $\tang \alpha - 2 \tang \beta$; i) $\frac{a \sin \alpha - b \cos \alpha}{(b - a) \cotg \alpha}$; k) $\frac{m^3 \cotg \alpha}{p^2 q \cos \alpha} - \frac{p q^2 \cos \alpha}{m^3 \tang \alpha}$; l) n ; m) $2b^2$; n) 0; o) $\frac{\cotg \alpha}{\tang \alpha}$; p) — 2; q) $-\sin \alpha$; r) $\cos \alpha - \frac{\tang \alpha}{\cos \alpha}$.

14. a) 168°, b) 96°, c) 142°, d) 334°, e) 225°, f) 252°, g) 240°, h) 271°, i) 349°, k) 329° 51', l) 180° — α .

15. Im a) dritten, b) zweiten, c) dritten.

16. a) 22° 30', b) m ; n , c) m .

17. Positiv für 0° bis 135° und 315° bis 360°.

18. Ebenso für 45° bis 225°.

19. Ebenso für 45° — 135° und 225° — 315°.

20. Ebenso für 0° — 90°, 180° — 270°, bezw. 0° — 90°, 180° — 270°, bezw. 45° — 90°, 135° — 180°, 225° — 270°, 315° — 360°, bezw. 0° — 90°, 270° — 360°.

§. 4.

1. Die gesuchten Functionen sind in der Reihenfolge sin, cos, tang, cotg bezüglich gleich: a) 0,6; 1,333..., 0,75. b) $\frac{1}{12} = 0,92308$, $\frac{1}{13} = 0,38462$, $\frac{1}{12} = 0,41667$. c) 0,96; $\frac{2}{3} = 3,42857$; $\frac{1}{4} = 0,29167$. d) $\frac{2}{9} = 0,68966$, $\frac{2}{11} = 0,72414$, $\frac{2}{11} = 0,95238$. e) $\frac{2}{101}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{2}{9} = 4\frac{2}{9}$. f) $\frac{2}{21}$, $\frac{6}{21}$, $3\frac{1}{3}$. g) $\frac{4}{11}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{6}{10}$. h) $\frac{2}{101}$, $9\frac{2}{9}$, $\frac{4}{9}$. i) $\frac{1}{14}$, $\frac{1}{15}$, $\frac{1}{14}$. k) $\frac{3}{14}$, $\frac{3}{14}$.

2. a) $\pm 0,936$; $\mp 0,37607$; $\mp 2,65909$. b) $\pm 0,97161$; $\mp 0,23659$; $-0,24351$. c) $\frac{2}{3}\sqrt{6} = \pm 0,97980$; $\mp 4,89898$; $\mp 0,20412$. d) $\frac{1}{4}\sqrt{7} = \pm 0,66144$; $\pm 1,13389$; $\pm 0,88192$. e) $\frac{1}{3}\sqrt{5} = \pm 0,74536$; $\pm 1,11803$; $\pm 0,89443$. f) $\frac{2}{3}\sqrt{5} = \pm 0,89443$; $\pm 0,44721$; 2.

3. a) $1 : \sqrt{1+m^2}$, m , $1 : m$. b) $b : a$, $b : \sqrt{a^2 - b^2}$, $\sqrt{a^2 - b^2} : b$. c) $q : p$; $\sqrt{p^2 - q^2} : p$, $q : \sqrt{p^2 - q^2}$, $\sqrt{p^2 - q^2} : q$. d) $\frac{m-n}{m+n}$, $\frac{2\sqrt{mn}}{m+n}$, etc. e) $\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$, $\frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$, a . f) $\frac{n}{m}$, $\frac{\sqrt{m^2 - n^2}}{m}$, $\frac{n}{\sqrt{m^2 - n^2}}$.

4. a) $\sin \alpha - \sin \alpha^3 + \frac{\sin \alpha}{1 - \sin \alpha^2} - \frac{1}{\sin \alpha^2}$. b) $1 + \sin \alpha - \frac{\sin \alpha}{1 - \sin \alpha^2}$. c) $\frac{\sin \alpha^2}{1 - \sin \alpha^2} + 1 - \frac{1}{\sin \alpha^2} + 2 \sin \alpha \cdot \sqrt{1 - \sin \alpha^2} = \frac{1}{1 - \sin \alpha^2} - \frac{1}{\sin \alpha^2} + 2 \sin \alpha \cdot \sqrt{1 - \sin \alpha^2}$. d) $\frac{1}{1 - \sin \alpha^2} - \frac{\sin \alpha^2}{1 - \sin \alpha^2} + 1 - \sin \alpha^2 - \frac{1 - \sin \alpha^2}{\sin \alpha^2} = 2 - \sin \alpha^2 - \frac{1 - \sin \alpha^2}{\sin \alpha^2}$.

5. a) $\frac{1 - \cos \alpha^2}{\cos \alpha} + \frac{1 - \cos \alpha^2}{\cos \alpha^2} = \frac{1 + \cos \alpha - \cos \alpha^2 - \cos \alpha^3}{\cos \alpha^2}$. b) $\frac{1}{\cos \alpha}$. c) $\frac{\cos \alpha^2}{1 - \cos \alpha^2} + \frac{1 - \cos \alpha^2}{\cos \alpha^2} - 1$. d) $\sqrt{1 - \cos \alpha^2} \cdot \cos \alpha$.

6. a) $\frac{1}{\tan \alpha} + \sqrt{1 + \tan \alpha^2} - \frac{\sqrt{1 + \tan \alpha^2}}{\tan \alpha}$. b) $\frac{\tan \alpha^2}{1 + \tan \alpha^2} + \frac{1}{\tan \alpha} - \tan \alpha$. c) $\frac{\tan \alpha}{1 + \tan \alpha^2} + \frac{1 + \tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan \alpha^2}}$. d) $\frac{1 - \tan \alpha + \tan \alpha^2}{1 + \tan \alpha + \tan \alpha^2} - \frac{1}{\sqrt{1 + \tan \alpha^2}}$.

7. a) 1. b) $2 \cotg \alpha$. c) $\frac{1}{\cotg \alpha} + \cotg \alpha^2$.

8. a) $\sec \beta^2 = \frac{1}{\sec \beta^2 - 1}$. b) $1 + \sec \beta$. c) $\frac{1}{\sec \beta^2}$.

9. a) $\frac{1 + \sqrt{\operatorname{cosec} \gamma^2 - 1}}{\operatorname{cosec} \gamma}$. b) $\frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec} \gamma^2 - 1}} - \sqrt{\operatorname{cosec} \gamma^2 - 1}$.

c) $\frac{\operatorname{cosec} \gamma + 1}{\sqrt{\operatorname{cosec} \gamma^2 - 1}} + \frac{\sqrt{\operatorname{cosec} \gamma^2 - 1}}{\operatorname{cosec} \gamma}$.

10. a) $\sin x = \frac{1}{3} = 0,333 \dots$; $\cos x = \frac{2}{3}\sqrt{2} = 0,94281$;
 $\operatorname{tang} x = \frac{1}{2}\sqrt{2} = 0,35355$; $\operatorname{cotg} x = 2\sqrt{2} = 2,82843$.

b) $\cos x = \frac{2}{3}$ oder -1 . Vergl. 2, e.

c) $\sin x = \pm \frac{1}{2}\sqrt{2} = \cos x$; $\operatorname{tang} x = \pm 1 = \operatorname{cotg} x$.

d) $\operatorname{tang} x = \frac{1}{2}\sqrt{3} = \pm 0,86603$; $\operatorname{cotg} x = \frac{2}{3}\sqrt{3} = \pm 1,15470$;
 $\cos x = \frac{2}{3}\sqrt{7} = \pm 0,75593$; $\sin x = \frac{1}{3}\sqrt{21} = \pm 0,65465$.

e) $\sin x = \frac{5}{6}\sqrt{2} = \pm 0,7071$ oder -1 ; $\cos x_1 = \frac{3}{4}\sqrt{2} = \pm 0,6062$; $\operatorname{tang} x_1 = \frac{5}{3}\sqrt{2} = \pm 2,3094$.

f) $\operatorname{tang} x = \frac{9}{10}$ oder $\frac{1}{2}$; $\sin x = \frac{9}{\sqrt{181}} = 0,66896$ oder
 $\frac{1}{2}\sqrt{5} = 0,44721$; $\cos x = \frac{10}{\sqrt{181}} = 0,74329$ od. $\frac{2}{3}\sqrt{5} = 0,89443$;
 $\operatorname{cotg} x = \frac{1}{9} = 0,11111$ oder 2 .

g) $\cos x = \frac{1}{3}$; $\sin x = \frac{2}{3}\sqrt{2} = 0,94281$; $\operatorname{tang} x = 2\sqrt{2} = 2,82843$;
 $\operatorname{cotg} x = \frac{1}{2}\sqrt{2} = 0,35355$.

h) $\sec x = 2$, $\cos x = \frac{1}{2}$, $\sin x = \frac{1}{2}\sqrt{3} = 0,86603$,
 $\operatorname{tang} x = \sqrt{3} = 1,73205$, $\operatorname{cotg} x = \frac{1}{3}\sqrt{3} = 0,57735$.

11. a) $\sin \alpha = \pm \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \pm \frac{3}{5}$.

b) $\sin \alpha = \frac{1}{5}\sqrt{5} = \pm 0,44721$.

59. a) $\cos 105^\circ = -\sin 15^\circ$; $\sin 105^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}}$;
 $\operatorname{tang} 105^\circ = -(2 + \sqrt{3})$. b) $\frac{1}{p}$. c) q .

60. $\sin x = \pm \cos a$; $90^\circ - a$, $90^\circ + a$, $270^\circ - a$, $270^\circ + a$.

61. $\operatorname{tang} x = -1$; 135° , 315° . 62. $\cos x = a$.

63. $\operatorname{tang} x = \pm \sqrt{b}$. 64. $\operatorname{tang} x = c$.

65. $\sin x = \pm \sqrt{\frac{c-b}{a-b}}$. 66. $\operatorname{tang} x = 1$; 45° , 225° .

67. $\sin x = \pm \sqrt{\frac{b}{a}}$.

68. $\sin x = 0$ oder $\cos x = \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$; $0^\circ, 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.

69. a) $\sin x = 0$ und $\cos x = \frac{b-a}{b+a} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$; $0^\circ, 36^\circ, 180^\circ, 324^\circ$.

b) $\cos x = 0$ und $\sin x = \frac{b-a}{b+a} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$; $18^\circ, 90^\circ, 162^\circ, 270^\circ$.

70. a) $\cos x = -1$ u. $\tan x = \frac{b}{a} = 1$; $45^\circ, 180^\circ, 225^\circ$.

b) $\cos x = 1$ und $\tan x = \frac{b}{a} = 1$; $0^\circ, 45^\circ, 225^\circ$.

c) $\sin x = -1$ und $\cotg x = \frac{b}{a} = 1$; $45^\circ, 225^\circ, 270^\circ$.

d) $\sin x = 1$ und $\cotg x = \frac{b}{a} = 1$; $45^\circ, 90^\circ, 225^\circ$.

71. a) $\cos x = -1$; $\sin x = \frac{b}{a} = 1$; $90^\circ, 180^\circ$.

b) $\cos x = 1$; $\sin x = \frac{b}{a} = 1$.

c) $\sin x = -1$, $\cos x = \frac{b}{a} = 1$.

d) $\sin x = 1$, $\cos x = \frac{b}{a} = 1$.

72. a) $\cos x = -1$, $\cos x = (b-a) : b = \frac{1}{2}$.

b) $\cos x = 1$, $\cos x = (a-b) : b = -\frac{1}{2}$.

c) $\sin x = -1$, $\sin x = (b-a) : b = \frac{1}{2}$.

d) $\sin x = 1$, $\sin x = (a-b) : b = -\frac{1}{2}$.

73. a) $\cos x = -1$, $\cos x = \frac{b}{a+b} = \frac{1}{4}$.

b) $\sin x = 1$, $\sin x = \frac{b}{a-b} = \frac{1}{2}$.

74. a) $\tan x = \frac{1}{2} a \pm \sqrt{\frac{1}{4} a^2 + 1}$.

b) $\sin x = \frac{a^2-1}{a^2+1}$ oder $\tan x = \frac{a^2-1}{2a}$.

75. $\sin x = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 4b^2}}{2b} = \frac{1}{2}$.

76. $\cos x = \frac{-b + \sqrt{4a^2 + b^2}}{2a} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

77. a) $\cos x = \frac{1}{2} (\sqrt{4+a^2} - a)$. b) $\sin x = \sqrt{\frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4b^2}}{2a}}$.

78. $\cos x = \frac{1}{2} (1 \pm \sqrt{5-4a}) = 1$ oder 0 .

$$79. \sin x = \frac{c + \sqrt{c^2 + 4ab}}{2a} = 1 \text{ oder } 1 - \sqrt{2}.$$

$$80. \cos x = \frac{1}{3} (-1 \pm \sqrt{33}).$$

$$81. \cos x = \frac{-c \pm \sqrt{4a(a-b) + c^2}}{2(a-b)}.$$

$$82. \tan x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$83. \tan x = \sqrt[3]{\frac{Vab(a+2b)(b+2a) \pm (a+b)V2ab}{a^2}}.$$

$$84. \tan x = \sqrt[3]{0,3}. \quad 85. \tan x = -\sqrt[3]{\frac{16}{17}}.$$

$$86. \cos x = \frac{1}{2} \sqrt{3} \text{ oder } \frac{1}{3} \sqrt{6}.$$

$$87. \text{ a) } \tan y = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{b}{a} + \frac{1}{4}}; \quad \frac{\pm \sqrt{5} - 1}{2} \text{ oder } \frac{1}{2} \sqrt{\frac{7+4\sqrt{3}}{3}} - \frac{1}{2}, \text{ d. i. } \frac{1}{3} \sqrt{3} \text{ und } -(1 + \frac{1}{3} \sqrt{3}).$$

$$\text{ b) } \cotg y \text{ wie a.}$$

$$\text{ c) } \tan y = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{b}{a}}; \quad \frac{1}{2} \text{ oder } \sqrt{3} - 1 \text{ u. } 2 - \sqrt{3}.$$

$$\text{ d) } \cotg y \text{ wie c.}$$

$$88. \text{ a) } \tan y = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4a^2}}{2a}; \quad 1 \text{ oder } 2 \text{ und } \frac{1}{2}.$$

$$\text{ b) } \tan y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4a^2}}{2a} = \frac{1}{2} \text{ u. } -2, \text{ od. } -1 \pm \sqrt{2}.$$

$$89. \text{ a) } \tan y = \frac{c \pm \sqrt{c^2 - 4ab}}{2a} = 1 \text{ oder } \frac{3}{2} \text{ und } 1 \text{ oder } 1 \pm \sqrt{4 - 2\sqrt{3}}.$$

$$\text{ b) } \tan y = \frac{c \pm \sqrt{c^2 + 4ab}}{2a}; \quad \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \text{ oder } 1 \pm \sqrt{2} \text{ oder } 1 \pm \sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{3}}.$$

$$90. \sin x = 0, \quad \sin y = 0 \text{ oder } \sin x = \sqrt{\frac{b^2 - a^2}{b^2 - 1}},$$

$$\sin y = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{b^2 - a^2}{b^2 - 1}}.$$

$$91. \sin y = \sqrt[4]{0,8} = \tan x.$$

$$92. \sin x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}(a-b)}, \quad \cos y = \pm \sqrt{\frac{1}{2}(a+b)}.$$

$$93. \sin x = b \sqrt{\frac{c-1}{b^2-a^2}}, \cos y = a \sqrt{\frac{c-1}{b^2-a^2}}.$$

$$94. \operatorname{tg} x = \frac{4}{3}, \operatorname{tg} y = -8 \text{ und } \operatorname{tg} x = \frac{2}{3}, \operatorname{tg} y = -2.$$

$$95. \cos x = \sqrt{\pm \sqrt{-b^2 + \frac{1}{4}(a^2 - b^2 - 1)^2} - \frac{1}{2}(a^2 - b^2 - 1)},$$

$$\sin y = \sqrt{\pm \sqrt{-b^2 + \frac{1}{4}(a^2 - b^2 - 1)^2} - \frac{1}{2}(a^2 - b^2 - 1)}.$$

$$96. \sin x = \frac{\sqrt{5} \mp 1}{2}, y = 270^\circ - x.$$

$$97. x = 90^\circ, y = 0, z = 0 \text{ oder } 180^\circ \text{ und } x = 270^\circ, y = 180^\circ, z = 0 \text{ oder } 180^\circ.$$

$$98. \operatorname{tang} x = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(a-b)^2 + 4 \cdot \frac{a-b}{c}} + a - b \right],$$

$$\operatorname{tang} y = \frac{1}{2} \left[a + b - \sqrt{(a-b)^2 + 4 \cdot \frac{a-b}{c}} \right],$$

$$\operatorname{tang} z = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(a-b)^2 + 4 \cdot \frac{a-b}{c}} - a + b \right].$$

$$99. x = 30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ;$$

$$y = 30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ;$$

$$z = 45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ.$$

$$100. \sin x = \pm 8 : \sqrt{65},$$

$$\sin y = \pm 4 : \sqrt{65},$$

$$\sin z = \pm 2 : \sqrt{65},$$

$$\sin u = \pm 1 : \sqrt{65}.$$

§. 5.

$$1. a) \sin(\alpha \pm \beta) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{3}; \cos(\alpha \pm \beta) = \mp \frac{1}{2}.$$

$$b) \sin(\alpha + \beta) = \frac{5}{6}\frac{3}{5}, \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{6}\frac{3}{5}; \cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{6}\frac{3}{5},$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{6}\frac{3}{5}.$$

$$2. a) \operatorname{tang}(\alpha \pm \beta) = \frac{q \pm p}{p q \mp 1}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{1}.$$

$$\operatorname{cotg}(\alpha \pm \beta) = \frac{p q \mp 1}{q \pm p}, +2; -\frac{1}{2}.$$

$$b) \operatorname{tang}(\alpha + \beta) = -10,2, \operatorname{tang}(\alpha - \beta) = -\frac{4}{1}\frac{3}{5},$$

$$\operatorname{cotg}(\alpha + \beta) = -\frac{5}{1}\frac{3}{5}, \operatorname{cotg}(\alpha - \beta) = -\frac{1}{1}\frac{3}{5}.$$

$$3. \frac{\sec \alpha \cdot \sec \beta \cdot \operatorname{cosec} \alpha \cdot \operatorname{cosec} \beta}{\operatorname{cosec} \alpha \cdot \operatorname{cosec} \beta \mp \sec \alpha \cdot \sec \beta}; \frac{\sec \alpha \cdot \operatorname{cosec} \beta \cdot \operatorname{cosec} \alpha \cdot \sec \beta}{\sec \alpha \cdot \operatorname{cosec} \beta \pm \operatorname{cosec} \alpha \cdot \sec \beta}.$$

$$4. a) \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma + \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma$$

$$- \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma.$$

$$\text{b) } \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma + \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma - \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma.$$

c) $\frac{\operatorname{tang} \alpha - \operatorname{tang} \beta + \operatorname{tang} \gamma + \operatorname{tang} \alpha \cdot \operatorname{tang} \beta \cdot \operatorname{tang} \gamma}{1 + \operatorname{tang} \alpha \cdot \operatorname{tang} \beta - \operatorname{tang} \alpha \cdot \operatorname{tang} \gamma + \operatorname{tang} \beta \cdot \operatorname{tang} \gamma}.$

d) $\frac{\cotg \alpha \cdot \cotg \beta \cdot \cotg \gamma - \cotg \alpha + \cotg \beta + \cotg \gamma}{\cotg \gamma \cdot \cotg \beta - \cotg \gamma \cdot \cotg \alpha - \cotg \beta \cdot \cotg \alpha - 1}.$

$$5. \text{ a) } \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma \cos \delta + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma \cos \delta + \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma \cos \delta + \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \sin \delta - \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma \sin \delta - \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma \sin \delta - \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma \sin \delta - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \cos \delta.$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma \cos \delta + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma \cos \delta + \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma \cos \delta - \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \sin \delta + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma \sin \delta \\ & + \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma \sin \delta + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma \sin \delta - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \cos \delta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{e) } \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma \cos \delta + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma \cos \delta - \cos \alpha \\ & \cos \beta \sin \gamma \cos \delta - \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \sin \delta - \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma \sin \delta \\ & - \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma \sin \delta + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma \sin \delta + \sin \alpha \sin \beta \\ & \sin \gamma \cos \delta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad & \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma \cos \delta - \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma \cos \delta - \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma \cos \delta - \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \sin \delta + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma \sin \delta \\ & - \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma \sin \delta - \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma \sin \delta - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \cos \delta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \text{ a) } & \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \cos \delta - \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma \cos \delta \\ & - \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma \cos \delta - \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma \sin \delta - \cos \alpha \sin \beta \\ & \sin \gamma \cos \delta - \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma \sin \delta - \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma \sin \delta \\ & + \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \sin \delta. \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{tg\alpha - tg\beta + tg\gamma + tg\delta + tg\alpha tg\beta tg\gamma + tg\alpha tg\beta tg\delta - tg\alpha tg\gamma tg\delta + tg\beta tg\gamma tg\delta}{1 + tg\alpha tg\beta - tg\alpha tg\gamma - tg\alpha tg\delta + tg\beta tg\gamma + tg\beta tg\delta - tg\gamma tg\delta - tg\alpha tg\beta tg\gamma tg\delta},$$

$$\frac{\cot \delta \cot \gamma - \cot \delta \cot \beta + \cot \delta \cot \alpha + \cot \gamma \cot \beta - \cot \gamma \cot \alpha + \cot \delta \cot \gamma \cot \beta - \cot \delta \cot \gamma \cot \alpha + \cot \delta \cot \beta \cot \alpha - \cot \gamma \cot \beta \cot \alpha + \cot \beta \cot \alpha + \cot \alpha \cot \beta \cot \gamma \cot \delta + 1}{\cot \delta - \cot \gamma + \cot \beta - \cot \alpha}.$$

$$\begin{aligned} \text{d) } & \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \cos \delta + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma \cos \delta + \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma \cos \delta - \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma \sin \delta - \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma \cos \delta \\ & + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma \sin \delta + \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma \sin \delta + \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \sin \delta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &7. \quad \text{a) } \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}, \quad \text{b) } \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}, \quad \text{c) } \frac{\cot \alpha \cdot \cot \beta - 1}{\cot \beta - \cot \alpha}, \\
 &\text{d) } \frac{\cot \alpha \cdot \cot \beta + 1}{\cot \beta + \cot \alpha}, \quad \text{e) } \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta} = \frac{\cot \beta - \cot \alpha}{\cot \beta + \cot \alpha}, \\
 &\text{f) } \frac{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} = \frac{\cot \alpha \cdot \cot \beta + 1}{\cot \alpha \cdot \cot \beta - 1}.
 \end{aligned}$$

$$8. \quad \sin(90^\circ + x) = \sin 90^\circ \cdot \cos x + \cos 90^\circ \cdot \sin x = \cos x, \\ \text{u. s. w.}$$

$$11. \quad \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

$$13. \quad \text{a) } \cos(a + b) = \text{etc.} \quad \text{b) } \cos(a - b) = \text{etc.}$$

$$48. \quad \sin x = 1, \quad x = 90^\circ.$$

$$49. \quad \text{a) } \operatorname{tang} x = \frac{c - \sin a}{\cos a - b}, \quad \text{b) } \operatorname{tg} x = \frac{n + \cos a}{m - \sin a}.$$

$$50. \quad \cotg x = \sqrt{1 + 2 \operatorname{tg} a^2}.$$

$$51. \quad \cotg x = -2 - \cotg \vartheta. \quad 52. \quad \operatorname{tang} x = -1.$$

$$53. \quad \operatorname{tang} x = \sqrt{\frac{a-2}{a}}. \quad 54. \quad \operatorname{tang} x = \sqrt{\frac{1 - \cot \gamma}{1 - \sin \gamma}}.$$

$$55. \quad \operatorname{tang} x = \operatorname{tang} \alpha \cdot \operatorname{tang} \beta \cdot \operatorname{tang} \gamma.$$

$$56. \quad \operatorname{tang} x = 0 \text{ oder } \operatorname{tang} x^2 = \cotg \mu^4 [2 + 3 \operatorname{tang} \mu^2 \\ \pm 2 \sqrt{1 + \operatorname{tang} \mu^6 + 3 \operatorname{tang} \mu^2 (1 + \operatorname{tang} \mu^2)}].$$

$$57. \quad \sin x^2 = \frac{1}{2} [\sin \gamma \sqrt{-4a^2 - 4a \cos \gamma + \sin \gamma^2} \\ - 2a \cos \gamma + \sin \gamma^2].$$

$$58. \quad x = 45^\circ, 165^\circ, 285^\circ, 225^\circ.$$

$$y = 15^\circ, 135^\circ, 135^\circ, 75^\circ.$$

$$59. \quad \sqrt{p^2 q^2 + p^2 + q^2 + 1} = \omega,$$

$$\operatorname{tang} x = \frac{pq - 1 \pm \omega}{p + q}, \quad \operatorname{tang} y = \frac{-pq - 1 \pm \omega}{p - q}.$$

$$60. \quad \text{a) } \operatorname{tg} y = \frac{p \sin \delta - q \sin \varepsilon}{p \cos \delta - q \cos \varepsilon}, \quad x = \frac{p}{\sin(\varepsilon - y)} = \frac{q}{\sin(\delta - y)}.$$

$$\text{b) } \operatorname{tang} y = \frac{p \cos \delta - q \cos \varepsilon}{q \sin \varepsilon - p \sin \delta}, \quad x = \frac{p}{\cos(\varepsilon - y)} = \frac{q}{\cos(\delta - y)}.$$

$$61. \quad \cos x = \pm 0,6; \quad \cos y = \pm 0,8.$$

§. 6.

$$1. \sin 36^\circ = \frac{1}{4}\sqrt{10-2\sqrt{5}}, \cos 36^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5}+1), \\ \tan 36^\circ = \sqrt{5-2\sqrt{5}}.$$

$$2. \sin 2x = 0,48050, \cos 2x = -0,87699, \\ \tan 2x = -0,54790, \cot 2x = -1,82515.$$

$$3. a) \cos x = \frac{1-a^2}{1+a^2}; 0 \text{ oder } 0,6 \text{ oder } \frac{1}{2}\sqrt{2}.$$

$$b) \sin x = \frac{2a}{1+a^2}; 1 \text{ oder } \frac{2}{3}\sqrt{2} \text{ oder } \frac{1}{2}\sqrt{2}.$$

$$c) \cos 2x = -\frac{1}{2}, \tan 2x = -\sqrt{3}.$$

$$4. \sin 3\alpha = 3 \sin \alpha \cos \alpha^2 - \sin \alpha^3; \\ \cos 3\alpha = \cos \alpha^3 - 3 \sin \alpha^2 \cos \alpha; \\ \tan 3\alpha = \frac{3 \tan \alpha - \tan \alpha^3}{1-3 \tan \alpha^2}; \cot 3\alpha = \frac{\cot \alpha^3 - 3 \cot \alpha}{3 \cot \alpha^2 - 1}.$$

$$5. \sin 4\alpha = 4 \sin \alpha \cos \alpha^3 - 4 \sin \alpha^3 \cos \alpha; \\ \cos 5\alpha = \cos \alpha^5 - 10 \sin \alpha^2 \cos \alpha^3 + 5 \sin \alpha^4 \cos \alpha. \\ \tan 6\alpha = \frac{-6 \tan \alpha - 20 \tan \alpha^3 + 6 \tan \alpha^5}{1-15 \tan \alpha^2 + 15 \tan \alpha^4 - \tan \alpha^6}.$$

$$6. \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

$$7. \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin \alpha^2 = 2 \cos \alpha^2 - 1.$$

$$48. \sin 2x = 2a.$$

$$49. \sin 2x = 2b - \sin 2a.$$

$$50. \sin x = 0, \cos x = \frac{1}{4}(\sqrt{17}-1).$$

$$51. a) \sin x = 0, \cos x = \frac{b}{2a} = \frac{1}{2};$$

$$b) \cos x = 0, \sin x = \frac{b}{2a} = \frac{1}{2}.$$

$$52. a) \sin 2x = \frac{a}{b-a} = \frac{1}{2}; b) \sin 2x = \frac{a}{b+a} = \frac{1}{2}.$$

$$53. a) \tan x = -1, \tan x = \frac{a}{2b+a} = \frac{1}{2} \text{ oder } 2 - \sqrt{3};$$

$$b) \tan x = 1, \tan x = \frac{a}{2b-a} = 1 \text{ oder } -\sqrt{2}-1.$$

$$c) \tan x = -1, \tan x = \frac{a-2b}{a} = -1; \sqrt{2}-1.$$

$$d) \tan x = 1, \tan x = \frac{2b-a}{a} = 1; 2 + \sqrt{3}.$$

$$54. a) \sin 2x = -1, \sin 2x = \frac{4a^2-b^2}{4a^2+b^2} = 0,6;$$

- b) $\sin 2x = 1$, $\sin 2x = \frac{b^2 - 4a^2}{b^2 + 4a^2} = -0,6$.
55. a) $\cos 2x = -1$, $\cos 2x = \frac{b^2 - 4a^2}{b^2 + 4a^2} = -0,6$;
 b) $\cos 2x = 1$, $\cos 2x = \frac{4a^2 - b^2}{4a^2 + b^2} = 0,6$.
56. a) $\cos 2x = 0$, $\sin 2x = \frac{2a}{b} = \frac{1}{2}$;
 b) $\cos 2x = \frac{b}{2a} = \frac{1}{2}$; c) $\cos 2x = \frac{2a}{b} = \frac{1}{2}$.
57. a) $\tan x = 0,8$ oder $\frac{4}{5}$; b) $\tan x = 1$ oder -2 .
58. a) $\sin x = 0$, $\cos x = \frac{d}{c}$; b) $\cos x = 0$, $\sin x = \frac{d}{c}$.
59. a) $\sin x = 0$, $\cos x = \frac{n}{2m}$; b) ebenso.
60. a) $\sin x = 0$, $\tan x = \pm 1$, $\sin 2x = \frac{b}{a}$;
 b) $\sin x = 0$, $\sin 2x = n : m$.
61. a) $\sin x = 0$, $\cos x = 0$, $\cotg x = b$.
 b) $\sin x = 0$, $\tan x = b : a$. c) $\tan x = n : m$.
62. a) $\sin 2x = \frac{a}{b-a}$; b) ebenso; c) $\sin 2x = \frac{m}{n-m}$;
 d) $\sin 2x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{n}{m} + \frac{1}{4}}$.
63. a) $\cotg x = -1$, $\cotg x = 2 \frac{a}{m} + 1$;
 b) $\tan x = -1$, $\cotg x = \frac{a+2b}{a}$;
 c) $\cotg x = 1$, $\cotg x = \frac{2d-c}{c}$;
 d) $\cotg x = 1$, $\cotg x = \frac{2n-m}{m}$;
 e) $\cotg x = -1$, $\cotg x = \frac{a}{a-2b}$;
 f) $\tg x = -1$, $\tg x = \frac{a-2d}{a}$; g) $\cotg x = \frac{m}{m-2n}$.
64. $\cotg x = 1$; $\frac{a}{2b-a}$.
65. a) $\cotg 2x = \frac{4mn}{n^2 - 4m^2}$; b) $\tg x = \pm 1$, $\tg x = \frac{2a}{b}$;
 c) $\cotg 2x = 0$, $\tg x = \frac{2m}{n}$;
 d) $\cotg 2x = 0$, $\cotg x = 2a : b$;

e) $\cotg 2x = 0$, $\cotg x = 2m : n$;

f) $\tan x = \pm 1$, $\sin 2x = 2a : b$;

g) $\cos 2x = 0$, $\sin 2x = 2m : n$.

66. $x = 0$, $x = \pm \sqrt{2}$.

67. $\tan x = 0$ oder $\pm \sqrt{\frac{1}{3}(1 + \sqrt{17})}$.

68. $\sin x = 0$ oder $\cos x = 0$ oder $\cos x = \frac{2}{3}$.

69. $\cos x = 0$ oder $\sin x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}a}$.

70. $\sin x = 0$ oder $\tan x = 3$. 71. $\tan x = -1$.

72. $\tan x = 0$ oder $\pm \sqrt{3}$. 73. $\cos 2x = 0$.

74. $\cos(45^\circ - 4x) = 0$ oder $\cos x = \frac{1}{4}\sqrt{2}$.

75. $\cos \frac{1}{2}x = 0$; $\sin \frac{1}{2}x = \frac{1}{4}$.

§. 7.

1. $\sin \frac{1}{2}\alpha = \frac{1}{13}$, $\cos \frac{1}{2}\alpha = \pm \frac{12}{13}$, $\tan \frac{1}{2}\alpha = \pm \frac{1}{12}$,
 $\cotg \frac{1}{2}\alpha = \pm 12$.

2. a) $\sin \frac{1}{2}x = \sqrt{\frac{1 - 0,4\sqrt{6}}{2}} = 0,10051$;

$\cos \frac{1}{2}x = \sqrt{\frac{1 + 0,4\sqrt{6}}{2}} = 0,99494$.

b) $\frac{1}{4}(\sqrt{50} - 1)$ oder $-\frac{1}{4}(\sqrt{50} + 1)$.

3. $\sin 22\frac{1}{2}^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2}} = 0,38268$;

$\cos 22\frac{1}{2}^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}} = 0,92388$;

$\tan 22\frac{1}{2}^\circ = \sqrt{2} - 1 = 0,41421$;

$\cotg 22\frac{1}{2}^\circ = \sqrt{2} + 1 = 2,41421$.

4. $\sin 15^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{3}} = \frac{1}{4}\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)$;

$\cos 15^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}} = \frac{1}{4}\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)$;

$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3} = (3 - \sqrt{3}) : (3 + \sqrt{3})$;

$\cotg 15^\circ = 2 + \sqrt{3} = (\sqrt{3} + 1) : (\sqrt{3} - 1)$.

5. $\frac{\sqrt{1 + \tan 2\alpha^2} - 1}{\tan 2\alpha}$.

6. $\sin \frac{1}{3}\alpha^3 - \frac{3}{4}\sin \frac{1}{3}\alpha + \frac{1}{4}\sin \alpha = 0$,

$\cos \frac{1}{3}\alpha^3 - \frac{3}{4}\cos \frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{4}\cos \alpha = 0$,

$\tan \frac{1}{3}\alpha^3 - 3\tan \alpha \tan \frac{1}{3}\alpha^2 - 3\tan \frac{1}{3}\alpha + \tan \alpha = 0$.

$$11. \text{ a) } \sin \frac{1}{2} x = 0; \sin \frac{1}{2} x = \frac{b}{2a} = \frac{1}{2};$$

$$\text{ b) } \cos \frac{1}{2} x = 0; \cos \frac{1}{2} x = \frac{b}{2a} = \frac{1}{2}.$$

$$12. \text{ a) } \sin \frac{1}{2} x = 0; \sin x = \frac{b}{a} = 1;$$

$$\text{ b) } \cos \frac{1}{2} x = 0; \sin x = \frac{b}{a} = 1.$$

$$13. \text{ a) } \cos \frac{1}{2} x = 0, \tan \frac{1}{2} x = \frac{a}{b} = 1;$$

$$\text{ b) } \sin x = 0, \tan x = \frac{b}{a} = 3.$$

$$14. \tan x = \frac{d}{c}.$$

$$15. \text{ a) } \sin x = 0, \cos x = \frac{b}{a}; \text{ b) } \cos x = 0, \sin x = \frac{b}{a}.$$

$$16. \text{ a) } \sin x = 0, \cos x = \frac{b}{a}; \text{ b) } \cos x = 0, \sin x = \frac{b}{a}.$$

$$17. \text{ a) } \sin x = 0, \cos x = d : 2c;$$

$$\text{ b) } \cos x = 0, \sin x = d : 2c.$$

$$18. \cos x = 0, \sin 2x = b : a.$$

$$19. \text{ a) } \sin 2x = \frac{a}{a+b}; \text{ b) } \text{ebenso}.$$

§. 8.

$$1. \text{ a) } 2 \sin 90^\circ \cdot \cos 15^\circ = 2 \cos 15^\circ;$$

$$\text{ b) } 2 \cos 45^\circ \cdot \cos 30^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{6}; \text{ c) } 2 \sin 52^\circ \cdot \cos 64^\circ;$$

$$\text{ d) } 2 \sin 32^\circ \cdot \sin 21^\circ; \text{ e) } -2 \sin 90^\circ \cdot \sin 45^\circ = -\sqrt{2};$$

$$\text{ f) } 2 \sin 180^\circ \cdot \cos 60^\circ = 0.$$

$$2. \text{ a) } \frac{\sin 30^\circ \cdot \cos 20^\circ}{\cos 54^\circ \cdot \sin 20^\circ}; \text{ b) } \frac{\cos 111^\circ \cdot \cos 11^\circ}{\sin 74^\circ \cdot \sin 32^\circ}.$$

$$3. \frac{\sin a + \sin b}{\sin a - \sin b} = \frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(a+b)}{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(a-b)}, \frac{\sin a + \sin b}{\cos a + \cos b} = \operatorname{tg} \frac{1}{2}(a+b),$$

$$\frac{\sin a + \sin b}{\cos a - \cos b} = -\operatorname{cotg} \frac{1}{2}(a-b), \frac{\sin a - \sin b}{\cos a + \cos b} = \operatorname{tg} \frac{1}{2}(a-b),$$

$$\frac{\sin a - \sin b}{\cos a - \cos b} = -\operatorname{cotg} \frac{1}{2}(a+b), \frac{\cos a + \cos b}{\cos a - \cos b} = -\operatorname{cotg} \frac{1}{2}(a+b) \cdot \operatorname{cotg} \frac{1}{2}(a-b).$$

$$4. 4 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \sin \frac{1}{2} \alpha \sin \frac{1}{2} \beta;$$

$$4 \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \sin \frac{1}{2} \alpha \sin \frac{1}{2} \beta + 1.$$

14. a) $\cos x = 0$, $\sin 3x = b : 2a = \frac{1}{2}$,
 $x = 10^\circ, 50^\circ, 130^\circ, 170^\circ$, u. s. w.
 b) $\sin x = 0$, $\cos 3x = b : 2a = \frac{1}{2}$,
 $x = 20^\circ, 100^\circ$, u. s. w.
 c) $\cos x = 0$, $\cos 3x = b : 2a = \frac{1}{2}$,
 d) $\sin x = 0$, $\sin 3x = -b : 2a = -\frac{1}{2}$.
15. a) $\cos (x - 45^\circ) = \frac{1}{2} a \sqrt{2} = 1$,
 bezw. $\sin (x - 45^\circ) = \frac{1}{2} a \sqrt{2} = 1$.
 b) $\cos (x - 45^\circ) = \frac{1}{2} b : \sin (45^\circ + a)$.
16. $\cos x = 0$, $\cos (n - 1)x = \frac{1}{2}$.
17. $\cos x = \frac{1}{4} (1 \pm \sqrt{5})$.
18. $\cos x = 0$ oder $\cos 4x = \frac{1}{2}$.
19. a) $x - y = 10^\circ$; $x = 50^\circ$, $y = 40^\circ$. b) 50° ; 30° .
 c) 31° ; 11° . d) 76° ; 6° . e) 76° ; 6° . f) 31° ; 11° .
 g) $42^\circ 40'$; $77^\circ 10'$. h) $66^\circ 30'$; $43^\circ 30'$.
- Die sonstigen Resultate der Zahlenbeispiele sind der Kürze halber hier und im Folgenden weggelassen; sie ergeben sich eventuell leicht aus den vorstehenden.
20. a) $43^\circ 30'$; $66^\circ 30'$. b) 67° ; 23° . c) $5^\circ 26'$; $88^\circ 34'$.
 d) $17^\circ 0', 9$; $23^\circ 10', 9$.
21. a) 90° ; 30° . b) 45° ; 30° . c) 74° ; 60° . d) 30° ;
 0° oder 90° ; 60° .
22. a) $23^\circ 47', 61$; $126^\circ 12', 39$. b) 20° ; 0° . c) 23° ; 90° .
23. a) $42^\circ 30'$; $22^\circ 10'$. b) $21^\circ 45'$; $15^\circ 45'$. c) $17^\circ 40'$;
 $45^\circ 0'$. d) $52^\circ 46', 4$; $0^\circ 46', 4$.

Anhang 1.

1. $90^\circ - a$. 2. $1 : m$. 3. 9° .
4. $\frac{\tan 33^\circ \cdot \cotg 25^\circ}{\cotg 41^\circ \cdot \tan 44^\circ}$
 $\frac{\sin 12^\circ \cdot \tan 9^\circ}{\tan 6^\circ \cdot \sin 15^\circ} + \frac{\cos 39^\circ \cdot \sin 27^\circ \cdot \cotg 39^\circ}{\sin 4^\circ \cdot \cotg 12^\circ \cdot \sin 8^\circ}$.
5. $x = 1$, $y = \cotg 44^\circ$. 6. $\tan \alpha^2 \cdot \tan \beta^2$;
 $(\tan 43^\circ \cdot \cotg 34^\circ)^2$.
7. $45^\circ, 225^\circ$. 8. $\sqrt{\frac{1}{4}(5 + 2\sqrt{5})}$. 9. $2p : (1 - p^2)$.
10. — 1,61812. 11. $x = 60^\circ$ oder 180° , $y = 0^\circ$ oder 120° .

12. 90° , 270° . 15. Wenn einer der Winkel α , β , $\alpha + \beta$ gleich 0 oder 360° ist.

$$16. \frac{(n-m)^2}{\sin 2\alpha^2} + \frac{(m+n-\cos \varphi)^2}{\cos 2\alpha^2} = 1.$$

$$17. B + \sqrt{-AB} = 2\sqrt{-\frac{B}{A+B}}.$$

$$18. 2 + m^2 + n^2 = \pm m\sqrt{4+m^2} \pm n\sqrt{4+n^2}.$$

$$66. \text{ a) und b) } \sin x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

$$67. \text{ a) } \sin x = 0, \cos x = \frac{b}{a} = \frac{1}{2};$$

$$\text{ b) } \cos x = 0, \sin x = \frac{b}{a} = \frac{1}{2}.$$

$$68. \cos x = -1 \text{ oder } \frac{1}{2}.$$

$$69. \sin x = \frac{3}{4}. \quad 70. \tan x = \pm 1.$$

$$71. \tan x = -\tan \beta \text{ oder } \cotg x = 1 - \cotg \beta.$$

$$72. \text{ a) } \cos(45^\circ - x) = \frac{b\sqrt{2}}{2a} = \frac{1}{2}\sqrt{2}, x = 0, 90^\circ;$$

$$\text{ b) } \sin(45^\circ - x) = \frac{b\sqrt{2}}{2a} = \frac{1}{2}\sqrt{2}; 0, 270^\circ.$$

$$73. \text{ a) } \tg x = -1, \sin(45^\circ - x) = \frac{a\sqrt{2}}{2b} = \frac{1}{2}\sqrt{2};$$

$$\text{ b) } \tg x = 1, \cos(45^\circ - x) = \frac{a\sqrt{2}}{2b} = \frac{1}{2}\sqrt{2}.$$

$$\text{ c) } \tg x = -1; \sin(45^\circ - x) = \frac{b\sqrt{2}}{2a} = \frac{1}{2}\sqrt{2};$$

$$\text{ d) } \tg x = 1, \cos(45^\circ - x) = \frac{b\sqrt{2}}{2a} = \frac{1}{2}\sqrt{2}.$$

$$74. \text{ a) } \tg x = -1; \cos(45^\circ - x) = \frac{a\sqrt{2}}{2b} = \frac{1}{2}\sqrt{2};$$

$$\text{ b) } \tg x = 1; \sin(45^\circ - x) = \frac{a\sqrt{2}}{2b} = \frac{1}{2}\sqrt{2}.$$

$$75. \text{ a) } \tg x = -1, \tg x = \frac{b-a}{b+a}; \text{ b) } \tg x = 1, \tg x = \frac{a-b}{a+b}.$$

$$76. \text{ a) } \cotg 2x = 0, \sin 2x = -\frac{b+2a}{2a};$$

$$\text{ b) } \cos 2x = 0, \sin 2x = \frac{2a}{2a+b}.$$

$$77. \text{ a) } \tan 2x = 2a : b = 2 \text{ oder } 1;$$

$$\text{ b) } \sin 4x = 4a : b = 1 \text{ oder } \frac{1}{2}.$$

78. $\cos x = \frac{1}{2} \sqrt{3}$. 79. $\operatorname{tg} x = \sqrt{3 \pm \sqrt{8}}$.
 80. $\sin 3x = 0$ oder $\cos 3x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$, $x = 15^\circ, 45^\circ, 75^\circ, 105^\circ, 135^\circ, 165^\circ$.
 81. $\operatorname{tg} x = 0$ oder $\pm \operatorname{tg} \alpha$. 82. $\operatorname{tg} x = \frac{\sin a \cdot \sin b}{1 - \sin a \cdot \cos b}$.
 83. $\operatorname{tg} x = -\frac{1}{3}$. 84. $\operatorname{tg} x = 1$ oder -2 .
 85. $\cos x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 86. $x = 0$ oder $\operatorname{tg} x = -1$,
 $x = 135^\circ, 315^\circ$.
 87. $\sin y = \sin x = 0$; $\cos x = \sqrt{1-m^2} : \sqrt{1-n^2}$,
 $\cos y = n \sqrt{1-m^2} : m \sqrt{1-n^2}$.
 88. $\operatorname{tg} \frac{1}{2}(x+y) = \frac{a}{b}$, $\cos \frac{1}{2}(x-y) = \frac{a}{2 \sin \frac{1}{2}(x+y)}$,
 d.i. $\cos x = \frac{b \mp aw}{2}$, $\cos y = \frac{b \pm aw}{2}$, $w = \sqrt{(4-a^2-b^2):(a^2+b^2)}$.
 89. $\sin \frac{1}{2}y = 0$, $\cos \frac{1}{2}y = \sqrt{\frac{-a \pm \sqrt{a^2+3}}{6a}}$.
 90. $\sin x = 0$, $\operatorname{tang} y = 0$.
 91. $x=45^\circ, y=30^\circ, z=105^\circ$ od. $x=135^\circ, y=30^\circ, z=15^\circ$.
 92. $x = \sin \frac{1}{2}\alpha$ oder $\cos \frac{1}{2}\alpha$. 93. $x = 0$, $x = \pm \sqrt{2}$.
 94. $x = \sqrt{2} \cdot \cotg 15^\circ$. 95. $x = \pm ab$.
 98. $x = 2a$. 99. $\cos x = \sin 2a^2 : \cos 2a$.

§. 9.

1. $\sin 15^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$, $\cos 15^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$,
 $\operatorname{tang} 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$, $\cotg 15^\circ = 2 + \sqrt{3}$.
 2. $\sin 15^\circ = \frac{1}{4}\sqrt{2 - \sqrt{3}} = 0,258819$,
 $\cos 15^\circ = \frac{1}{4}\sqrt{2 + \sqrt{3}} = 0,965926$.
 3. $\sin 18^\circ = 0,3090$, $\sin 36^\circ = 0,5878$, $\cos 18^\circ = 0,9511$.
 4. $\sin 3^\circ = \frac{1}{4}\sqrt{8 - \sqrt{3} - \sqrt{15} - \sqrt{10} - 2\sqrt{5}}$.
 5. $2 \sin 3^\circ \cdot \sqrt{1 - \sin 3^\circ} = 0,10453$.
 6. $\sin \alpha = \frac{1}{2}\sqrt{-a + \sqrt{a^2 - 1}} + \frac{1}{2}\sqrt{-a - \sqrt{a^2 - 1}}$.
 Da $a < 1$, so ist $a^2 - 1$ negativ, also liegt der irreducibele
 Fall vor. Vergl. §. 7, 6.

7. 0,0029089. 8. a) 0,0002909, b) 0,0000048.

9. Die Reihe muss convergiren. Dies ist stets der Fall, wenn $\cotg 3\alpha < 1$, d. i. $\alpha < 15^\circ$ ist. Der Ausdruck repräsentirt nur eine der drei reellen Wurzeln der Gleichung in 6, $\sin \alpha$, $-\sin(60^\circ - \alpha)$, $-\sin(60^\circ + \alpha)$. Die Berechnung für $\alpha = 20^\circ$ giebt $-0,98481$, und da $\sin 60^\circ = 0,86603$, so muss dies der Werth von $-\sin(60^\circ + \alpha)$, also $0,98481 = \cos 10^\circ$ sein.

$$14. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots;$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$15. \tan x = x + \frac{x^3}{1.3} + \frac{2x^5}{1.3.5} + \frac{17x^7}{1.3.5.7.3} + \dots;$$

$$\cotg x = \frac{1}{x} - \frac{x}{1.3} - \frac{x^3}{1.3.5.3} - \frac{2x^5}{1.3.5.7.9} - \dots$$

16. a) 0,052; b) 0,914; c) 0,213.

$$18. x = \sin x + \frac{1 \cdot \sin x^3}{2.3} + \frac{1.3 \cdot \sin x^5}{2.4.5} + \frac{1.3.5 \cdot \sin x^7}{2.4.6.7} + \dots$$

$$x = \tan x - \frac{1}{3} \tan x^3 + \frac{1}{3} \tan x^5 - \frac{1}{3} \tan x^7 + \dots$$

19. $x = 0,197396$; $\alpha = 11^\circ 18' 36''$.

$$20. a) \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots;$$

$$b) \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3} \sqrt{3} \left(1 - \frac{1}{3.3} + \frac{1}{5.3^3} - \frac{1}{7.3^5} + \dots \right);$$

$$c) \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{5-2\sqrt{5}}{5}} \left(1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{5-2\sqrt{5}}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{5-2\sqrt{5}}{5} \right)^2 \dots \right).$$

§. 10.

132. 193,231131. 133. 1,0016 mal. 134. 55 Meilen.

135. 0,00486 $\sqrt{7}$. 136. 35844^m. 140. $\frac{\pi}{4}$; 0,14189 r.

141. 0,29375. 142. $36^\circ 35' 12''$ und $23^\circ 24' 48''$.

Anhang 2.

$$1. \sin 1 = \sin 57^\circ 17' 44'',8 = 0,84147.$$

$$2. a) \sin 1 - \cos 1 = 0,30116; b) \sin 1 + \cos 1 = 1,38178.$$

$$3. \text{Arc tg} \left(= \frac{1}{3} \right) = 0,32175.$$

$$4. \text{Arc tg} \left(= 1 \right) \pm \text{Arc tg} \left(= \sqrt{\frac{1}{3}} \right) = 1,20593; 0,36487.$$

$$5. a) -\frac{x^3}{3!} + \frac{2x^5}{5!} - \frac{3x^7}{7!} + \dots;$$

- b) $x - \frac{2x^3}{3!} + \frac{3x^5}{5!} - \frac{4x^7}{7!} + \dots$
6. $1 - \frac{x^2 + xy + y^2}{3} + \frac{x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4}{5} - \dots$
7. $\frac{1}{2} \cotg \frac{1}{2}x = \frac{\cos \frac{1}{2}(2n+1)x}{2 \sin \frac{1}{2}x}$.
8. $-\frac{1}{2} + \frac{\sin \frac{1}{2}(2n+1)x}{2 \sin \frac{1}{2}x}$. 9. $\frac{\sin nx}{\sin x}$.
10. $-\frac{1}{2} + \frac{\cos nx \cdot \cos(n+1)y - \cos(n+1)x \cdot \cos ny}{2(\cos y - \cos x)}$.
11. $\sin nx = \binom{n}{1} \cos x^{n-1} \sin x - \binom{n}{3} \cos x^{n-3} \sin x^3$
 $+ \binom{n}{5} \cos x^{n-5} \sin x^5 - \dots$
12. $\cos nx = \cos x^n - \binom{n}{2} \cos x^{n-2} \sin x^2 +$
 $\binom{n}{4} \cos x^{n-4} \sin x^4 - \dots$
13. $\operatorname{tg} nx = \frac{n \operatorname{tg} x - \binom{n}{3} \operatorname{tg} x^3 + \dots \pm n \operatorname{tg} x^{n-1}}{1 - \binom{n}{2} \operatorname{tg} x^2 + \dots \pm \operatorname{tg} x^n}$ für gerades n ,
 $\operatorname{tg} nx = \frac{n \operatorname{tg} x - \binom{n}{3} \operatorname{tg} x^3 + \dots \pm \operatorname{tg} x^n}{1 - \binom{n}{2} \operatorname{tg} x^2 + \dots \pm n \operatorname{tg} x^{n-1}}$ für ungerades n .

Anhang 3.

	φ	x_1	x_2
1.	42°	+ 0,69127	— 4,69127
2.	67° 8'	360,32	818,32
3.	55° 24'	136,61	495,61
4.	10° 0'	25,284	3303,3
5.	5° 40'	0,815	129,815
6.	37° 42'	72,04	618,04
7.	78° 27' 47"	0,2	0,3
8.	84° 29' 50",9	99	120
9.	34° 30' 0",0	— 1035,2	+ 10737,25
10.	29. 28.	2,9715	42,971
11.	31. 23.	1,7136	21,7136
12.	31. 28.	4,3102	54,3102
13.	84. 5. 25,4	0,43563	0,53563
14.	18. 32. 57,2	0,2	7,5
15.	66. 25. 19.	3	7
16.	8. 5. 22,4	0,02	4

	φ	x_1	x_2
17.	21° 6' 0'',0	— 1,8762	— 48,3238
18.	31. 47. 18,2	0,3	3,7
19.	43.	1,34325	8,65675
20.	52.	96,081	403,919
21.	25. 56. 30,2	+ 0,6045	+ 11,3955
22.	58. 39.	239,87	760,13
23.	67. 40.	2,4801	5,5199
24.	10. 40. 49,3	0,1619	18,5296
25.	68° 0' 13'',2	— 5 ± 12,377 i	
26.	65. 12. 35,6	— 5 ± 10,826 i	
27.	66. 31. 45,4	2,5 ± 5,758 i	
28.	68. 25. 54,3	1 ± 2,530 i	

	x_1	x_2		x_1	x_2
29.	— 13	— 13	37.	25,1	0,8
30.	— 0,9768	— 1,2345	38.	0,01	— 9,87
31.	— 1	— 0,5	39.	7,5	— 0,2
32.	+ 0,588285	+ 0,588285	40.	± 3	± $\sqrt{-14}$
33.	2	1	41.	4	1
34.	5	4	42.	2	— 3
35.	2	— 6	43.	306,8415	4,1585
36.	— 5	— 6			

51. $\sin 2\varphi = 2\sqrt{b}:a$, $\varphi = 37^\circ 40'$, $x = 12$, $y = 20,137$.

Für imaginäre Wurzeln wäre $\cos \varphi = a:2\sqrt{b}$ zu setzen.

52. $\tan 2\varphi = 2\sqrt{b}:a$, $\varphi = 12^\circ 20'$, $x = -0,28903$, $y = 5$.

53. $\sin 2\varphi = 2n:m$, $6^\circ 20' 24'',6$; 1,1; 9,9.

54. $\cos(45^\circ - \varphi) = n:\sqrt{2m}$, $40^\circ 14' 11''$; 1,1; 1,3.

55. $\cos 2\varphi = n:m$; $x = \sqrt{p \cdot \cotg \varphi}$; $\varphi = 36^\circ 52' 11'',6$;
 $x = \pm 6$, $y = \pm 8$.

56. $\cotg \frac{1}{2}\varphi = \sqrt{a:b}$, $x = m:\sin \varphi$; $53^\circ 7' 48'',7$; 30; 18.

57. $\cotg 2\varphi = -a:2\sqrt{b}$, $x = \sqrt{b} \cdot \tan \varphi$,
 $y = \sqrt{b} \cdot \cotg \varphi$.

58. $\sin(\varphi - 45^\circ) = n:\sqrt{2m}$, $x = \sqrt{m} \sin \varphi$,
 $y = \sqrt{m} \cdot \cos \varphi$.

59. $\cotg \frac{1}{2} \varphi = \sqrt{a:b}$, $x = m : \sqrt{1 + \cos \varphi^2}$, $y = x \cdot \cos \varphi$,
oder $\cotg (45^\circ - \varphi) = a:b$, $x = m \cos \varphi$, $y = m \sin \varphi$.

60. $\sin 2 \varphi = \frac{2q}{nb^2 - aq}$, $x = \sqrt{\frac{q}{n}} \operatorname{tg} \varphi$, $y = \sqrt{\frac{q}{n}} \cotg \varphi$.

61. $\operatorname{tg} (\varphi - \psi) = a$, $\sin (\varphi + \psi) = b$, $x = \operatorname{tg} \varphi$, $y \operatorname{tg} \psi$.

62. $\sin 2 \varphi = -2\sqrt{b-2}:a$, $\sin \psi = -\sqrt{4:(b-2)} \operatorname{tg} \varphi$,
 $\sin \psi' = -\sqrt{4:(b-2)} \cotg \varphi$, $x' = -\operatorname{tg} \frac{1}{2} \psi$,
 $x'' = -\cotg \frac{1}{2} \psi$, $x''' = -\operatorname{tg} \frac{1}{2} \psi'$, $x'''' = -\cotg \frac{1}{2} \psi'$.
Für imaginäre Wurzeln $\cos \psi = \sqrt{\frac{1}{4}(b-2)} \operatorname{tg} \varphi$ oder
 $\sqrt{\frac{1}{4}(b-2)} \cotg \varphi$.

Oder $\tan 2 \varphi = -\frac{2\sqrt{2-b}}{a}$, $\sin \psi = \sqrt{\frac{4}{2-b}} \cotg \varphi$,

$\sin \psi' = -\sqrt{\frac{4}{2-b}} \operatorname{tg} \varphi$, x wie vorher. Für imagi-

näre Wurzeln $\cos \psi = -\frac{1}{2}\sqrt{2-b} \operatorname{tg} \varphi$ und

$\cos \psi = +\frac{1}{2}\sqrt{2-b} \cotg \varphi$, $x = \cos \psi \pm i \sin \psi$.

	φ	ψ	ψ'	x'	x''	x'''	x''''
α)	51° 40' 14",0	30° 0' 2",7	306° 52' 17",6	+ 2	+ 0,5	- 0,26795	- 3,73205
β)	17. 32. 54,5	36. 52. 11,4	80. 24. 21,1	+ 3	- 0,3333	0,1667	$\pm 0,9860i$
γ)	54. 28. 22,6	11. 18. 27,6	247. 22. 48,0	+ 5	+ 0,2	- 10,101	- 0,099
δ)	54. 28. 22,6	191. 44. 6,9	247. 22. 37,5	+ 9,7306	+ 0,1028	+ 1,5	+ 0,66667
ε)	26. 19. 30	25. 1. 33,5	212. 3. 36,9	+ 9,5352	+ 0,1048	+ 1,8050	+ 0,554.
ζ)	33. 33,30	253. 45. 0		0,4583 \pm	0,8889 i		

63. $x = \pm 1$ und $x^4 + ax^3 + (b+1)x^2 + ax + 1 = 0$.
Vergl. 62.

Die reellen Wurzeln der Aufgaben 64—110 sind:

64. 15. 65. 6. 66. 7. 67. 7. 68. — 11. 69. — 4.
70. 4,0777. 71. 4,3847. 72. 9. 73. — 144. 74. 1,0634 m .
75. — 7,6825. 76. — 6,0221. 77. 3. 78. 10. 79. 21.
80. — 7. 81. 7. 82. — 9,4890. 83. — 10,7343.
84. — 11,8273. 85. 5. 86. 12. 87. 3,5. 88. — 1; — 2;
+ 3. 89. — 5; + 7; — 2. 90. — 9; + 6; + 3.
91. — 12; + 8; + 4. 92. + 22; — 11; — 11. 93. — 0,4;
+ 0,3; + 0,1. 94. — 1,234; — 5,678; + 6,912. 95. 0,97;
3; — 3,97. 96. 2; 1,45; — 3,45. 97. — 2; 3,4495; — 1,4495.

98. 0,34730; 1,53208; — 1,87938. 99. $\sin 3\varepsilon = a$, $x_1 = \sin \varepsilon$.
 100. 8,2. 101. — 4. 102. 5. 103. 8. 104. 13; 13; 13.
 105. 2; 4; 6. 106. — 7; — 5; — 3. 107. 9; — 2; + 3.
 108. 11; — 7; — 6. 109. 2,3; 4,6; 5,9. 110. 0,003;
 — 1,468; — 214.

$$111. \operatorname{tg} \varphi = \sqrt{b : a}, x = \sqrt{a} : \cos \varphi.$$

$$112. \cos \varphi = \sqrt{b : a}, x = \sqrt{a} \cdot \sin \varphi.$$

$$113. \operatorname{tg} \varphi = \sqrt{b : a}, \cos \psi = \sqrt{d : c}, \\ \sin \vartheta = \sqrt{c : a} \cdot \cos \varphi \cdot \sin \psi, x = a \cos \vartheta^2 : \cos \varphi^2.$$

$$114. \operatorname{tg} \varphi = \sqrt{b : a}, x = \cos 2\varphi, \text{ oder } \operatorname{tg} \psi = b : a, \\ x = \operatorname{tg} (45^\circ - \psi).$$

$$115. \operatorname{cotg} \varphi = a, x = \cos 2\varphi.$$

$$116. \operatorname{tg} \varphi = \sqrt{b : a}, \operatorname{tg} \psi = \sqrt{\cos 2\varphi}, x = 2a \cos (45^\circ - \varphi).$$

$$117. \cos \varphi = \sqrt{b : a^n}, x = \sqrt{a^n \sin \varphi^2}.$$

$$118. \operatorname{tg} \varphi = b : a, x = a : \cos \varphi.$$

$$119. \cos \varphi = 2 \cos \alpha \sqrt{ab} : (a + b), x = (a + b) \sin \varphi.$$

$$120. \operatorname{cotg} (45^\circ - \varphi) = \frac{a \sin \alpha}{b \sin \beta}, x = \frac{a \sqrt{2} \sin \alpha}{\cos (45^\circ - \varphi)}.$$

$$121. \operatorname{cotg} (\varphi - 45^\circ) = \frac{a \cos \alpha}{b \cos \beta}, x = \frac{a \sqrt{2} \cos \alpha}{\cos (\varphi - 45^\circ)}.$$

$$122. \cos 2\varphi = b \operatorname{tg} \beta : a \operatorname{tg} \alpha, \\ x = b \cdot \operatorname{tg} \beta \cdot \operatorname{tg} 2\varphi = a \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \sin 2\varphi.$$

$$123. \operatorname{tg} \varphi = \frac{a}{b}, x = \frac{a}{\sin \varphi} \sin (\varphi + \frac{1}{2}\alpha) \sqrt{2 \operatorname{tg} \alpha}.$$

$$127. 42^\circ 20' 47'', 2. \quad 128. 108^\circ 36' 13'', 8; 1,6242r.$$

$$129. 66^\circ 10' 23'', 5. \quad 130. 132^\circ 20' 47''. \quad 131. 84^\circ 53' 38'', 8.$$

$$132. 149^\circ 16' 27''. \quad 133. 66^\circ 46' 54'', 3.$$

$$134. 45^\circ 54' 52'', 6. \quad 135. 40^\circ 12' 10''. \quad 136. 69^\circ 30' 2'', 1.$$

$$137. 66^\circ 46' 54'', 3. \quad 138. 54^\circ 22' 18'', 7.$$

$$148. \sqrt{-\frac{1}{4}p + \sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}} \cdot \sqrt[3]{1}.$$

§. 13.

$$1. \quad 2 \sin \frac{1}{2}\alpha; \text{ a) } 0,73355; \text{ b) } 1,21992; \text{ c) } 1,76844.$$

$$2. \quad 2r \sin \frac{1}{2}\alpha; \text{ a) } 2; \text{ b) } 28,784; \text{ c) } 4.$$

3. $\sin \frac{1}{2}\alpha = \frac{1}{2}s$; a) 44° ; b) 124° .
 4. $\sin \frac{1}{2}\alpha = s : 2r$; 67° . 5. $2r = \frac{d}{\sqrt{2} \sin(45^\circ - \frac{1}{2}\gamma)}$.
 6. $1 : 1,0107$. 7. $38^\circ 56' 33'', 3$. 8. $0,95885 : 1$.
 9. $10,252$. 10. $s : 2 \sin \alpha = 6,2494$. 11. $64,349$.
 12. $2,580$ oder $397,427$. 13. b) $15,569$; $4285,231$.
 14. a) 120° ; b) $61^\circ 26' 37'', 3$; $28^\circ 6' 37'', 3$.
 15. $2,8148$; $3,90615$; $2,25363$.
 16. a) 10 ; 36 . b) $1034,15$; $3962,9$.
 17. $\sqrt{2} - 1 : 1 = 0,41421 : 1$.
 18. $\frac{P}{2\pi} \cos \frac{m \cdot 180^\circ}{m+n} = 15,279$.
 19. a) $89^\circ 45'$; b) $89^\circ 52' 30''$.

§. 14.

1. 8. 2. $\sqrt{\frac{1}{4} F \cdot \operatorname{tg} 25^\circ 42' 51'', 4} = 3,45$.
 3. $\sqrt{\frac{2a}{9 \cdot \sin 40^\circ}} = 10$. 4. $\frac{1}{72} u^2 \cdot \cotg 10^\circ = 835$.
 5. $\frac{1}{8} a \cdot \frac{\sin 32^\circ 43' 38'', 2}{\sin 72^\circ} = 4,15$.
 6. $\frac{10 \cdot \cotg 20^\circ}{9 \cdot \cotg 18^\circ} = 0,9919 : 1$.
 7. $\sqrt{a : (5 \cdot \cotg 9^\circ - \frac{100}{11} \cotg (\frac{180}{11})^\circ)} = 22$.
 8. $18 \varrho^2 \operatorname{tg} 10^\circ = 76,6$. 9. $17 r^2 \operatorname{tg} \alpha \sin \alpha^2 = 0,4$.
 10. $2 : 3$.

§. 15.

1. $\frac{1}{2} d^2 \cdot \sin 2\alpha = 41274$.
 2. $51^\circ 52' 43'', 7$; $38^\circ 7' 16'', 3$.
 3. $\operatorname{tg} \frac{1}{2}\alpha = d : d_1$; 10° ; 170° . 4. $b = F : a \sin \alpha$; 83 .
 5. $\operatorname{tg} \frac{1}{2}\alpha = a : b$; 32° ; 148° . 6. $\sin \frac{1}{2}\alpha = r : a$; 42° .
 7. $\sin \frac{1}{2}\alpha = (R - r) : d$; 58° . 8. $\sqrt{2} : 1$.
 9. $1472157 : 2160000$.
 10. $\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{b}{a}$, $\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{ab}{a^2 + 2b^2}$, $\operatorname{tg} \alpha_3 = \frac{ab}{a^2 + 6b^2}$;
 $162 : 66,3657 : 29,2682$.

11. $\frac{1}{2} d^2 \sin \alpha = 129,8$. 12. $\operatorname{tg} \alpha = 2\sqrt{2}$; $70^\circ 31' 44''$.
 13. $\sin \frac{1}{2} \alpha = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{n}{m}}$; $\alpha = 68^\circ$. 14. $1 : 2 \sin \frac{1}{2} \beta$; $7 : 1$.
 15. 149. 16. $\operatorname{tg} \alpha = 4F : (a^2 - b^2)$; $\alpha = 41^\circ$.
 17. $d = c \sin \alpha : \sin \beta = 14$, $b = 25$.
 18. $\alpha = 63^\circ 30'$, $\beta = 26^\circ 30'$.
 19. $x = 2a \operatorname{tg} \frac{1}{2} \beta \cdot \operatorname{tg} (45^\circ - \frac{1}{4} \beta) = 15,396$.
 20. 130° . 21. $\frac{c^2}{4} (\pi - 2)$. 22. 60,153; — 5,1158.
 23. $36^\circ 52' 11'', 6$; $53^\circ 7' 48'', 4$.
 24. $\operatorname{tg} \varphi = \pm \frac{n+m}{n-m}$; $77^\circ, 103^\circ$. 26. a) 4,8741, b) 4,09.
 27. $\cos \frac{1}{2} \alpha : \cos \frac{1}{6} \alpha$; $1 : 1,87938$.
 28. a. $\operatorname{tg} \alpha$; a) 71; b) 35,3; c) $33\frac{1}{2}$.
 29. b. $\operatorname{tg} \alpha - a = 179,5$. 30. a. $\operatorname{tg} \beta = 20$.
 31. a. $\operatorname{cotg} \alpha = 364$; 365.
 32. $(a - b) \cdot \operatorname{cotg} \varphi$; $\frac{a-b}{\sin \varphi}$; 39,6; 44,5.
 33. $a - b \cdot \operatorname{tg} \alpha = 50$.
 34. $\operatorname{tg} \varphi = \sqrt{\frac{3b-2a}{b+2a}}$, $\varphi = 5^\circ 41', 6$; $x = a \cdot \operatorname{tg} \varphi = 29,9$.
 35. $17^\circ 45'$. 36. a) $63^\circ 26' 5'', 7$; b) $26^\circ 33' 54'', 3$.
 37. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{n}{n-1}$; $48^\circ 0'$.
 38. a. $\operatorname{cotg} \alpha$; a) 27,598; b) 6,173; c) 5,1395.
 39. 5,5469; 40,1580. 40. $h : l = \operatorname{cotg} \varphi$; $51^\circ 41' 2'', 3$.
 41. a) $\frac{a \cdot \sin (\alpha - \beta)}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$; 14,1. b) 0,3. 42. $0^\circ 1' 8'', 76$.
 43. 98,218 mal. 44. $0^m, 004848$. 45. $7^\circ 12' 16'', 6$.
 46. 46410^m. 47. 3829,5 Meilen. 48. 9,3001 Meilen.
 49. 66° . 50. 285. 51. 1904 ,3. 52. 4610^m, 7.
 53. $\sqrt{a(2r \cdot 7420,16 + a)}$ Meter. 54. 53,201 □ Ml.
 55. $2^\circ 12'$; 4281. 56. a) 8748^m; b) 36120^m.
 57. 99^m, 234. 58. 7791^m. 59. 77,74 M.
 60. 192308 M. 61. $0^\circ 16' 0'', 48$. 62. 111,86 mal.
 63. 51808,7 M.; 234,21 M. 64. 399,225 mal.

65. $23^{\circ} 51' 55''$. 66. $23^{\circ} 50'$. 67. $6^{\circ} 22' 45'', 6$.
68. $\frac{r \cdot \cos \varphi \cdot (b-a) \pi}{180^{\circ}} = 20 \text{ Ml.}$
69. $\frac{a \cos \alpha \cos \beta}{\sin (\beta - \alpha)}$; 20^{m} . 70. $\frac{h \sin (\alpha - \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} = 12$.
71. $\operatorname{tg} \alpha = h : d$, $x = d \operatorname{tg} (\alpha + z) - h = 1^{\text{m}}, 358$.
72. $\sqrt{d (a \cot \beta - d) + \frac{1}{4} a^2} - \frac{1}{2} a = 750^{\text{m}}$.
73. $h = \frac{1}{2} a \sqrt{2} \cdot \operatorname{tg} \alpha$; $x = \alpha$; 1700^{m} .
74. $h = a \operatorname{tg} \alpha : (\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha)$; $d = h \cot \alpha$; $h = 500$, $d = 2000$.
75. $h \sin (\alpha - \beta) : \cos \alpha \sin \beta$; 3.
76. $\operatorname{tg} \varphi = \frac{a}{b} \sin 67^{\circ} 30'$; 29° .
77. $2a - b + d \operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \varphi = 35$.
78. 0,4. 79. $\sin \alpha = \frac{1}{n}$. 80. $\sin \alpha = b^2 \sqrt{2} : 2a^2$.
81. $\frac{1}{2} \sqrt{2} \cdot h \cot \alpha$. 82. $\sin x = b \operatorname{tg} \alpha : h$.
83. $a \operatorname{tg} \alpha : \sqrt{2}$; 1,043. 84. $4^{\circ} 34' 52''$.
85. $10000 : 2882 = 3,4698 : 1$; $73^{\circ} 15'$.
86. $a \sin \alpha$; $a \cos \alpha$; 3; 4.
87. $R = 100$, $\alpha = 223^{\circ}$.
88. $p \sin \alpha = 13,6$; $p \cos \alpha = 27,3$.
89. $P = \sqrt{p^2 + q^2} = 139,02$; $\operatorname{tg} \alpha = p : q$; $\alpha = 44^{\circ}$.
90. 2,3334 Kgr. 91. 22° .
92. $\frac{1}{2} g t^2 \sin \alpha = 10^{\text{m}}$. 93. 38° .
94. $x = ap \sin \alpha : q \sin \beta$; $D = \sqrt{p^2 + q^2 + 2pq \cos (\alpha + \beta)}$.
95. 0,174312. 96. $0^{\circ} 42' 58'', 4$. 97. $73^{\circ} 18' 2'', 6$.
98. $17^{\circ} 15'$. 99. $a^{\text{m}} \cdot \cos \alpha$.
100. $x = \frac{\alpha \pi}{180^{\circ}} \cdot \frac{r}{a}$; $\sin \frac{1}{2} \alpha = \frac{b}{2r}$. 101. 6.
102. $5^{\circ} 8' 33'', 8$ für $p = 9$. 103. 0,083624; $3^{\circ} 10' 47'', 4$.
104. $1^{\text{m}}, 1048$. 105. $c \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta : \sin (\beta - \alpha)$.
106. 2650,4. 107. $a : \cos \alpha$.

§. 16.

1. $h = \frac{1}{2} c \cdot \sin 2\alpha = 54,6$; $q = c \cdot \cos \alpha^2 = 82,81$;
 $p = c \cdot \sin \alpha^2 = 36$.
2. a) $\frac{1}{2} a^2 \cotg \alpha$; b) $\frac{1}{2} a^2 \tg \beta$; c) $\frac{1}{2} c^2 \sin 2\alpha$.
3. a) $a \sqrt{2} \cdot (45^\circ - \frac{1}{2}\alpha) : 2 \cos \frac{1}{2}\alpha = 33$;
b) $c \sqrt{2} \cdot \sin \frac{1}{2}\alpha \cdot \sin (45^\circ - \frac{1}{2}\alpha) = 13$.
4. $a : (1 + \tg \frac{1}{2}\beta) = 34$.
5. a) $\frac{1}{2} a \sqrt{1 + 4 \cotg \alpha^2} = 241$;
b) $\frac{1}{2} b \sqrt{4 + \tg \alpha^2} = 289$;
c) $\frac{1}{2} c \sqrt{1 + 3 \cdot \cos \alpha^2} = 421$.
6. $a \cdot \cot \alpha : \cos \frac{1}{2}\alpha = b : \cos \frac{1}{2}\alpha = c \cos \alpha : \cos \frac{1}{2}\alpha = 257$.
7. 109; $56^\circ 36' 4'', 4$; $21^\circ 58' 39'', 3$.
8. $\sin \frac{n\alpha}{m+n} \cos \alpha : \sin \frac{m\alpha}{m+n} = 65$;
 $\sin \frac{m\alpha}{m+n} : \sin \frac{n\alpha}{m+n} \cos \alpha = 43,113 : 1$.
9. $\frac{m}{m+n} c \cdot \cotg \alpha$; $m : n = \sin \alpha : (\sqrt{2} - \sin \alpha)$.
10. $2 \sin 54^\circ : 1 = 1,61804 : 1$.

§. 17.

1. $\tg \beta = h : p = \cotg \alpha$; $\alpha = 3^\circ 3' 22'', 0$;
 $\beta = 86^\circ 56' 38'', 0$; $a = \sqrt{p^2 + h^2} = p : \cos \beta = 89,608$;
 $c = (p^2 + h^2) : p = p : \cos \beta^2 = 1680,77$;
 $b = h \sqrt{p^2 + h^2} : p = p \sin \beta : \cos \beta^2 = 1678,38$;
 $F = \frac{1}{2} ab = h (p^2 + h^2) : 2p = 75198,3$.
2. $\sin \beta = h : a$, $\beta = 55^\circ 17' 31''$; $\alpha = 34^\circ 42' 29''$;
 $b = ah : \sqrt{a^2 - h^2} = a \tg \beta = 231$;
 $c = a^2 : \sqrt{a^2 - h^2} = a : \cos \beta = 281$;
 $F = \frac{1}{2} ab = \frac{1}{2} a^2 h : \sqrt{a^2 - h^2} = 18480$.
3. $\cos \beta = p : a$, $\beta = 36^\circ 52' 11'', 6$, $\alpha = 53^\circ 7' 48'', 4$;
 $c = a^2 : p = a : \cos \beta = 2,5$;
 $b = a \sqrt{a^2 - p^2} : p = a \tg \beta = 2$;
 $F = \frac{1}{2} ab = \frac{1}{2} a^2 \sqrt{a^2 - p^2} : p = 1,5$.

4. $\beta = 22^{\circ} 37' 11'', 5$; $b = h : \sin \alpha = 65$;
 $a = b \operatorname{tg} \alpha = h : \cos \alpha = 156$;
 $c = b : \cos \alpha = 2h : \sin 2\alpha = 169$;
 $F = \frac{1}{2} ch = h^2 : \sin 2\alpha = 5070$.
5. $\beta = 61^{\circ} 55' 39'', 1$; $a = p : \sin \alpha = 136$;
 $b = p \cos \alpha : \sin \alpha^2 = 255$; $c = p : \sin \alpha^2 = 289$;
 $F = \frac{1}{2} p^2 \cos \alpha : \sin \alpha^3 = 17340$.
6. $\operatorname{tang} \alpha = m : n$, $\alpha = 47^{\circ} 15' 31'', 5$;
 $a = cm : \sqrt{m^2 + n^2} = 2,016$; $b = cn : \sqrt{m^2 + n^2} = 1,863$;
 $F = \frac{1}{2} c^2 mn : (m^2 + n^2) = 1,877904$.
7. $\operatorname{tang} \alpha = m : n$, $\alpha = 73^{\circ} 44' 23'', 3$;
 $a = h \sqrt{m^2 + n^2} : n = 600$;
 $b = h \sqrt{m^2 + n^2} : m = 175$; $c = h (m^2 + n^2) : mn = 625$;
 $F = \frac{1}{2} h^2 (m^2 + n^2) : mn = 52500$.
8. $\alpha = 45^{\circ} + \frac{1}{2} \delta = 87^{\circ} 3' 44'', 6$; $\beta = 45^{\circ} - \frac{1}{2} \delta = 2^{\circ} 56' 15'', 4$;
 $a = c \sin \alpha = 22,80$; $b = c \cos \alpha = 1,17$;
 $F = \frac{1}{2} c^2 \cos \delta = 13,338$.
9. $b = 2F : a = 2,07$; $c = \sqrt{a^2 + 4F^2} : a^2 = 3,05$;
 $\operatorname{tang} \alpha = a^2 : 2F$, $\alpha = 47^{\circ} 15' 31'', 5$, $\beta = 42^{\circ} 44' 28'', 5$.
10. $a = \sqrt{p \cdot c} = 100$; $b = \sqrt{c(c-p)} = 621$;
 $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{p : (c-p)}$, $\alpha = 9^{\circ} 8' 52'', 3$,
 $\beta = 80^{\circ} 51' 7'', 7$; $F = \frac{1}{2} c \sqrt{p(c-p)} = 31050$.
11. $a = \frac{1}{2} \sqrt{c(c+2h)} + \frac{1}{2} \sqrt{c(c-2h)} = 187$;
 $b = \frac{1}{2} \sqrt{c(c+2h)} - \frac{1}{2} \sqrt{c(c-2h)} = 84$;
 $\sin 2\alpha = 2h : c$, $\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = \sqrt{(c-2h) : (c+2h)}$;
 $\alpha = 65^{\circ} 48' 37'', 7$, $\beta = 24^{\circ} 11' 22'', 3$;
 $F = \frac{1}{2} ch = 7854$.
12. $a = \sqrt{\frac{1}{2} c(c+d)} = 35$; $b = \sqrt{\frac{1}{2} c(c-d)} = 12$;
 $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{(c+d) : (c-d)}$, $\alpha = 71^{\circ} 4' 31'', 3$,
 $\beta = 18^{\circ} 55' 28'', 7$; $F = \frac{1}{4} c \sqrt{c^2 - d^2} = 210$.
13. $c = 2\sqrt{\frac{1}{4} a^2 + \frac{1}{16} d^2} - \frac{1}{4} d = 481$; $b = \sqrt{c^2 - a^2} = 319$;
 $\sin \alpha = a : c$, $\alpha = 48^{\circ} 27' 19'', 7$, $\beta = 41^{\circ} 32' 40'', 3$;
 $F = \frac{1}{2} ab = 57420$.

14. $c = \sqrt{d^2 + 4h^2} = 210,232$; $\tan 2\alpha = -\frac{2h}{d}$.
 $a = \sqrt{\frac{1}{2}c(c+d)} = 207,348$;
 $b = \sqrt{\frac{1}{2}c(c-d)} = 34,773$;
 $\alpha = 80^\circ 28' 47'', 7$; $F = 3605$.
15. $b = \sqrt{\frac{2\pi F}{\pi}} = 17,5$; $a = \sqrt{\frac{2mF}{\pi}} = 28,8$;
 $c = \sqrt{\frac{2(m^2 + \pi^2)F}{\pi\pi}} = 33,7$, $\tan \alpha = \frac{m}{\pi}$,
 $\alpha = 58^\circ 42' 55'', 8$, $\beta = 31^\circ 17' 4'', 2$.
16. $a = \frac{1}{2}s + \sqrt{\frac{1}{4}s^2 - 2F} = 352$;
 $b = \frac{1}{2}s - \sqrt{\frac{1}{4}s^2 - 2F} = 135$;
 $c = \sqrt{s^2 - 4F} = 377$, $\sin 2\alpha = 4F : (s^2 - 4F)$,
 $\alpha = 69^\circ 1' 1'', 4$, $\beta = 20^\circ 58' 58'', 6$.
17. $a = \sqrt{ps + \frac{1}{4}p^2} - \frac{1}{2}p = 28,545$;
 $c = s + \frac{1}{2}p - \sqrt{ps + \frac{1}{4}p^2} = 29,929$;
 $b = 8,996$; $\alpha = 72^\circ 30' 27'', 6$, $\beta = 17^\circ 29' 32'', 4$;
 $F = 128,395$ (41).
18. $c = \frac{s^2}{2s-q} = 342,25$; $a = \frac{s(s-q)}{2s-q} = 192,40$;
 $b = s\sqrt{\frac{q}{2s-q}} = 283,05$; $F = 27229,4$.
19. $a = \frac{1}{2}s + \frac{1}{2}\sqrt{2c^2 - s^2} = 416$;
 $b = \frac{1}{2}s - \frac{1}{2}\sqrt{2c^2 - s^2} = 87$, $\cos(\alpha - 45^\circ) = s\sqrt{2} : 2c$,
 $\alpha = 78^\circ 11' 15'', 8$, $\beta = 11^\circ 48' 44'', 2$. $F = 18096$.
20. $c = \frac{s^2 + b^2}{2s} = 5,86$; $a = \frac{s^2 - b^2}{2s} = 1,36$; $\sin \alpha = \frac{s^2 - b^2}{s^2 + b^2}$,
 $\alpha = 13^\circ 25' 10'', 8$, $\beta = 76^\circ 34' 49'', 2$, $F = 3,876$.
21. $c = s\sqrt{2} : 2 \cos(\alpha - 45^\circ) = 305$; $a = 136$; $b = 273$;
 $\beta = 63^\circ 31' 8'', 3$; $F = 18564$.
22. $c = s : 2 \cos \frac{1}{2}\beta^2 = 6,50$; $a = 4,08$; $b = 5,06$;
 $F = 10,3224$.
23. $\sin \alpha = \frac{\pi}{m}$, $\alpha = 50^\circ 24' 8'', 1$, $\beta = 39^\circ 35' 51'', 9$;
 $a = \frac{\pi s}{\pi + \sqrt{m^2 - \pi^2}} = 81,6$; $c = \frac{\pi s}{\pi + \sqrt{m^2 - \pi^2}} = 105,9$;
 $b = 67,5$; $F = 2754$.

24. $\cos(\alpha - 45^\circ) = s\sqrt{2} : 2a$; $\alpha = \beta = 45^\circ$,
 $b = a = 6\sqrt{2}$, $c = 12$, $F = 36$.
25. $a = s\sqrt{2} : 2 \cos(\alpha - 45^\circ) = 2$; $b = 3$;
 $c = 3,6055$; $F = 3$.
26. $a = \frac{s^2 + p^2}{2s} = 3$; $\sin \alpha = \frac{2ps}{s^2 + p^2}$, $\operatorname{tg} \frac{1}{2} \alpha = \frac{p}{s}$,
 $\alpha = 35^\circ 15' 52'', 9$;
 $b = 3\sqrt{2} = 4,24264$; $c = 3\sqrt{3} = 5,19615$;
 $F = 4,5\sqrt{2} = 6,36396$.
27. $a = s : 2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2 = 5$; $b = 9$; $c = 10,2957$; $F = 22,5$.
28. $a = u \sin \frac{1}{2} \alpha : \sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ - \frac{1}{2} \alpha) = 3,4$;
 $b = 1,89$; $c = 3,89$; $F = 3,2130$.
29. $a = d \cos \frac{1}{2} \alpha : \sqrt{2} \cdot \sin(45^\circ - \frac{1}{2} \alpha) = 40,8$;
 $b = 14,5$; $c = 43,3$; $F = 295,8$.
30. $c = -d : \cos 2\alpha = 17,6917$; $a = 13$; $b = 12$; $F = 78$.
31. $c = 2\sqrt{F} : \sin 2\alpha = 48,5$; $a = \sqrt{2F} : \cotg \alpha = 47,6$;
 $b = \sqrt{2F} : \operatorname{tg} \alpha = 9,3$.
32. $\cos \alpha = (\sqrt{p^2 + 4b^2} - p) : 2b$, $\alpha = 19^\circ$;
 $c = \frac{1}{2}(\sqrt{p^2 + 4b^2} + p) = 24,7344$;
 $a = 8,0527$; $F = 94,1625$.
33. $b = \varrho(1 + \cotg \frac{1}{2} \alpha) = \varrho\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ - \frac{1}{2} \alpha) : \sin \frac{1}{2} \alpha = 323$;
 $a = \varrho\sqrt{2} \cdot \cos \frac{1}{2} \alpha : \sin(45^\circ - \frac{1}{2} \alpha) = 36$;
 $c = \varrho\sqrt{2} : 2 \sin \frac{1}{2} \alpha \sin(45^\circ - \frac{1}{2} \alpha) = 325$;
 $F = \varrho^2 \cot \frac{1}{2} \alpha \operatorname{tg}(45^\circ + \frac{1}{2} \alpha) = 5814$.
34. $\cos(\alpha - 45^\circ) = \frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot (h - \varrho) : \varrho$, $\alpha = 58^\circ 27' 6'', 4$;
 $c = 2\varrho^2 : (h - 2\varrho) = 349$; $a = 299$, $b = 180$,
 $F = 26910$.
35. $c = \frac{F - \varrho^2}{\varrho} = 37,3$; $a = \frac{1}{2} \cdot \frac{F + \varrho^2}{\varrho} + \frac{1}{2}\sqrt{c^2 - 4F} = 27,5$;
 $b = \frac{1}{2} \cdot \frac{F + \varrho^2}{\varrho} - \frac{1}{2}\sqrt{c^2 - 4F} = 25,2$;
 $\cos(\alpha - 45^\circ) = (F + \varrho^2)\sqrt{2} : 2(F - \varrho^2)$; $\alpha = 47^\circ 29' 56'', 4$.
36. $\sin 2\alpha = \frac{2h}{s^2}(h + \sqrt{s^2 + h^2})$, $\alpha = 29^\circ$;
 $a = h : \cos \alpha = 201,195$; $b = h : \sin \alpha = 362,967$;
 $c = 2h : \sin 2\alpha = 415$; $F = 36514$.

37. $\sin 2\alpha = \frac{2h}{d^2} (\sqrt{d^2 + h^2} - h)$, $\alpha = 2^\circ$;
 $a = h : \cos \alpha = 1,5356$; $b = h : \sin \alpha = 43,9730$;
 $c = 2h : \sin 2\alpha = 44$; $F = 33,7623$.
38. $\cot 2\alpha = -\frac{1}{4} d^2 : F$, $c^2 = 4F : \sin 2\alpha$;
 $\alpha = 46^\circ 54' 46$, $\beta = 43^\circ 5' 54$,
 $c = 25,507$, $a = 18,627$, $b = 17,426$.
39. $\cos (\alpha - 45^\circ) = f : d\sqrt{2}$, $\alpha = 68^\circ 8'$;
 $c = -f : \cos 2\alpha = 80,544$;
 $a = 74,748$; $b = 29,998$; $F = 1121,16$.
40. $c = s - 2\varrho = 349,002$; $\sin (45^\circ + \alpha) = \frac{1}{2} s\sqrt{2} : (s - 2\varrho)$,
 $a - b = \sqrt{s^2 - 8\varrho s + 8\varrho^2}$, $a = 339$, $b = 82,952$;
 $\alpha = 76^\circ 15'$; $F = \varrho (s - \varrho) = 167,694$.
41. $\cot \frac{1}{2} \alpha = (2\varrho - d + \sqrt{8\varrho^2 + d^2}) : 2\varrho$;
 $\alpha = 70^\circ 35' 46''$, $b = 10,6835$;
 $a = 30,3258$, $c = 32,152$; $F = 161,99$.
42. $a = \sqrt[3]{m^2 \cdot p} = 476$; $c = m^2 : a = 485$; $b = 93$;
 $\alpha = 78^\circ 56' 41''$, $F = 22134$.
43. $c = \frac{1}{4} (s + \sqrt{8a^2 + s^2}) = 2500$; $b = 700$;
 $\alpha = 73^\circ 44' 23''$, $F = 840000$.
44. $\cos \beta = (d + \sqrt{8s^2 + 8sd + d^2}) : 4s$, $\beta = 77^\circ 58' 55''$;
 $c = (4s + d \pm \sqrt{8s^2 + 8sd + d^2}) : 2 = 365$;
 $a = 76$; $b = 357$; $F = 13566$.
45. $\cot \alpha = \sqrt{\frac{s}{p}} - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$, $\alpha = 77^\circ 4' 23''$, 7 ;
 $a = \frac{p}{\sin \alpha} = 444$, $c = 455,54$, $b = 101,91$; $F = 22623$.
46. $c = 2s : (2 + \sin 2\alpha) = 376,93$; $a = 151,97$;
 $b = 344,94$; $F = 26211$.
47. $c = (m^2 - 2\varrho^2) : 2\varrho = 397$; $\sin 2\alpha = 2m^2 : c^2$,
 $\alpha = 35^\circ 3' 4''$, 1 ; $a = 228$; $b = 325$; $F = 37050$.
48. $a = s - \sigma + \sqrt{2\sigma(\sigma - s)} = 304$; $b = s - a = 297$;
 $c = 425$; $\alpha = 45^\circ 40' 2''$, 3 ; $F = 45144$.
49. $a = s : 2 \sin \frac{3}{2} \alpha \cdot \cos \frac{1}{2} \alpha$; $b = 2a \cos \alpha$;
 a) $a = 125$, $b = 88$, $F = 5148$;
 b) $a = 2,5277$, $b = 1,7291$, $F = 2,0535$;
 c) $a = 19,946$, $b = 15,957$, $F = 145,847$.

50. $\cos \alpha = 0,6$; $\alpha = 53^\circ 7' 48'',4$; $\beta = 73^\circ 44' 23'',2$.

51. $b^3 - \frac{F}{q} b^2 + 4Fq = 0$; $b^3 - 8b^2 = -72$; $b = 6$;
 $a = 5$; $\alpha = 53^\circ 7' 48'',4$; $\beta = 73^\circ 44' 23'',2$.

52. $b^3 - \frac{u^2 - h^2}{2u} \cdot b^2 - h^2 \cdot b + \frac{uh^2}{2} = 0$;
 $169b^3 - 2842b^2 - 14400b + 259200 = 0$;
 $b = 10$; $a = 13$; $\alpha = 67^\circ 22' 48'',5$; $\beta = 45^\circ 14' 23'',0$;
 $F = 60$ oder $b = 16,2531$, $a = 9,8735$, $\alpha = 34^\circ 36',4$;
 $F = 45,5700$.

§. 19.

1. $a : \sin \alpha = b : \sin \beta = c : \sin \gamma$.

3. $\sin \frac{m \cdot 180^\circ}{m+n+p} : \sin \frac{n \cdot 180^\circ}{m+n+p} : \sin \frac{p \cdot 180^\circ}{m+n+p}$;

a) $1 : \sqrt{3} : 2 = 1 : 1,73206 : 2$.

b) $2\sqrt{2} : 2\sqrt{3} : 2 + \sqrt{6} = 0,70711 : 0,86603 : 0,96593$.

c) $0,74314 : 0,86603 : 0,95106$.

4. $\cos \alpha = \frac{n^2 + p^2 - m^2}{2np}$, $\cos \beta = \frac{m^2 + p^2 - n^2}{2mp}$,
 $\cos \gamma = \frac{m^2 + n^2 - p^2}{2mn}$.

a) $c \cdot 28^\circ 57' 17''$; $46^\circ 34' 4''$; $104^\circ 28' 39''$.

b) $c \cdot 26^\circ 23'$; $36^\circ 20'$; $117^\circ 17'$.

c) $c \cdot 14^\circ 38'$; $34^\circ 37'$; $130^\circ 45'$.

5. $\cos \beta = \frac{1}{2}a : b$; $\beta = 31^\circ 30' 0''$; $\alpha = 63^\circ 0' 0''$.

9. $a^2 + b^2 - ab$; $a^2 + b^2 - ab\sqrt{2}$.

10. $c^2 + c_1^2 = 2(a^2 + b^2)$.

19. Den Sinussatz. 20. Die Formel für $\tan \frac{1}{2} \alpha$ durch die 3 Seiten. 21. Der allg. pyth. Lehrsatz. 22. Sie ist gleich dem Radius des einbeschriebenen Kreises. 23. Den Sinussatz.

25. $\frac{\sin \frac{1}{2} \alpha}{\sin \frac{1}{2} \beta} = \sqrt{\frac{a(a-b+c)}{b(b+c-a)}}$, $\frac{\cos \frac{1}{2} \alpha}{\cos \frac{1}{2} \beta} = \sqrt{\frac{a(b+c-a)}{b(a-b+c)}}$, u. s. w.

26. $\tan \alpha = \frac{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{s(s-a) - (s-b)(s-c)}$.

§. 20.

24. $\alpha \sin \gamma : \sin (\beta + \gamma) = 300.$
25. 3989,5 und 4555,9 Schritte.
26. $a \sin \alpha : \sin \beta = 34^m.$ 27. 2; 3. 28. $d = 10, a = 5.$
29. $a = d \sin \psi : \sin (\psi + \varphi), c = d \sin \varphi : \sin (\psi + \varphi),$
 $b = a - 2c \cos (\varphi + \psi).$
30. $(a - b) \sin \beta : \sin (\alpha + \beta); (a - b) \sin \alpha : \sin (\alpha + \beta).$
31. $d = a \sin \varphi : \sin (\beta + \varphi);$
 $c = a \sin \beta \sin \varphi : \sin (\beta + \varphi) \sin \alpha;$
 $b = a \sin \beta \sin (\alpha - \varphi) : \sin (\beta + \varphi) \sin \alpha.$
32. $b = a \sin \beta : \sin (\alpha + \beta); c = a \sin (\alpha - \gamma) : \sin (\alpha + \beta);$
 $d = a \sin \gamma : \sin (\alpha + \beta); c = a \sin \alpha : \sin (\alpha + \beta);$
 $f = a \sin (\alpha + \beta - \gamma) : \sin (\alpha + \beta).$
33. $e \sin \beta : \sin (\alpha + \beta), e \sin \alpha : \sin (\alpha + \beta),$
 $e \sin \delta : \sin (\gamma + \delta), e \sin \gamma : \sin (\gamma + \delta).$
34. $\sin 26^\circ 46' : \sin 33^\circ 20' = 1,22439 : 1 = 1 : 0,81663.$
35. $x = \frac{a \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)} \cdot \frac{\sin [60^\circ - \frac{1}{3}(\alpha + \beta)]}{\sin [60^\circ + \frac{1}{3}(2\alpha - \beta)]};$
 $z = \frac{a \sin \alpha}{\sin (\alpha + \beta)} \cdot \frac{\sin [60^\circ - \frac{1}{3}(\alpha + \beta)]}{\sin [60^\circ + \frac{1}{3}(2\beta - \alpha)]}.$
 $y = a - x - z; 2000; 791,93; 856,07.$
36. $a \cos \frac{n-m}{n+m} \alpha : \cos \alpha = 10.$
37. $a \sin \gamma : 2 \cos \frac{1}{2} \beta \sin (\gamma + \frac{1}{2} \beta) = 16,86(04).$
38. $a \cos \frac{1}{2} (\beta - \gamma) : 2 \cos \frac{1}{2} \beta \cos \frac{1}{2} \gamma = 20,8333.$
39. $\sin \beta \sqrt{\frac{mac}{n \sin \varphi \sin (\beta + \varphi)}} = 13,611.$
40. $\sin \vartheta = \frac{a}{2r}, \sin (2x + \vartheta) = \frac{b}{2r}.$

§. 21.

37. 380. 38. $200^m.$
39. 8 und 7,6158; 2,7954 und 17,7628.
40. $\frac{1}{2} \sqrt{d^2 + e^2 + 2de \cos \varphi}; 32; 255; 90^\circ.$
41. $a \sqrt{\frac{\cos \frac{1}{2} (\beta - \gamma)^2}{\cos \frac{1}{2} (\beta + \gamma)^2} - \frac{\sin \beta \sin \gamma}{\sin \frac{1}{2} (\beta + \gamma)^2}}.$
42. 14; 4; $67^\circ 22' 48'', 5.$

$$43. \sqrt{c^2 + (a - b)^2 - 2c(a - b) \cos \alpha}.$$

$$44. d = \frac{a \sin \beta + b \sin (\beta + \gamma)}{\sin \gamma},$$

$$c = \frac{a \sin (\beta - \gamma) + b \sin \beta}{\sin \gamma}, \text{ u. s. w.}$$

$$45. BC = 5, DA = 5,3851, A = 116^\circ 46' 14'', 9;$$

$$B = 86^\circ 49' 15'', 8; C = 88^\circ 12' 34'', 2; D = 68^\circ 11' 55'', 1.$$

$$46. 19^\circ 6' 23'', 5; 21^\circ 47' 13'';$$

$$\sqrt{7} : 3 = 2,64575 : 3.$$

$$47. a) r = \frac{b + \frac{1}{2}a - \sqrt{b(a+b)} \cos \alpha}{\sin \alpha} = 4,038;$$

$$x^2 = t^2 + (a + b)^2 - 2(a + b)t \cos \alpha, x = 7,931.$$

$$b) r = b \sqrt{3}, F = 3b^2 \pi.$$

$$c) \frac{a + b - 2\sqrt{ab} \cdot \cos \alpha}{2 \sin \alpha^2} = 756.$$

$$48. \text{Die getheilte Seite sei } a;$$

$$x = \frac{1}{2}(a + 2b \cos \gamma \pm \sqrt{[a + 2b \cos \gamma]^2 - 8b^2}), y = a - x.$$

$$49. c^2 = R^2 + r^2 \pm 2Rr \cos \varphi; \frac{7}{6}R \text{ oder } \frac{\sqrt{19}}{5}R.$$

§. 22.

$$26. b = 92,325, e = 124,617.$$

$$27. a = 199,677, c = 235,022.$$

$$28. (a - b) \cos \alpha \pm \sqrt{c^2 - (a - b)^2 \sin \alpha^2}.$$

$$30. AB = 3,7543, CD = 7,8105, DA = 8,0726,$$

$$A = 110^\circ 0' 43'', 8; B = 100^\circ 40' 23'', 1.$$

§. 23.

$$36. 62^\circ 4' 28'', 59^\circ 52' 14'', 58^\circ 3' 18''.$$

$$37. 70^\circ, 50^\circ, 60^\circ. \quad 38. 60^\circ.$$

$$39. \frac{1}{3} \sqrt{6c^2 + 3b^2 - 2a^2} = 16,4114.$$

$$40. b = \sqrt{\frac{1}{2}(d^2 + e^2) - a^2}, \cos \alpha = (d^2 - e^2) : 4ab.$$

$$41. \cos \alpha = \frac{a^2 + c^2 - d^2}{2ac}, b = \frac{d^2 - c^2}{a}.$$

$$42. \cos \alpha = \frac{(a-b)^2 + d^2 - c^2}{2(a-b)d}, \cos \beta = \frac{(a-b)^2 + c^2 - d^2}{2(a-b)c},$$

$$c = \sqrt{\frac{a^2b - ab^2 + ac^2 + ba^2}{a-b}}, f = \sqrt{\frac{a^2b - ab^2 + ad^2 - bc^2}{a-b}}.$$

$$43. c = \sqrt{\frac{bf^2 - a^2b - ab^2 + ac^2}{a+b}}, d = \sqrt{\frac{bc^2 - a^2b - ab^2 + af^2}{a+b}},$$

$$\cos \alpha = \frac{a^2 - b^2 - c^2 + f^2}{2(a+b)d}, \cos \beta = \frac{a^2 - b^2 + c^2 - f^2}{2(a+b)c}.$$

$$45. \alpha = 88^\circ 51' 10'', \beta = 89^\circ 12' 14'', \gamma = 70^\circ 20' 46'',$$

$$\delta = 111^\circ 35' 50''.$$

§. 24.

$$32. 1050. \quad 33. 276. \quad 34. 2712. \quad 35. ab \sin \alpha.$$

$$36. \frac{1}{4}(a^2 - b^2) \tan \alpha. \quad 37. \frac{1}{4}(a+b)c \cdot \sin \alpha.$$

$$38. 1740.$$

$$43. \frac{ab+cd}{ab-cd} \sqrt{s(s-c-d)(s-b-d)(s-a-d)},$$

$$2s = a+b+c+d.$$

45. Die gegebenen Seiten schliessen im grössten Dreieck einen rechten Winkel ein.

$$46. a \cos \beta + b \cos \alpha = c. \quad 47. \frac{1}{4} a^2 \sin \beta \sin \gamma : \sin \alpha.$$

$$48. AX = 8,636, AY = 6,092'.$$

$$49. 2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma : \pi.$$

§. 26.

$$1. a) a = 2r \sin \alpha = 44, b = 2r \sin \beta = 39,$$

$$c = 2r \sin \gamma = 17.$$

$$b) h_a = 2r \sin \beta \sin \gamma = 15; h_b = 2r \sin \alpha \sin \gamma = 16,9231;$$

$$h_c = 2r \sin \alpha \sin \beta = 38,8235;$$

$$F = 2r^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma = 330.$$

$$c) h_a' = 2r \cos \alpha = -4,2; h_b' = 2r \cos \beta = 20,8;$$

$$h_c' = 2r \cos \gamma = 40,8.$$

$$d) h_a'' = 2r \cos \beta \cos \gamma = 19,2; h_b'' = 2r \cos \alpha \cos \gamma$$

$$= -3,8769; h_c'' = 2r \cos \alpha \cos \beta = -1,9765.$$

$$e) q_a = 2r \cos \beta \sin \gamma = 8; q_b = 2r \sin \alpha \cos \gamma = 40,6154;$$

$$q_c = 2r \cos \alpha \sin \beta = -3,7058; p_a = 2r \sin \beta \cos \gamma = 36;$$

$$p_b = 2r \cos \alpha \sin \gamma = -1,6154; p_c = 2r \sin \alpha \cos \beta$$

$$= 20,7058.$$

- f) $\alpha_1 = 180^\circ - 2\alpha$ oder $2\alpha - 180^\circ = 10^\circ 54' 18'', 8$;
 $\beta_1 = 180^\circ - 2\beta$ od. $2\beta = 123^\circ 51' 18'', 2$; $\gamma_1 = 180^\circ - 2\gamma$
 oder $2\gamma = 45^\circ 14' 23'', 0$.
- g) $a_1 = r \sin 2\alpha = 4,181$; $b_1 = r \sin 2\beta = 18,353$;
 $c_1 = r \sin 2\gamma = 15,693$.
- h) $F_1 = \frac{1}{2}r^2 \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin 2\gamma = 27,243$.
- i) $r_1 = \frac{1}{2}r = 11,05$.
2. a) $\varrho = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma = 9\frac{4}{5} = 9,85714$.
 b) $\varrho_a = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \cos \frac{1}{2}\beta \cos \frac{1}{2}\gamma = 161$;
 $\varrho_b = 4r \cos \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \cos \frac{1}{2}\gamma = 42$;
 $\varrho_c = 4r \cos \frac{1}{2}\alpha \cos \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma = 14$.
 c) $s = 4r \cos \frac{1}{2}\alpha \cos \frac{1}{2}\beta \cos \frac{1}{2}\gamma = 98$;
 $s - a = 4r \cos \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma = 6$;
 $s - b = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \cos \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma = 23$;
 $s - c = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \cos \frac{1}{2}\gamma = 69$.
 d) $OO_a = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha = 176,94$; $OO_b = 4r \sin \frac{1}{2}\beta = 81,598$;
 $OO_c = 4r \sin \frac{1}{2}\gamma = 29,295$.
 e) $O_a O_b = 4r \cos \frac{1}{2}\gamma = 107,70$; $O_a O_c = 4r \cos \frac{1}{2}\beta = 190,39$;
 $O_b O_c = 4r \cos \frac{1}{2}\alpha = 204,64$.
4. a) $v_a = 2r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \gamma : \cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = 26,5$;
 $u_a = 2r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \beta : \cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = 25,5$.
 $v_b = 2r \sin \alpha \sin \frac{1}{2}\beta : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) = 25\frac{9}{15}$;
 $u_b = 2r \sin \frac{1}{2}\beta \sin \gamma : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) = 25\frac{2}{5}$;
 $v_c = 2r \sin \beta \sin \frac{1}{2}\gamma : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = 26\frac{2}{3}$;
 $u_c = 2r \sin \alpha \sin \frac{1}{2}\gamma : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = 26\frac{18}{103}$.
 b) $w_a = 2r \sin \beta \sin \gamma : \cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = 45,024$;
 $w_b = 2r \sin \alpha \sin \gamma : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) = 45,888$;
 $w_c = 2r \sin \alpha \sin \beta : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = 44,157$.
 c) $w_a' = 4r \sin \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma = 30,016$;
 $w_b' = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\gamma = 30,886$;
 $w_c' = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta = 29,154$.
 d) $w_a'' = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma : \cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = 15,008$;
 $w_b'' = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) = 15,002$;
 $w_c'' = 4r \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \sin \frac{1}{2}\gamma : \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = 15,003$.
 e) $a_2^2 = v_c^2 + u_b^2 - 2v_c u_b \cos \alpha$, u. s. w. $a_2 = 25,967$;
 $b_2 = 25,864$; $c_2 = 26,114$;
 $\alpha_2 = 59^\circ 46' 15''$; $\beta_2 = 59^\circ 44' 21''$; $\gamma_2 = 60^\circ 29' 24''$.
 f) $F_2 = 292,25$. g) $r_2 = 15,003$.

$$\begin{aligned}
 5. \quad m_a &= r \sqrt{2 \sin \beta^2 + 2 \sin \gamma^2 - \sin \alpha^2} = 94,43; \\
 m_b &= r \sqrt{2 \sin \alpha^2 + 2 \sin \gamma^2 - \sin \beta^2} = 206,93; \\
 m_c &= r \sqrt{2 \sin \alpha^2 + 2 \sin \beta^2 - \sin \gamma^2} = 292,66; \\
 m_a' &= \frac{2}{3} m_a = 62,953; \quad m_b' = 137,953; \quad m_c' = 195,107; \\
 m_a'' &= \frac{1}{3} m_a = 31,477; \quad m_b'' = 68,977; \quad m_c'' = 97,553; \\
 \alpha_1 &= 24^\circ 23' 38'', 0; \quad \alpha_2 = 120^\circ 49' 10'', 1; \\
 \beta_1 &= 11^\circ 47' 3'', 2; \quad \beta_2 = 14^\circ 12' 18'', 0; \\
 \gamma_1 &= 4^\circ 58' 38'', 0; \quad \gamma_2 = 3^\circ 49' 12'', 7; \\
 a' &= 166; \quad b' = 127,5; \quad c' = 44,5; \quad F' = 1618,5; \\
 \alpha_3 &= \alpha; \quad \beta_3 = \beta; \quad \gamma_3 = \gamma.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad \text{Berechne } F &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad p_a = \\
 &= a(b^2 + c^2 - a^2) : 8F, \quad p_b = b(a^2 + c^2 - b^2) : 8F, \quad p_c = F : s, \\
 q_a &= F : (s-a), \quad OM^2 = (q-p_a)^2 + \frac{1}{4}(b-c)^2, \quad O_a M^2 = \\
 &= (q_a - p_b)^2 + \frac{1}{4}(a+c)^2, \quad \text{u. s. w.} \quad 0,95763; \quad 0,249825; \\
 &0,66224; \quad 1,718578.
 \end{aligned}$$

$$7. \quad \sqrt{b^2 + \frac{c^2}{(n+1)^2} - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{n+1}} = 24; \quad 22^\circ 37' 11'', 5; \\
 16^\circ 15' 36'', 7.$$

8. Derselbe Satz gilt für jeden dieser Kreise.

$$10. \quad a_1 = a : 2 \sin \frac{1}{2} \alpha, \quad b_1 = b : 2 \sin \frac{1}{2} \beta, \\
 c_1 = c : 2 \sin \frac{1}{2} \gamma, \quad F_1 = F : 8 \sin \frac{1}{2} \alpha \cdot \sin \frac{1}{2} \beta \cdot \sin \frac{1}{2} \gamma.$$

11. Die Dreiecke sind congruent..

$$13. \quad 180^\circ - 2\alpha, \quad 180^\circ - 2\beta, \quad 180^\circ - 2\gamma.$$

14. Das Dreieck ist dem vorigen ähnlich, seine Seiten sind
 $a_1 = r (\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \gamma) = a : 2 \cos \beta \cdot \cos \gamma$, u. s. w.

$$15. \quad \sin \gamma : \sin \beta : 2 \cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) \cos \frac{1}{2} \alpha : \\
 \sin \beta \cotg \frac{1}{2} \alpha \cdot \cotg \frac{1}{2}(\beta - \gamma).$$

17. Ja, nur sind zwei Winkel des Dreiecks Differenzen statt Summen von mit den Transversalen gebildeten Winkeln.

§. 27.

$$\begin{aligned}
 1. \quad a &= 1000, \quad b = 879,38, \quad c = 347,30, \quad \beta = 60^\circ, \quad \gamma = 20^\circ. \\
 2. \quad a &= \frac{1}{3}(2s + 2d_1 + d_2) = 7,934936; \\
 b &= \frac{1}{3}(2s - d_1 + d_2) = 4,809527; \\
 c &= \frac{1}{3}(2s - d_1 - 2d_2) = 4,488927; \\
 \alpha &= 117^\circ 6' 58'', \quad \beta = 32^\circ 38' 58'', \quad \gamma = 30^\circ 14' 4''.
 \end{aligned}$$

3. $b = 370$, $c = 421$, $\alpha = 86^\circ 3' 0''$, $\beta = 43^\circ 1' 23''$, 5.
4. $b = ns : (m + n) = 1$, $a = ms : (m + n) = 0,96886$,
 $c = 0,49389$, $\alpha = 72^\circ$, $\beta = 79^\circ$.
5. $a + b = \sqrt{g^2 + 2f^2}$, $a - b = \sqrt{g^2 - 2f^2}$; $a = 120$,
 $b = 17$, $c = 113$, $\alpha = 110^\circ 26' 39''$, $\beta = 7^\circ 37' 41''$, 3,
 $F = 900$.
6. $a + b = \sqrt{d^2 + 4f^2}$; $a = 240$, $b = 221$, $c = 29$,
 $\beta = 46^\circ 23' 49''$, 9, $\gamma = 5^\circ 27' 9''$, 5, $F = 2520$.
7. $a - b = \sqrt{2g^2 - s^2}$; $a = 87$, $b = 76$, $c = 65$,
 $\alpha = 75^\circ 44' 59''$, 9, $\beta = 57^\circ 51' 10''$, 2, $F = 2394$.

A.

1. $\sin \alpha = h : b$, $\sin \beta = h : a$, $c = \sqrt{a^2 - h^2} \pm \sqrt{b^2 - h^2}$.
a) $c = 44,063$ (19,404), $\beta = 28^\circ 10' 44''$, 2,
 $\alpha = 54^\circ 3' 0''$, 0 (125°57'0'',0), $\gamma = 97^\circ 46' 15''$, 8 (25°52'15'',8),
 $F = 374,536$ (164,934).
 $\beta) c = 21$ (9), $\beta = 28^\circ 4' 20''$, 0, $\alpha = 53^\circ 7' 48''$, 2 (126°52'11'',8),
 $\gamma = 98^\circ 47' 51''$, 8 (25°3'28'',2), $F = 84$ (36).
2. $\sin \alpha = h : b$, $a = h : \sin \beta$; $a = 317$, $c = 510$,
 $\alpha = 35^\circ 18' 0''$, 9, $\gamma = 68^\circ 23' 7''$, 1, $F = 78540$.
3. $\sin \alpha = h : b$, $\tan \beta = h : p$, $a = \sqrt{h^2 + p^2}$; $a = 1443$,
 $c = 1916$ (964), $\alpha = 11^\circ 3' 18''$, 3 (168°56'41'',7),
 $\beta = 3^\circ 41' 42''$, 8, $\gamma = 165^\circ 14' 58''$, 9 (7°21'35'',5),
 $F = 89094$ (44826).
4. $\sin \alpha = h : b$; $a = 445$, $c = 606$, $\alpha = 44^\circ 29' 53''$, 0,
 $\beta = 62^\circ 51' 32''$, 9, $F = 119988$.
5. $\cos \alpha = q : b$; $\alpha = 62^\circ 51' 32''$, 9, $\beta = 78^\circ 34' 43''$, 7,
 $a = 404$, $c = 283$, $F = 56034$.
6. $b = \sqrt{q^2 + h^2} = 145$, $a = \sqrt{p^2 + h^2} = 617$, $c = p \pm q$
 $= 708$ (508), $\tan \alpha = \pm h : p$, $\tan \beta = h : q$;
 $\alpha = 46^\circ 23' 49''$, 9 (133°36'10'',1), $\beta = 9^\circ 47' 53''$, 5,
 $\gamma = 123^\circ 48' 16''$, 6 (36°35'56'',4), $F = 38170$ (26670).
7. $b = h : \sin \alpha = 28,115$; $a = h : \sin \beta = 33,305$;
 $\gamma = 61^\circ 2' 40''$, $c = 31,512$, $F = 409,655$.

8. $c = p + q = 5$, $b = q : \cos \alpha = 0,8889$, $\tan \beta = q \tan \alpha : p$, $\beta = 9^\circ 16' 31'', 5$, $\gamma = 114^\circ 57' 12'', 5$, $a = 4,5596$, $F = 1,8373$.
9. $\gamma = \gamma_1 \pm \gamma_2 = 138^\circ 35' 21'', 1 (28^\circ 41' 29'', 3)$, $b = h : \cos \gamma_2 = 1191$, $a = h : \cos \gamma_1 = 6175$, $\beta = 6^\circ 21' 34'', 8$, $\alpha = 35^\circ 3' 4'', 1 (144^\circ 56' 55'', 9)$, $c = 7112 (5162)$, $F = 2432304 (1765404)$.
10. $a = h : \sin \beta = 17,770$, $\tan \alpha = \frac{1}{2} h : (c - h \cot \beta)$; $\alpha = 57^\circ 18' 43''$, $b = 19,011$, $\gamma = 58^\circ 28' 59''$, $F = 144$.
11. $\sin \alpha = h : b$; $\alpha = 32^\circ 31' 13'', 5$, $\beta = 41^\circ 42' 32'', 1$, $\gamma = 105^\circ 46' 14'', 4$, $a^2 = b^2 + c^2 - 2c\sqrt{b^2 - h^2} = 505$, $F = 151872$.
12. $a = 2F : h_a = 11,25$, $b = 2F : h_b = 10$, $\sin \gamma = h_a h_b : 2F$, $\gamma_1 = 53^\circ 7' 48'', 2$; $\alpha = 70^\circ 8' 41'', 5$, $\beta = 56^\circ 43' 30'', 2$, $c = 8,6350$.
13. $\sin \beta = h_a : c$, $\sin \alpha = h_b : c$; $a = 469,79 (687,89)$, $b = 194,18 (284,33)$, $\alpha = 65^\circ (115^\circ)$, $\beta = 22^\circ$, $\gamma = 93^\circ (43^\circ)$, $F = 45548 (66694,3)$.
14. $a = h_b : \sin \gamma = 72,713$, $b = h_a : \sin \gamma = 107,293$, $c = 88,142$, $\alpha = 42^\circ 16' 52''$, $\beta = 83^\circ 4' 48''$, $F = 3181,22$.
15. $c = h_a : \sin \beta = 20$, $\sin \alpha = h_b \sin \beta : h_a$, $\alpha = 64^\circ 33' 10'' (115^\circ 26' 50'')$, $\gamma = 64^\circ 33' 5'', 3 (13^\circ 39' 25'', 3)$, $b = h_a : \sin \gamma = 17,1873 (65,7329)$, $a = h_b : \sin \gamma = 20 (38,2445)$, $F = 155,1 (296,779)$.
16. $a = h : \sin \beta = 435$, $b = s - a = 149$, $\sin \alpha = h : b$, $\alpha = 20^\circ 0' 57'', 5 (159^\circ 59' 2'', 5)$, $\gamma = 153^\circ 15' 4'', 0 (13^\circ 16' 59'', 0)$, $c = 572 (292)$, $F = 14586 (7446)$.
17. $a = h : \sin \gamma = 267$, $b = s - a = 284$, $c = 125$, $\alpha_1 = 69^\circ 23' 25'', 1$, $\gamma = 84^\circ 37' 13'', 7$, $F = 16614$.
18. $b = h : \sin \alpha = 137$, $a = d + b = 1839$, $\beta = 3^\circ 16' 23'', 4$, $\gamma = 125^\circ 41' 35'', 0$, $c = 1924$, $F = 101010$.
19. $c = 2F : h = 716$, $b = s - c = 185$, $\sin \alpha = h : b$, $\alpha_1 = 17^\circ 56' 42'', 9$, $a = 543$, $\beta = 6^\circ 1' 32'', 1$, $\gamma = 156^\circ 1' 45'', 0$, $F = 20406$.

20. $\tan \beta = h : (\frac{1}{2}c + \sqrt{m^2 - h^2})$, $\tan \alpha = h : (\frac{1}{2}c - \sqrt{m^2 - h^2})$,
 $\beta = 4^\circ 58' 44'', 7$, $\alpha = 14^\circ 51' 46'', 2$, $\gamma = 160^\circ 9' 29'', 1$,
 $b = 269$, $a = 795$, $F = 36294$.
21. $\sin \alpha = h : b$; $\alpha_1 = 25^\circ 53' 14'', 0$,
 $c = 2(\sqrt{m^2 - h^2} \pm \sqrt{b^2 - h^2}) = 968$ (392).
22. $\cos \varphi = h : w$, $b = h : \cos(\frac{1}{2}\gamma - \varphi)$, $a = h : \cos(\frac{1}{2}\gamma + \varphi)$,
 $\beta = 90^\circ - \varphi - \frac{1}{2}\gamma$, $\alpha = 90^\circ + \varphi - \frac{1}{2}\gamma$; $a = 795$,
 $b = 269$, $c = 1052$, $\alpha = 14^\circ 51' 46'', 2$, $\beta = 4^\circ 58' 44'', 7$,
 $F = 36294$.
23. $\sin \varphi = h : w$, $\sin \beta = h : a$, $\gamma = 2(\varphi - \beta)$,
 $\alpha = 180^\circ - 2\varphi + \beta$, $\beta_1 = 42^\circ 4' 30'', 1$, $\gamma = 123^\circ 18' 48'', 4$,
 $\alpha = 14^\circ 36' 41'', 5$, $b = 773$, $c = 964$, $F = 93990$.
24. $\varphi \cot \frac{1}{2}\alpha = x$, $\varphi \cot \frac{1}{2}\beta = y$, $\varphi \cot \frac{1}{2}\gamma = z$; $a = y + z$;
 $b = x + z$, $c = x + y$, $F = xyz : \varphi$; a) $a = 181396$,
 $b = 215585$, $c = 278627$, $F = 19548300000$; b) $a = 804,30$,
 $b = 1006,63$, $c = 864,88$, $F = 334477$.
25. $b = h : \sin \alpha$; $\cot \frac{1}{2}\gamma = \frac{b}{\varphi} - \cot \frac{1}{2}\alpha$, $a = h : \sin \beta$;
 $c = 956$, $a = 533$, $b = 1011$, $\beta = 80^\circ 3' 37'', 9$,
 $\gamma = 68^\circ 39' 17'', 9$, $F = 250950$.
26. $\sin \beta = \frac{h}{a}$; $\cot \frac{1}{2}\gamma = \frac{a}{\varphi} - \cot \frac{1}{2}\beta$, $b = h : \sin \alpha$,
 $\beta_1 = 64^\circ 23' 29'', 3$, $\gamma = 59^\circ 48' 50'', 3$, $\alpha = 55^\circ 47' 40'', 4$,
 $b = 555$, $c = 532$, $F = 122094$.
27. $\tan \frac{1}{2}\gamma = (a - \varphi \tan \frac{1}{2}\beta) : \varphi$; $\gamma = 63^\circ 31' 8'', 3$,
 $\alpha = 59^\circ 52' 46'', 3$, $b = 305$, $c = 327$, $F = 43134$.
28. $\tan \frac{1}{2}\gamma = (\varphi_a \cot \frac{1}{2}\alpha - b) : \varphi_a$; $\gamma = 39^\circ 35' 51'', 9$,
 $\beta = 13^\circ 41' 8'', 0$, $a = 1196$, $c = 951$, $F = 134550$.
34. $\cos \alpha = \frac{c^2 + 4(b^2 - m^2)}{4bc}$, $\cos \beta = \frac{3c^2 - 4(b^2 - m^2)}{4ac}$,
 $a^2 = 2m^2 - b^2 + \frac{1}{2}c^2$; $\alpha = 76^\circ$, $\beta = 81^\circ$, $\gamma = 23^\circ$,
 $a = 3$, $F = 1,7898$.
35. $\sin \varphi = c \sin \beta : 2m$, $a = m \sin(\varphi + \beta) : \sin \beta$,
 $b^2 = m^2 + \frac{1}{2}c^2 - mc \cos(\varphi + \beta)$; $b = 150$, $a = 145$,
 $\alpha = 73^\circ 44' 23'', 3$, $\gamma = 9^\circ 31' 38'', 2$, $F = 1800$.
36. $\tan \alpha = w \sin \frac{1}{2}\gamma : (b - w \cos \frac{1}{2}\gamma)$; $\alpha = 27^\circ 36' 1'', 3$,
 $\beta = 100^\circ 14' 58'', 7$; $a = 19,002$, $c = 32,382$,
 $F = 302,753$.

37. $\sin \varphi = b \sin \alpha : w$, $\gamma = 2 (180^\circ - \varphi - \alpha)$,
 $\beta = 2\varphi + \alpha - 180^\circ$; $a = 24,3006$, $c = 81,9844$,
 $\beta = 109^\circ 36' 18'', 1$, $\gamma = 56^\circ 8' 41'', 8$, $F = 938,405$.
41. $b^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos \beta$; $\sin \alpha = a \sin \beta : b$ oder
 $\tan \alpha = a \sin \beta : (a \cos \beta - d)$; $c = 2a \cos \beta - d$;
 $b = 195$, $c = 388$, $\alpha = 75^\circ 44' 59'', 5$, $\gamma = 75^\circ 10' 52'', 0$,
 $F = 36666$.
47. $\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = s \sin \frac{1}{2}\gamma : c = \sin(\beta + \frac{1}{2}\gamma)$, $b = c \sin \beta : \sin \gamma$;
 a) $\alpha = 11^\circ 3' 18'', 3$, $\beta = 3^\circ 41' 42'', 8$, $b = 485$,
 $F = 89094$;
 b) $\alpha = 53^\circ 51' 14'', 3$, $\beta = 19^\circ 8' 45'', 7$, $b = 6330,5$,
 $a = 15586,5$.
48. $a = s \cdot \sin \alpha : [2 \cos \frac{1}{2}\gamma \cdot \sin(\alpha + \frac{1}{2}\gamma)]$,
 $c = s \cdot \sin \frac{1}{2}\gamma : \sin(\alpha + \frac{1}{2}\gamma)$, $b = s - a$, oder
 $a - b = s \cdot \tan \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \tan \frac{1}{2}\gamma$;
 a) $a = 12$, $b = 5$, $c = 13$, $F = 30$.
 b) $a = 5,6951$, $b = 4,3049$, $c = 3,8346$, $F = 8,2512$.
49. $\tan \frac{1}{2}\beta = (s - c) \cotg \frac{1}{2}\alpha : (s + c)$; $\beta = 90^\circ$, $\gamma = 40^\circ$,
 $a = 1$, $b = 1,55572$, $F = 0,41955$.
50. $\sin \frac{1}{2}\gamma = \frac{c}{s} \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$, $a - b = c \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) : \cos \frac{1}{2}\gamma$;
 $a = 625$, $b = 509$, $\alpha = 154^\circ 23' 29'', 3$, $\beta = 20^\circ 36' 34'', 9$,
 $\gamma = 4^\circ 59' 55'', 8$, $F = 13860$.
51. $\sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = d \cos \frac{1}{2}\gamma : c$; $\frac{1}{2}(\alpha + \beta) = 90^\circ - \frac{1}{2}\gamma$;
 a) $\alpha = 92^\circ 4' 2''$, $\beta = 45^\circ 23' 54''$, $a = 473$, $b = 337$,
 $F = 53880$; b) $\alpha = 98^\circ 1' 28'', 9$, $\beta = 41^\circ 58' 31'', 1$,
 $a = 116,961$, $b = 78,997$, $F = 2969,5$.
52. $\cotg \frac{1}{2}\alpha = (c - d) \cotg \frac{1}{2}\beta : (c + d)$; $\alpha = 79^\circ 16' 41'', 8$,
 $\gamma = 55^\circ 43' 18'', 2$, $a = 3,5675$, $b = 2,5675$, $F = 3,7840$.
53. $\tan \frac{1}{2}\beta = (c - d) \tan \frac{1}{2}\alpha : (c + d)$; $\beta = 44^\circ 45' 37'', 0$,
 $\gamma = 57^\circ 15' 27'', 9$, $a = 507$, $b = 365$, $F = 77826$.
54. $c = d \cos \frac{1}{2}\gamma : \sin \frac{1}{2}(\beta - \alpha)$; $c = 54,8538$, $a = 38,2825$,
 $b = 53,6525$, $F = 971,225$.
55. $\cos \frac{1}{2}\gamma = c \sin \frac{1}{2}\delta : d$; $\gamma = 139^\circ 11' 35'', 4$, $\alpha = 25^\circ 24' 12'', 3$,
 $\beta = 15^\circ 24' 12'', 3$, $a = 1,3129$, $b = 0,8129$,
 $F = 0,34872$.

56. $\cos \frac{1}{2}\gamma = s \sin \frac{1}{2}\delta : d$, $a - b = d \sin \frac{1}{2}\gamma : \cos \frac{1}{2}\delta$;
 $a = 650$, $b = 281$, $c = 861$, $\alpha = 34^\circ 42' 29''$, 0 ,
 $\beta = 14^\circ 15' 0''$, 1 , $\gamma = 131^\circ 2' 30''$, 9 , $F = 68880$.
59. $\sin \frac{1}{2}\gamma = d \cos \frac{1}{2}\delta : f$, $a + b = f \cos \frac{1}{2}\gamma : \sin \frac{1}{2}\delta$;
 $a = 64$, 1 , $b = 29$, 0 , $c = 81$, 9 , $\alpha = 43^\circ 36' 10''$, 1 ,
 $\beta = 18^\circ 10' 50''$, 0 , $\gamma = 118^\circ 12' 59''$, 9 , $F = 819$.
62. $c = u + v$, $\sin \beta = v \sin \alpha : u$, $a = (u + v) \sin \alpha : \sin \gamma$;
 $c = 584$, 0 , $\beta = 17^\circ 13' 52''$, 7 , $\gamma = 90^\circ 15' 39''$, 7 ,
 $a = 557$, $b = 173$, $F = 45953$.
72. $\gamma = \varphi + \psi$; $\tan \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = \tan \frac{1}{2}(\psi - \varphi) \cotg \frac{1}{2}\gamma$,
 $c = 2m \sin \varphi : \sin \beta = 2m \sin \psi : \sin \alpha$, $a = 2m \sin \psi : \sin \gamma$,
 $b = 2m \sin \varphi : \sin \gamma$. a) $\alpha = 27^\circ 3' 5''$, 2 , $\beta = 81^\circ 18' 46''$, 0 ,
 $\gamma = 71^\circ 38' 8''$, 7 , $a = 72$, 835 , $b = 158$, 318 , $c = 152$,
 $F = 5472$; b) $\alpha = \varphi$, $\beta = \psi$, $\gamma = 90^\circ$, $a = 8$, $b = 6$,
 $c = 10$, $F = 24$.
73. $c = \sqrt{2(a^2 + b^2 - 2m^2)} = 507$; $\alpha = 36^\circ 38'$,
 $\beta = 76^\circ 18'$, $\gamma = 67^\circ 4'$, $F = 80904$.
82. $a = \frac{2}{3} \sqrt{m_a^2 + 4m_b^2 - 4m_a m_b \cos \varphi} = 2$,
 $b = \frac{2}{3} \sqrt{4m_a^2 + m_b^2 - 4m_a m_b \cos \varphi} = 3$,
 $c = \frac{2}{3} \sqrt{m_a^2 + m_b^2 + 2m_a m_b \cos \varphi} = 4$,
 $\alpha = 28^\circ 57' 18''$, $\beta = 46^\circ 34' 4''$, $\gamma = 104^\circ 28' 38''$,
 $F = 2,9047$.
89. $c = \frac{2}{3} h \sin(\psi \pm \varepsilon) : (\sin \psi \sin \varepsilon)$, $\tan \alpha = h : (\frac{1}{2}c \mp h \cotg \psi)$,
 $\tan \beta = h : (\frac{1}{2}c \pm h \cotg \psi)$; $a = b = 85$, $c = 72$,
 $\alpha = \beta = 64^\circ 56' 32''$, 6 , $\gamma = 50^\circ 6' 54''$, 8 , $F = 2772$.
90. $d : 4 \sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta \cos \frac{1}{2}\gamma = 2r$; $a = 2r \sin \alpha$, u. s. w.
a) $4,7879$; $3,9921$; $3,7800$; $F = 73,209$; b) $43,843$;
 $39,214$; $46,556$; $F = 796,58$.
91. $b = h : \sin \alpha$, $\tan \frac{1}{2}\beta = h : (2s - h \cotg \frac{1}{2}\alpha)$; $b = 39,163$,
 $\beta = 80^\circ 8' 23''$, $\gamma = 49^\circ 51' 37''$, $a = 30,449$, $c = 30,387$,
 $F = 455,81$.
94. $\cos \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) = \frac{s}{2b \cos \frac{1}{2}\beta}$, $a + c = \frac{s}{\sin \beta}$,
 $a - c = \frac{b \sin \frac{1}{2}(\alpha - \gamma)}{\cos \frac{1}{2}\beta}$; $a = 123$, $b = 65$, $c = 106$, $\alpha = 88^\circ 37' 10''$, 0 ,
 $\beta = 31^\circ 53' 26''$, 8 , $\gamma = 59^\circ 29' 23''$, 2 , $F = 3444$.
102. $b = d : [2 \sin \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) \cos \frac{1}{2}(\alpha + \gamma)]$; $a = 325$, $b = 85$,
 $c = 246$, $\beta = 6^\circ 21' 34''$, 8 , $F = 4428$.

103. $a - c = d : \sin \beta$, $a + c = \sqrt{b^2 \sin^2 \frac{1}{2} \beta^2 - \frac{1}{4} d^2} : \sin \frac{1}{2} \beta^2$,
 $\sin \frac{1}{2} (\alpha - \gamma) = d : (2b \sin \frac{1}{2} \beta)$; $a = 52$, $c = 15$,
 $\alpha = 130^\circ 26' 59''$, $\gamma = 12^\circ 40' 49''$, $F = 234$.
104. $a - c = d : \sin \beta$, $b^2 = s^2 \sin^2 \frac{1}{2} \beta^2 + \frac{1}{4} d^2 : \sin^2 \frac{1}{2} \beta^2$,
 $\cotg \frac{1}{2} (\alpha - \gamma) = 2s \sin \frac{1}{2} \beta^2 : d$; $a = 445$, $b = 450$,
 $c = 85$, $\alpha = 81^\circ 17' 9''$, $\gamma = 10^\circ 52' 50''$,
 $F = 18900$.

B.

1. $a = 2r \sin \alpha$, $b = 2r \sin \beta$, $c = 2r \sin (\alpha + \beta)$;
 a) 1,73206; 1,96962; 1,28558; $F = 1,09643$.
 b) 40,368; 53,189; 67,955; $F = 1072,83$.
2. $\sin \alpha = a : 2r$, $b = 2r \sin \beta$; $\alpha_2 = 111^\circ 21' 44''$,
 $\gamma = 50^\circ 41' 32''$, $b = 221$, $c = 555$, $F = 57114$.
3. $\sin \beta = b : 2r$, $\sin \alpha = h : b$, $a = 2rh : b$, $c = 2r \sin \gamma$;
 $\beta_1 = 53^\circ 7' 48''$, $\alpha_1 = 14^\circ 28' 39''$, $\gamma = 112^\circ 23' 32''$,
 $a = 1,250$, $c = 4,623$, $F = 2,3115$.
4. $b = 2r \sin \beta$, $c = s - b$, $\sin \gamma = c : 2r$;
 $b = 317$, $c = 939$, $\gamma = 13^\circ 41' 8''$, $(166^\circ 18' 52'', 0)$,
 $\alpha = 161^\circ 43' 59''$, $(9^\circ 6' 15'', 6)$, $a = 1244$ (628),
 $F = 46650$ (23550).
5. $c = 2r \sin \gamma = 123$, $b = d + c = 365$, $\sin \beta = b : 2r$;
 $\beta = 12^\circ 40' 49''$, $(167^\circ 19' 10'', 6)$, $\alpha = 163^\circ 4' 38''$,
 $(8^\circ 26' 17'', 5)$, $a = 484$ (244), $F = 6534$ (3294).
6. $\sin \alpha = a : 2r$, $b - c = a \sin \frac{1}{2} \delta : \cos \frac{1}{2} \alpha$,
 $b + c = a \cos \frac{1}{2} \delta : \sin \frac{1}{2} \alpha$; $\alpha_1 = 162^\circ 51' 14''$,
 $\beta = 11^\circ 25' 16''$, $\gamma = 5^\circ 43' 29''$, $b = 401$, $c = 202$,
 $F = 11940$.
9. $a = 2F : h_a = 11,25$, $b = 2F : h_b = 10$, $\sin \gamma = h_a h_b : 2F$;
 $c = 9,5688$ (19,0148), $\alpha = 70^\circ 8' 41''$, $(28^\circ 15' 0'')$,
 $\beta = 56^\circ 43' 30''$, $(24^\circ 52' 49'')$,
 $\gamma = 53^\circ 7' 48''$, $(126^\circ 52' 11'', 8)$.
10. $c = 2F : h = 84$; $p = \frac{1}{2}(c + d)$, $q = \frac{1}{2}(c - d)$,
 $\tan \alpha = h : q$, $\tan \beta = h : p$, $a = h : \sin \beta$,
 $b = h : \sin \alpha$; $\alpha = 77^\circ 19' 10''$, $\beta = 28^\circ 4' 20''$,
 $\gamma = 74^\circ 36' 28''$, 5 .

17. $a = \frac{s h_b}{h_a + h_b}$, $b = \frac{s h_a}{h_a + h_b}$, $\sin \gamma = \frac{h_a + h_b}{s}$; $a = 10$;
 $b = 5,0771$, $c = 7,7786$, $\alpha = 100^\circ$, $\beta = 30^\circ$, $\gamma = 50^\circ$,
 $F = 19,446$.
19. $\sin \beta = \frac{n}{m} \sin \alpha$; $\beta = 76^\circ 37' 20''$, $\gamma = 57^\circ 43' 49''$,
 $a = 77,268$, $b = 105,126$, $F = 4061,45$.
20. $\sin \beta = \frac{n}{m} \sin \alpha$, $a = \frac{m h}{n \sin \alpha}$, $b = \frac{h}{\sin \alpha}$; $a = 19,5395$,
 $b = 23,4474$, $c_1 = 41,5397$, $\alpha_1 = 13^\circ 33' 58''$,
 $\beta_1 = 16^\circ 20' 55''$, $\gamma_1 = 150^\circ 5' 6''$, $F = 114,242$.
25. $\tan \frac{1}{2} \gamma = \frac{a-b}{a+b} \cotg \frac{1}{2} \delta$; $\gamma = 75^\circ$, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 45^\circ$,
 $c = 1,9268$, $F = 1,15$.
26. $\tan \frac{1}{2} (\alpha - \beta) = (m - n) \cotg \frac{1}{2} \gamma : (m + n)$;
 $\alpha = 74^\circ 36' 28''$, $\beta = 24^\circ 11' 22''$, $a = 200$, $b = 85$,
 $F = 8400$.
27. $\tan \frac{1}{2} \gamma = \frac{m-n}{m+n} \cotg \frac{1}{2} \delta$, $a - b = \frac{c \sin \frac{1}{2} \delta}{\cos \frac{1}{2} \gamma}$,
 $a + b = \frac{c \cos \frac{1}{2} \delta}{\sin \frac{1}{2} \gamma}$; $a = 51$, $b = 30$, $\alpha = 126^\circ 52' 11''$,
 $\beta = 28^\circ 4' 20''$, $\gamma = 25^\circ 3' 27''$, $F = 324$.
28. $\sin \gamma = c : 2r$; $\tan \frac{1}{2} (\alpha - \beta) = (m - n) \cotg \frac{1}{2} \gamma : (m + n)$;
 $\gamma_1 = 67^\circ 15' 12''$, $\alpha = 65^\circ 51' 28''$, $\beta = 46^\circ 53' 19''$,
 $a = 82,128$, $b = 65,702$, $F = 2022,45$.
29. $\alpha = 90^\circ - \frac{1}{2} \gamma + \frac{1}{2} \delta$, $a + b = d \cotg \frac{1}{2} \gamma \cotg \frac{1}{2} \delta$;
 $a = 268$, $b = 281$, $c = 255$, $\alpha = 59^\circ 45' 56''$,
 $\beta = 64^\circ 56' 32''$, $F = 30954$.
30. $\alpha = 90^\circ - \frac{1}{2} \gamma + \frac{1}{2} \delta$, $\beta = 90^\circ - \frac{1}{2} \gamma - \frac{1}{2} \delta$,
 $a - b = s \tg \frac{1}{2} \delta \tg \frac{1}{2} \gamma$, $a = 1004$, $b = 305$, $c = 807$,
 $\alpha = 122^\circ 23' 45''$, $\beta = 14^\circ 51' 46''$, $F = 103914$.
31. $a + b = m \sqrt{\cotg \frac{1}{2} \delta \cotg \frac{1}{2} \gamma}$, $a - b = m \sqrt{\tg \frac{1}{2} \delta \tg \frac{1}{2} \gamma}$;
 $a = 428$, $b = 257$, $c = 471$, $\alpha = 64^\circ 22' 24''$,
 $\beta = 32^\circ 46' 44''$, $F = 54570$.
32. $\alpha = 21^\circ$, $\beta = 14^\circ$, $\gamma = 145^\circ$, $a = 832,2$, $b = 561,8$,
 $c = 1331,97$, $F = 134082$.
33. $\alpha = 35^\circ 39' 33''$, $\beta = 71^\circ 19' 6''$, $\gamma = 73^\circ 1' 20''$,
 $c : a : b = 0,95640 : 0,58296 : 0,9473 = 13,1247 \dots : 8 : 13$.

34. $a = 2r \sin \alpha$, $\cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = s : 4r \cos \frac{1}{2}\alpha$; $a = 40$,
 $b = 37$, $c = 13$, $\beta = 67^\circ 22' 48'', 5$, $\gamma = 18^\circ 55' 28'', 7$,
 $F = 240$.

35. $\sin \alpha = a : 2r$. Vergl. 34. $\alpha = 52^\circ 27' 13'', 3$,
 $\beta = 105^\circ 38' 40'', 0$, $\gamma = 21^\circ 54' 6'', 7$, $b = 37,286$,
 $c = 14,443$, $F = 213,49$.

36. $\sin \gamma = c : 2r$, $\sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = d \cos \frac{1}{2}\gamma : c = d : (4r \sin \frac{1}{2}\gamma)$,
 $a + b = c \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) : \sin \frac{1}{2}\gamma$; $a = 714$ (357,09),
 $b = 365$ (8,09), $\alpha = 155^\circ 57' 50'', 2$ ($11^\circ 45' 13'', 5$),
 $\beta = 12^\circ 1' 4'', 9$ ($0^\circ 15' 51'', 5$), $\gamma = 12^\circ 1' 4'', 9$ ($167^\circ 58' 55''$),
 $F = 27132$ (300,76).

37. $a = 2r \sin \alpha$, $b + c = 2(s - r \sin \alpha)$. Vergl. 34.
 $a = 101$, $b = 29$, $c = 120$, $\beta = 11^\circ 25' 16'', 3$,
 $\gamma = 124^\circ 58' 33'', 6$, $F = 1200$.

38. $\sin \gamma = v \sin \beta$; $2r = s : (2 \cos \frac{1}{2}\alpha \cos \frac{1}{2}\beta \cos \frac{1}{2}\gamma)$,
 $a = 2r \sin \alpha$, $b = 2r \sin \beta$, $c = 2r \sin \gamma$; $a = 85$,
 $b = 400$, $c = 325$, $\alpha = 6^\circ 21' 34'', 8$, $\gamma = 25^\circ 3' 27'', 4$,
 $F = 7200$.

42. $2r = f : \sqrt{\sin \beta^2 - \sin \gamma^2} = f : \sqrt{\sin \alpha \sin (\beta - \gamma)}$;
 $a = 2r \sin \alpha$, etc.; $b - c = d \sqrt{\operatorname{tg} \frac{1}{2}\alpha \operatorname{tg} \frac{1}{2}(\beta - \gamma)}$,
 $b + c = d \sqrt{\cotg \frac{1}{2}\alpha \cotg \frac{1}{2}(\beta - \gamma)}$;
a) $a = 229$, $b = 232$, $c = 61$, $\alpha = 79^\circ 36' 40''$,
 $F = 6960$.
b) $a = 52$, $b = 53$, $c = 51$, $\alpha = 59^\circ 57' 47'', 7$,
 $F = 1170$.

43. $\sin (\beta - \gamma) = \frac{f^2 \sin \alpha}{a^2}$, $b - c = \frac{a \sin \frac{1}{2}(\beta - \gamma)}{\cos \frac{1}{2}\alpha}$,
 $b + c = \frac{a \cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma)}{\sin \frac{1}{2}\alpha} = \frac{a^2}{b - c}$; $b = 80$, $c = 61$,
 $\beta_1 = 46^\circ 12' 45'', 4$, $\gamma = 79^\circ 36' 40'', 0$, $F = 2400$.

44. $\sin \alpha = \frac{a^2 \sin \delta}{f^2}$, $b - c = \frac{a \sin \frac{1}{2}\delta}{\cos \frac{1}{2}\alpha}$,
 $b + c = \frac{f^2}{b - c} = \frac{a \cos \frac{1}{2}\delta}{\sin \frac{1}{2}\alpha}$, $F = \frac{1}{2}f^2 \cdot \frac{\sin \beta \sin \gamma}{\sin \delta}$;
 $\alpha = 41^\circ 52' 4'', 3$ ($138^\circ 7' 55'', 7$), $\beta = 87^\circ 12' 20'', 0$ ($39^\circ 4' 24'', 3$),
 $\gamma = 50^\circ 55' 35'', 7$ ($2^\circ 47' 40'', 0$), $b = 1082$ (682,81),
 $c = 841$ (52,81), $F = 179679$ (7120,83).

45. $(b + c)^2 = s^2 + \frac{s^2 - a^2}{\cos \alpha}$, $(b - c)^2 = s^2 - \frac{s^2 - a^2}{\cos \alpha}$,
 $\cos(\beta - \gamma) = \frac{s^2 \sin \alpha^2 - a^2}{a^2 \cos \alpha}$; $b = 40$, $c = 13$,
 $\beta = 93^\circ 41' 42''$, $\gamma = 18^\circ 55' 28''$, $F = 240$.
46. $\cos(\beta - \gamma) = \frac{2p^2}{a^2} \sin \alpha^2 - \cos \alpha$;
 $(b + c)^2 = a^2 + 4p^2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2$, $(b - c)^2 = a^2 - 4p^2 \sin \frac{1}{2} \alpha^2$;
 $b = 241$, $c = 182$, $\beta = 17^\circ 3' 42''$, $\gamma = 12^\circ 48' 4''$,
 $F = 10920$.
47. $a^2 = \frac{1}{2} q^2 + p^2 - 2p^2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2 = \frac{1}{2} q^2 - p^2 + 2p^2 \sin \frac{1}{2} \alpha^2$,
 $(b + c)^2 = \frac{1}{2} q^2 + p^2 + 2p^2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2$,
 $(b - c)^2 = \frac{1}{2} q^2 - p^2 - 2p^2 \sin \frac{1}{2} \alpha^2$; $a = 5$, $b = 7$,
 $c = 6$, $\alpha = 44^\circ 24' 54''$, $\beta = 78^\circ 27' 48''$, $\gamma = 57^\circ 7' 18''$,
 $F = 14,697$.
48. $a + b - c = 4p^2 \sin \frac{1}{2} \alpha^2 : d$; $a = 1676$, $b = 425$,
 $c = 1263$, $\beta = 3^\circ 56' 59''$, $\gamma = 11^\circ 48' 44''$, 2 ,
 $F = 72906$.
49. $a + b + c = 4p^2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2 : d$; $a = 572$, $b = 293$,
 $c = 579$, $\beta = 29^\circ 29' 13''$, $\gamma = 76^\circ 34' 49''$, 2 ,
 $F = 81510$.
50. $b + c - a = 2p^2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2 : s$; $a = 51,5$, $b = 31$,
 $c = 24,5$, $\beta = 24^\circ 45' 40''$, $\gamma = 19^\circ 19' 48''$, $F = 264,23$.
51. $c = \frac{s}{2} + \sqrt{\frac{s^2}{4} - \frac{2F}{\sin \alpha}}$, $b = \frac{s}{2} - \sqrt{\frac{s^2}{4} - \frac{2F}{\sin \alpha}}$,
 $a^2 = s^2 - 4F \cotg \frac{1}{2} \alpha$; $c = 19,0319$, $b = 10,9681$,
 $a = 10,7725$, $\beta = 29^\circ 11' 31''$, $\gamma = 122^\circ 11' 4''$,
 $F = 1250$.
52. $c^2 = d^2 + 4F \tan \frac{1}{2} \gamma$, $(a + b)^2 = d^2 + 8F : \sin \gamma$;
 $a = 1077$, $b = 724$, $c = 365$, $\alpha = 161^\circ 57' 23''$, 0 ,
 $\beta = 12^\circ 1' 4''$, 9 .
53. $(b + c)^2 = f^2 + 4F : \sin \alpha$, $(b - c)^2 = f^2 - 4F : \sin \alpha$;
 $a = 724$, $b = 545$, $c = 183$, $\beta = 10^\circ 23' 20''$, 0 ,
 $\gamma = 3^\circ 28' 17''$, 1 .
54. $\cotg \alpha = (f^2 - a^2) : 4F$, $(b + c)^2 = f^2 + \sqrt{16F^2 + (f - a)^2}$,
 $(b - c)^2 = f^2 - \sqrt{16F^2 + (f - a)^2}$, $\sin \gamma = 2F : ab$,
 $\sin \beta = 2F : ac$; $b = 15$, $c = 13$, $\alpha = 59^\circ 29' 23''$, 1 ,
 $\beta = 67^\circ 22' 48''$, 5 , $\gamma = 53^\circ 7' 48''$, 4 .

$$55. c = \sqrt{2Fv}, \sin \gamma = 2F:p^2, (a+b)^2 = 2Fv + 4p^2 \cos \frac{1}{2}\gamma^2, \\ (a-b)^2 = 2Fv - 4p^2 \sin \frac{1}{2}\gamma^2, \sin \beta = h:a, \sin \alpha = h:b; \\ a = 37, b = 13, c = 40, \alpha = 67^\circ 22' 48'', 5, \\ \beta = 18^\circ 55' 28'', 7, \gamma = 93^\circ 41' 42'', 8.$$

$$56. \sin \gamma = ch:p^2. \text{ Vergl. 46. } a = b = c = 9, \\ \alpha = \beta = \gamma = 60^\circ.$$

$$57. (a+b)^2 = c^2 + 2ch \cotg \frac{1}{2}\gamma, (a-b)^2 = c^2 - 2ch \tg \frac{1}{2}\gamma, \\ \cos(\alpha - \beta) = \frac{2h}{c} \sin \gamma - \cos \gamma; a = 241, b = 169; \\ \alpha = 134^\circ 45' 34'', \beta = 29^\circ 51' 49'', F = 5400.$$

$$58. \sin \alpha = a:2r, \cos(\beta - \gamma) = \frac{2F}{ar} - \cos \alpha, \\ (b+c)^2 = a^2 + \frac{16rF}{a} \cos \frac{1}{2}\alpha^2, (b-c)^2 = a^2 - \frac{16rF}{a} \sin \frac{1}{2}\alpha^2; \\ \alpha = 91^\circ 22' 50'', 0, \beta = 35^\circ 29' 21'', 6, \gamma = 53^\circ 7' 48'', 4, \\ b = 500, c = 689.$$

$$59. \cotg \frac{1}{2}\gamma = (s^2 - c^2):4F, (a-b)^2 = s^2 - (8F:\sin \gamma), \\ \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = \frac{s}{c} \sin \frac{1}{2}\gamma; \alpha = 119^\circ 16' 42'', \\ \beta = 32^\circ 38' 58'', \gamma = 28^\circ 4' 20'', a = 18,5356, \\ b = 11,4644, \text{ oder } \alpha = 20^\circ 36', 6, \beta = 5^\circ 12', 3, \\ \gamma = 154^\circ 11', 1, a = 485, b = 125.$$

$$60. a = s - \frac{F}{s} \cotg \frac{1}{2}\alpha, b + c = s + \frac{F}{s} \cotg \frac{1}{2}\alpha, \\ bc = 2F:\sin \alpha; a = 1772, b = 593, c = 1479, \\ \beta = 18^\circ 19' 28'', 9, \gamma = 51^\circ 38' 31'', 2.$$

$$61. a = (F \cotg \frac{1}{2}\alpha - d^2):d, b + c = 2d + a, \\ bc = 2F:\sin \alpha; a = 624, b = 205, c = 445, \\ \beta = 10^\circ 52' 50'', 4, \gamma = 24^\circ 11' 22'', 3.$$

$$62. c = \sqrt{s^2 + h^2 \cotg \frac{1}{2}\gamma^2} - h \cotg \frac{1}{2}\gamma, (a-b)^2 = s^2 - 4ch:\sin \gamma, \\ s \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)^2 - 2h \cos \frac{1}{2}\gamma \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = s \sin \frac{1}{2}\gamma^2; \\ a = 6,5, b = 7,5, c = 7,0, \alpha = 53^\circ 7' 48'', \\ \beta = 67^\circ 22' 48'', F = 21.$$

$$63. c = \sqrt{d^2 + h^2 \tang \frac{1}{2}\gamma^2} + h \tang \frac{1}{2}\gamma, (a+b)^2 = d^2 + 4ch:\sin \gamma, \\ \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = d \cos \frac{1}{2}\gamma:c; c = 150, a = 197, \\ b = 53, \alpha = 148^\circ 6' 33'', 2, \beta = 8^\circ 10' 16'', 4, \\ F = 2100.$$

64. $c = 2s^2 : (2s + h \cotg \frac{1}{2}\gamma)$, $a + b = 2s - c$,
 $(a - b)^2 = c^2 - 2ch \tg \frac{1}{2}\gamma$, $\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = \frac{h}{s} \cos \frac{1}{2}\gamma + \sin \frac{1}{2}\gamma$;
 $a = 305$, $b = 785$, $c = 872$, $\alpha = 20^\circ 21' 3''$, 7 ,
 $\beta = 63^\circ 31' 8''$, 3 , $F = 119028$.

65. $c = 2r \sin \gamma$, $(a + b)^2 = 4r^2 \sin^2 \gamma + 8rh \cos \frac{1}{2}\gamma^2$,
 $(a - b)^2 = 4r^2 \sin^2 \gamma - 8rh \cos \frac{1}{2}\gamma^2$,
 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{h}{r} - \cos \gamma$; $a = 629$, $b = 821$,
 $c = 1160$, $\alpha = 31^\circ 30' 8''$, 5 , $\beta = 43^\circ 0' 10''$, 3 ,
 $F = 248820$.

66. $\sin \alpha = h : b$, $c = (b^2 - d^2) : 2(d \pm \sqrt{b^2 - h^2})$,
 $a = c + d$, $\sin \beta = h : a$, $a + c = b(b + d \cos \alpha) : (d + b \cos \alpha)$;
 $a_1 = 365$, $c = 363$, $\alpha_1 = 6^\circ 1' 32''$, 1 ,
 $\beta = 167^\circ 58' 55''$, 1 , $\gamma = 5^\circ 59' 32''$, 8 , $F = 13794$.

67. $\sin \beta = h : a$, $c = \frac{1}{2}(\sqrt{a^2 - h^2} \pm \sqrt{2s^2 - a^2 - h^2})$,
 $b^2 = s^2 - c^2$, $\sin \alpha = h : b$; $b = 65$ (36,674),
 $c = 33$ (63), $\alpha = 14^\circ 15' 0''$, 1 (25° 52' 0'', 0),
 $\beta = 151^\circ 55' 39''$, 1 (28° 4' 20'', 9), $\gamma = 13^\circ 49' 20''$, 8 ,
(126° 3' 39'', 1), $F = 264$ (504).

68. $\sin \beta = h : a$, $c = (a^2 + d^2) : 2a \cos \beta$, $b^2 = c^2 - a^2$,
 $\sin \alpha = h : b$; $\beta_1 = 12^\circ 40' 49''$, 4 , $\alpha = 143^\circ 7' 48''$, 4 ,
 $\gamma = 24^\circ 11' 22''$, 2 , $b = 15$, $c = 28$, $F = 126$.

69. $\cotg \alpha = \frac{16F^2 + d^4 - a^4}{8a^2F}$, $b^2 = \frac{16F^2 + (a^2 + d^2)^2}{4a^2}$,
 $c^2 = \frac{16F^2 + (a^2 - d^2)^2}{4a^2}$; $b = 26$, $c = 25$, $\alpha = 6^\circ 21' 34''$, 8 ,
 $\beta = 106^\circ 15' 36''$, 7 , $\gamma = 67^\circ 22' 48''$, 5 .

70. $c = \sqrt{2s^2 \tg \frac{1}{2}\gamma + \frac{1}{4}(2s \tg \frac{1}{2}\gamma - d)^2} - s \tg \frac{1}{2}\gamma + \frac{1}{2}d$,
 $h = c - d$, $a + b = 2s - c$, $ab = ch : \sin \gamma$;
 $a = 241$, $b = 169$, $c = 328$, $\alpha = 45^\circ 14' 23''$,
 $\beta = 29^\circ 51' 46''$, $F = 19680$.

71. $b = \frac{s_1 + s \cos \alpha \pm \sqrt{\frac{1}{4}s_1 \cos \frac{1}{2}\alpha^2 (s_1 - s) + s^2 \cos \alpha^2}}{1 + 2 \cos \alpha}$, etc.,
 $a = 764$, $b = 485$, $c = 867$, $\alpha = 61^\circ 21' 0''$, 3 ,
 $\beta = 33^\circ 51' 18''$, 1 , $\gamma = 84^\circ 47' 41''$, 6 , $F = 184506$.

72. $c = \{2(s + s_1) \sin \frac{1}{2}\gamma^2 + \sqrt{(s - s_1)^2 \cos \gamma^2 + 4ss_1 \sin \frac{1}{2}\gamma^2}\}$;
 $(2 \sin \frac{1}{2}\gamma^2 - \cos \gamma)$, etc., $a = 1532$, $b = 533$, $c = 1299$,
 $\alpha = 105^\circ 44' 7''$, $\beta = 19^\circ 33' 53''$, $\gamma = 333210$.
73. $c^2 \cos \frac{1}{2}\alpha^2 - c [(2s - d) \cos \frac{1}{2}\alpha^2 - s] = sd$, etc.;
 $a = 964$, $b = 773$, $c = 291$, $\beta = 42^\circ 4' 30''$, $\gamma = 14^\circ 36' 41''$, $F = 93990$.
74. $c = \sqrt{d^2 + 4s^2 \operatorname{tg} \frac{1}{2}\gamma^2 : \cos \frac{1}{2}\gamma^2 - 2s \operatorname{tg} \frac{1}{2}\gamma^2}$;
 $a = 956$, $b = 533$, $c = 1011$, $\alpha = 68^\circ 39' 17''$, $\beta = 31^\circ 17' 4''$, $F = 250950$.
75. $c^2 \cos \frac{1}{2}\beta^2 - c (s \cos \beta + d \cos \frac{1}{2}\beta^2) + sd = 0$;
 $a = 604$, $b = 545$, $c = 663$, $\alpha = 59^\circ 2' 21''$, $\gamma = 70^\circ 16' 6''$, $F = 154926$.
80. $\sin \beta = h : a$, $c = (s^2 - a^2) : 2(s - \sqrt{a^2 - h^2})$,
 $b = s - c$, $\operatorname{tang} (\beta + \frac{1}{2}\alpha) = s \sin \beta : (s \cos \beta - a)$;
 $\beta_1 = 14^\circ 36' 41''$, $b = 197$, $c = 776$, $\alpha = 81^\circ 49' 43''$, $\gamma = 83^\circ 33' 34''$, $F = 75660$.
81. $a = h : \sin \beta$, $c = (s^2 - a^2) : 2(s - h \cotg \beta)$, $b = s - c$;
 $a = 569$, $b = 255$, $c = 628$, $\alpha = 64^\circ 56' 32''$, $\gamma = 91^\circ 6' 19''$, $F = 72534$.
82. $\operatorname{tang} \frac{1}{2}\alpha = 2\rho : (s - a)$, $b - c = \sqrt{a^2 - s^2 \sin \frac{1}{2}\alpha^2} : \cos \frac{1}{2}\alpha$,
 $\cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = s \sin \frac{1}{2}\alpha : a$; $b = 15$, $c = 13$,
 $\alpha = 59^\circ 29' 23''$, $\beta = 67^\circ 22' 48''$, $\gamma = 53^\circ 7' 48''$, $F = 84$.
83. $a = s - 2\rho \cot \frac{1}{2}\alpha$. Vergl. 82. $a = 364$, $b = 425$,
 $c = 303$, $\beta = 78^\circ 34' 43''$, $\gamma = 44^\circ 19' 57''$, $F = 54054$.
84. $\operatorname{tang} \frac{1}{2}\beta = 2\rho : (a - d)$, $\operatorname{tang} \frac{1}{2}\gamma = 2\rho : (s - c)$;
 $a = 1200$, $b = 1201$, $c = 49$, $\alpha = 87^\circ 39' 42''$, $\beta = 90^\circ$, $\gamma = 2^\circ 20' 17''$, $F = 29400$.
89. $\operatorname{tang} \frac{1}{2}\gamma = 2\rho^2 : c(h - 2\rho)$, $a + b = c(h - \rho) : \rho$,
 $(a - b)^2 = c^2 - 4\rho^2 h : (h - 2\rho)$; $a = 881$, $b = 1700$,
 $\alpha = 28^\circ 4' 20''$, $\beta = 65^\circ 14' 18''$, $\gamma = 86^\circ 41' 20''$, $F = 747600$.
90. $c = 2\rho^2 \cotg \frac{1}{2}\gamma : (h - 2\rho)$. Vergl. 89.
 $\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = (h - \rho) \sin \frac{1}{2}\gamma : \rho$; $a = 1201$, $b = 1300$,
 $c = 549$, $\alpha = 67^\circ 22' 48''$, $\beta = 87^\circ 39' 42''$, $F = 329400$.

91. $a = s - \rho \cotg \frac{1}{2}\alpha$, $b + c = s + \rho \cotg \frac{1}{2}\alpha$,
 $bc = 2\rho s$; $\sin \alpha$; $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$,
 $\beta = 59^\circ 29' 23''$, $\gamma = 67^\circ 22' 49''$, $F = 84$.
92. $\tan \frac{1}{2}\gamma = \rho : d$, $b = d + \rho \cot \frac{1}{2}\alpha$, $a = d + \rho \cotg \frac{1}{2}\beta$,
 $c = \rho (\cotg \frac{1}{2}\alpha + \cotg \frac{1}{2}\beta)$, $a = 601$, $b = 969$, $c = 482$,
 $\gamma = 23^\circ 32' 11''$, $\beta = 29^\circ 51' 46''$, $F = 116280$.
93. $b - c = \sqrt{a^2 - 4\rho^2 - 4a\rho \tg \frac{1}{2}\alpha}$,
 $\cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = \frac{2\rho}{a} \cos \frac{1}{2}\alpha + \sin \frac{1}{2}\alpha$;
a) $b = 3,75$, $c = 3,50$, $\beta = 67^\circ 22' 49''$, $\gamma = 59^\circ 29' 23''$,
 $F = 10,25$;
b) $b = 510$, $c = 317$, $\beta = 68^\circ 23' 7''$, $\gamma = 35^\circ 18' 0''$,
 $F = 78540$.
94. $b + c = 2\rho_a \cotg \frac{1}{2}\alpha - a$, $b - c = \sqrt{a^2 - 4\rho_a^2 + 4a\rho_a \tg \frac{1}{2}\alpha}$,
 $\cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = \frac{2\rho_a}{a} \cos \frac{1}{2}\alpha - \sin \frac{1}{2}\alpha$; $b = 209$, $c = 241$,
 $\beta = 60^\circ 8' 14''$, $\gamma = 90^\circ$, $F = 12540$.
95. $a - c = 2\rho_a \tg \frac{1}{2}\beta - b$, $(a + c)^2 = b^2 - 4\rho_a^2 + 4b\rho_a \cotg \frac{1}{2}\beta$,
 $\sin \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) = \frac{2\rho_a}{b} \sin \frac{1}{2}\beta - \cos \frac{1}{2}\beta$; $a = 1040$,
 $c = 53$, $\alpha = 119^\circ 20' 41''$, $\gamma = 2^\circ 32' 45''$,
 $F = 23400$.
96. $\cotg \frac{1}{2}\gamma = \frac{a}{\rho} - \cotg \frac{1}{2}\beta$, $c = \rho (\cotg \frac{1}{2}\alpha + \cotg \frac{1}{2}\beta)$,
 $b = a - \frac{\rho \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\sin \frac{1}{2}\alpha \sin \frac{1}{2}\beta}$; $\gamma = 30^\circ 30' 36''$,
 $\alpha = 70^\circ 54' 39''$, $b = 195$, $c = 101$, $F = 9306$.
97. $\sin \alpha = a : 2r$, $\cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = (a + 2\rho \cotg \frac{1}{2}\alpha) : 4r \cos \frac{1}{2}\alpha$;
 $\alpha_1 = 119^\circ 20' 41''$, $\beta = 58^\circ 6' 33''$, $\gamma = 2^\circ 32' 45''$,
 $b = 1013$, $c = 53$, $F = 23400$.
98. $a = 2r \sin \alpha$. Vergl. 97. $a = 154,86$, $b = 167,32$,
 $c = 108,69$, $\beta = 76^\circ 36' 35''$, $\gamma = 39^\circ 11' 25''$,
 $F = 8186,8$.
99. $b + c = a(\rho_a + \rho) : (\rho_a - \rho)$, $b - c = \sqrt{a^2 - 4\rho_a^2}$,
 $\tg \frac{1}{2}\alpha = (\rho_a - \rho) : a$, $\cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = (\rho_a + \rho) \cos \frac{1}{2}\alpha : a$;
 $b = 58$, $c = 41$, $\alpha = 59^\circ 4' 39''$, $\beta = 77^\circ 19' 10''$,
 $\gamma = 43^\circ 36' 10''$, $F = 1020$.

100. $c = s(\varrho_c - \varphi) : (\varrho_c + \varphi)$, $\operatorname{tg} \frac{1}{2} \gamma = (\varrho_c + \varphi) : s$,
 $(a - b)^2 = c^2 - 4 \varrho_c$; $a = 2732$, $b = 689$, $c = 2055$,
 $\alpha = 167^\circ 37' 57''$, $\beta = 3^\circ 5' 46''$, $\gamma = 9^\circ 16' 15''$,
 $F = 151626$.
104. $b^2 = a^2 + \frac{4}{3}(m_a^2 - m_b^2)$, $c^2 = \frac{2}{3}(m_a^2 + 2m_b^2) - \frac{1}{2}a^2$;
 $b = 15$, $c = 13$, $\alpha = 59^\circ 29' 23''$, $\beta = 67^\circ 22' 48''$,
 $\gamma = 53^\circ 7' 48''$, $F = 84$.
105. $b - c = \sqrt{4m^2 + a^2 - s^2}$; $a = b = c = 1,73205$,
 $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$, $F = 1,29904$.
106. $b + c = \sqrt{4m^2 + a^2 - d^2}$; $b = c = 100$, $\alpha = 160^\circ$,
 $\beta = \gamma = 10^\circ$, $F = 868,24$.
107. $b^2 = 2f^2 - 4m_b^2$, $a^2 = 2f^2 - \frac{4}{3}(2m_b^2 + m_a^2)$,
 $c^2 = f^2 - a^2$; $a = b = c = 1$, $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$,
 $F = \frac{1}{4}\sqrt{3} = 0,43301$.
108. $c^2 = m_a^2 + m_b^2 - \frac{1}{4}f^2$, $a^2 - b^2 = \frac{4}{3}(m_b^2 - m_a^2)$;
 $c = 5$, $a = 4$, $b = 3$, $\alpha = 53^\circ 7' 48''$,
 $\beta = 36^\circ 52' 11''$, $\gamma = 90^\circ$, $F = 6$.
109. $a = \frac{2}{3}\sqrt{2m_b^2 + 2m_c^2 - m_a^2}$, $b = \frac{2}{3}\sqrt{2m_a^2 + 2m_c^2 - m_b^2}$,
 $c = \frac{2}{3}\sqrt{2m_a^2 + 2m_b^2 - m_c^2}$; $a = 2$, $b = 3,46410$,
 $c = 4$, $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 90^\circ$, $F = 3,46410$.
110. $b^2 = \frac{2}{3}(f^2 + a^2 - 2m^2)$, $c^2 = \frac{1}{3}(f^2 + 4m^2 - 2a^2)$,
 $\cos \alpha = (f^2 - a^2) : 2bc$, $\cos \beta = (8m^2 - f^2 - a^2) : 6ac$,
 $\cos \gamma = (7a^2 + f^2 - 8m^2) : 6ab$; $b = 56,2$,
 $c = 46,2$, $\alpha = 34^\circ 42' 29''$, $\beta = 55^\circ 17' 31''$,
 $F = 739,2$.
111. $c^2 = 4m^2 + d^2 - 2a^2$, $b^2 = 2(2m^2 + d^2 - a^2)$,
 $\cos \beta = (a^2 - d^2) : 2ac$, $\cos \gamma = (a^2 + d^2) : 2ab$;
 $b = 208$, $c = 185$, $\alpha = \gamma = 55^\circ 47' 40''$,
 $\beta = 68^\circ 24' 39''$, $F = 15912$.
112. $(b + c)^2 = (4m^2 \cos \frac{1}{2}\alpha^2 - a^2 \sin \frac{1}{2}\alpha^2) : \cos \alpha$,
 $(b - c)^2 = (a^2 \cos \frac{1}{2}\alpha^2 - 4m^2 \sin \frac{1}{2}\alpha^2) : \cos \alpha$,
 $\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\beta - \gamma) = \sqrt{(a^2 \cotg \frac{1}{2}\alpha^2 - 4m^2) : (4m^2 - a^2 \operatorname{tg} \frac{1}{2}\alpha^2)}$;
 $b = c = 317$, $\beta = \gamma = 76^\circ 18' 52''$, $F = 23100$.

113. $a = \sqrt{4m^2 + 4h^2 \cotg \alpha^2} - 2h \cotg \alpha$;
 $(b + c)^2 = 2m^2 + \frac{1}{2}a^2 + 2ah : \sin \alpha$;
 $(b - c)^2 = 2m^2 + \frac{1}{2}a^2 - 2ah : \sin \alpha$;
 $a = 508$, $b = 401$, $c = 615$, $\beta = 40^\circ 26' 59''$, 0 ,
 $\gamma = 84^\circ 16' 30''$, 7 , $F = 101346$.
114. $\tg \beta = \frac{2m \cos \varphi}{a - 2m \sin \varphi}$, $\tg \gamma = \frac{2m \cos \varphi}{a + 2m \sin \varphi}$,
 $b = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + 4am \sin \varphi + 4m^2}$,
 $c = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - 4am \sin \varphi + 4m^2}$;
 $\beta = 67^\circ 2' 12''$, 1 , $\gamma = 50^\circ 33' 55''$, 3 , $\alpha = 62^\circ 23' 52''$, 6 ,
 $b = 37,742$, $c = 31,659$, $F = 529,42$.
117. $a = us : (u + v)$, $b = vs : (u + v)$, $c = u + v$;
 $a = 617$, $b = 233$, $c = 816$, $\alpha = 26^\circ 47' 6''$, 0 ,
 $\beta = 9^\circ 57' 53''$, 5 , $\gamma = 143^\circ 25' 0''$, 5 , $F = 42840$.
118. $\tan \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = (u - v) \cotg \frac{1}{2}\gamma : (u + v)$, $c = u + v$;
 $a = 617$, $b = 137$, $c = 696$, $\alpha = 50^\circ 2' 1''$, 6 ,
 $\beta = 9^\circ 57' 53''$, 5 , $F = 36540$.
119. $c = u + v$, $\sin \alpha = u \sin \beta : v$; $a_1 = 178$, $b_1 = 557$,
 $c_1 = 584$, $\alpha_1 = 17^\circ 13' 52''$, 7 , $\gamma_1 = 90^\circ 15' 39''$, 7 ,
 $F_1 = 48180$.
120. $c^2 = \frac{(ab - w^2)(a + b)^2}{ab}$, $\cos \frac{1}{2}\gamma = \frac{(a + b)w}{2ab}$;
 $c = 927,18$, $\beta = 52^\circ$, $\alpha = 60^\circ$, $\gamma = 68^\circ$, $F = 316364$.
121. $b = \sqrt{\frac{n}{m} w^2 + \frac{c^2 n^2}{(m + n)^2}}$, $a = \sqrt{\frac{m}{n} w^2 + \frac{c^2 m^2}{(m + n)^2}}$,
 $\sin \frac{1}{2}(\beta - \alpha) = \frac{w(n^2 - m^2)}{2cmn}$, $\cotg \frac{1}{2}\gamma = \frac{n + m}{n - m} \tan \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$;
 $a = 14$, $b = 50$, $\alpha = 16^\circ 15' 36''$, 7 , $\beta = 90^\circ$,
 $\gamma = 73^\circ 44' 23''$, 3 , $F = 336$.
122. $\cos \frac{1}{2}(\beta - \alpha) = \frac{\sin \frac{1}{2}\gamma}{c} (w \cos \frac{1}{2}\gamma \pm \sqrt{c^2 + w^2 \cos \frac{1}{2}\gamma^2})$,
 $\alpha = \beta = 58^\circ 6' 33''$, 2 , $a = b = 53$, $F = 1260$.
123. $a = \sqrt{s^2 - 2sw \cos \frac{1}{2}\gamma}$, $b - c = \sqrt{s^2 - 2sw : \cos \frac{1}{2}\gamma}$,
 $\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)^2 = s \sin \frac{1}{2}\gamma^2 : (s - 2w \cos \frac{1}{2}\gamma)$;
 $c = 558$, $b = a = 521$, $\beta = \alpha = 57^\circ 37' 17''$, 7 ,
 $F = 122760$.

$$124. \cos \frac{1}{2}\gamma = \frac{s^2 - c^2}{2sw}, (a - b)^2 = s^2 - \frac{4s^2 w^2}{s^2 - c^2};$$

$$a = b = 293, \alpha = \beta = 76^\circ 34' 49'', 2, \\ \gamma = 26^\circ 50' 21'', 6, F = 19380.$$

$$125. \cos \frac{1}{2}(\beta - \alpha) = h : w, \frac{1}{2}(\beta + \alpha) = 90^\circ - \frac{1}{2}\gamma; \\ a = 89, b = 761, c = 840, \alpha = 2^\circ 56' 15'', 4, \\ \beta = 25^\circ 59' 21'', 2, F = 16380.$$

$$126. \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = h : w, \cotg \frac{1}{2}\gamma = \tg \frac{1}{2}(\alpha - \beta)(m + n) : (m - n); \\ a = 82, b = 30, c = 104, \alpha = 36^\circ 52' 11'', 6, \\ \beta = 12^\circ 40' 49'', 4, \gamma = 130^\circ 26' 59'', 0, F = 936.$$

$$127. c = u + v; a^2 = \frac{u}{v}(w^2 + uv), b^2 = \frac{v}{u}(w^2 + uv); \\ c = 20, a = 27,276, b = 18,184, \alpha = 91^\circ 3', \\ \beta = 41^\circ 48', \gamma = 47^\circ 9', F = 181,82.$$

C.

$$a) 1. b = p \sqrt{\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}}, a = p \sqrt{\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}}; a = 102, b = 61, \\ c = 109, \gamma = 79^\circ 36' 40'', F = 3060.$$

$$2. a^2 = \frac{2F \sin \alpha}{\sin \beta \sin \gamma}, b^2 = \frac{2F \sin \beta}{\sin \alpha \sin \gamma}, c^2 = \frac{2F \sin \gamma}{\sin \alpha \sin \beta}; \\ a = 229, b = 221, c = 87, \gamma = 15^\circ 11' 21'', 4.$$

$$36. 2r = d : (\sin \gamma - \sin \beta \cos \gamma); a = 370, b = 541, \\ c = 421, F = 77700.$$

(In der Aufgabe ist p_a statt q_a zu lesen.)

$$37. a = w \sin(\beta + \frac{1}{2}\gamma) : \sin \beta, b = w \sin(\beta + \frac{1}{2}\gamma) : \sin \gamma; \\ a) a = 1,08183, b = 0,99366, c = 0,71693, \\ F = 0,34645; \\ b) a = 869,46, b = 1003,12, c = 1156,95, \\ F = 423030.$$

$$b) 1. \tan \alpha = a : h_a'; \alpha = 73^\circ 44' 23'', 0, \gamma = 48^\circ 9' 5'', 9, \\ a = 424, b = 375, F = 59220.$$

D.

1 — 11 führen zu weitläufigen Entwicklungen und sind für Zahlenbeispiele durch Gleichungen höherer Grade lösbar. Die Ausführung würde hier zu weit führen.

1 — 3 sind unstatthafte Aufgaben, da durch zwei der gegebenen Stücke das dritte bereits bestimmt, die Aufgabe also entweder sich widersprechend oder doch unbestimmt ist.

§. 28.

1. $x^2 = \frac{a^2 \sin \gamma^2}{\sin(\beta + \gamma)^2} + \frac{a^2 \sin \alpha^2}{\sin(\alpha + \delta)^2} - \frac{2a^2 \sin \gamma \sin \alpha \cos(\delta - \beta)}{\sin(\beta + \gamma) \sin(\alpha + \delta)}$
 $= \frac{a^2 \sin \beta^2}{\sin(\beta + \gamma)^2} + \frac{a^2 \sin \delta^2}{\sin(\alpha + \delta)^2} - \frac{2a^2 \sin \beta \sin \delta \cos(\gamma - \alpha)}{\sin(\beta + \gamma) \sin(\alpha + \delta)};$
 a) $x = 2656,1$, b) $27,75$.
2. $x^2 = \frac{a^2 \sin \delta^2}{\sin(\gamma + \delta)^2} + \frac{a^2 \sin \beta^2}{\sin(\alpha + \beta)^2} - \frac{2a^2 \sin \beta \sin \delta \cos(\alpha + \gamma)}{\sin(\alpha + \beta) \sin(\gamma + \delta)}$
 $= \frac{a^2 \sin \gamma^2}{\sin(\gamma + \delta)^2} + \frac{a^2 \sin \alpha^2}{\sin(\alpha + \beta)^2} - \frac{2a^2 \sin \alpha \sin \gamma \cos(\beta + \delta)}{\sin(\alpha + \beta) \sin(\gamma + \delta)};$
 $x = 264,1$.
3. a) $a \sin \beta \sin \gamma : \sin(\beta + \gamma) = 554,775$;
 b) $a \sin \alpha \sin \beta : \sin(\alpha + \beta) - b = 2008,72$.
4. $\frac{a \sin \alpha \sin(\gamma - \beta)}{\sin(\alpha + \gamma) \sin(\alpha + \beta)} = 32,083$.
5. $\frac{a \sin \alpha \sin(\beta - \gamma)}{\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha + \gamma)} = 4722,33$.
6. 4,2258 Ml.
7. $a\sqrt{2} \sin \beta = 5$ M.
8. $x^2 + (a + b)x = \frac{ab \sin(\alpha + \beta + \gamma) \sin \beta}{\sin \alpha \sin \gamma}$; $x = 52$.
9. $AB = \frac{a \sin \alpha \sin(\delta - \gamma)}{\sin(\alpha + \delta) \sin(\alpha + \gamma)} = 611$,
 $AC = \frac{a \sin \delta \sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \delta) \sin(\beta + \delta)} = 547,7$.
 $CE = \frac{a \sin \beta}{\sin(\beta + \delta)}$, $BE = \frac{a \sin \alpha}{\sin(\alpha + \gamma)}$,
 $BC^2 = CE^2 + BE^2 - 2CE \cdot BE \cdot \cos(\delta - \gamma)$, $BC = 244,3$.
10. $\sin \varphi = \frac{a \sin \beta}{b}$, $\psi = 180^\circ - (\beta + \gamma + \varphi)$,
 $AD = x = \frac{b \sin \psi}{\sin(\beta + \gamma - \alpha)} = 830,9$,
 $CD = y = \frac{b \sin(\alpha + \varphi)}{\sin(\beta + \gamma - \alpha)} = 907,9$,
 $BD^2 = a^2 + y^2 - 2ay \cos \gamma$, $BD = 782,4$.
11. $\cos \beta = (a^2 + c^2 - b^2) : 2ac$,
 $x = c \sin(\beta - \delta) : \sin \delta = 59,524$.
12. $W^2 = a^2 \sin \beta^2 + b^2 \sin \alpha^2 - 2ab \sin \alpha \sin \beta \cos(\alpha + \beta)$,
 $AD = a(a + b) \sin \beta : W = 229$,
 $BD = ab \sin(\alpha + \beta) : W = 61$,
 $CD = b(a + b) \sin \alpha : W = 109$.

13. Berechnet man aus den Seiten des Dreiecks ABC die Winkel $ABC = \beta$, $BAC = \alpha$, setzt $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, $BDA = \varphi$, $ADC = \psi$, ferner $\operatorname{tg} \vartheta = \sin \gamma \cdot \sin (\psi - \beta) : \sin \beta \cdot \sin (\varphi - \gamma)$, $\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\xi - \eta) = \cotg \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \cotg (45^\circ + \vartheta)$, $\xi + \eta = 180^\circ - (\varphi + \psi)$, so ist $x = a \sin \eta : \sin (\varphi + \psi) = 629$, $y = c \sin (\beta + \xi) : \sin \varphi = 680$.

$$\begin{aligned} 14. \quad AP &= \frac{a \sin \delta}{\sin (\alpha + \beta + \gamma + \delta)}, \quad BP = \frac{a \sin (\delta + \varepsilon)}{\sin (\alpha + \beta + \delta + \varepsilon)}, \\ BQ &= \frac{a \sin (\alpha + \beta)}{\sin (\alpha + \beta + \delta + \varepsilon)}, \quad CQ = \frac{a \sin \alpha}{\sin (\alpha + \delta + \varepsilon + \xi)}, \\ PC &= \frac{a \sin (\delta + \varepsilon + \xi)}{\sin (\alpha + \delta + \varepsilon + \xi)}, \\ AB^2 &= AP^2 + BP^2 - 2AP \cdot BP \cdot \cos \gamma, \\ BC^2 &= BQ^2 + CQ^2 - 2BQ \cdot CQ \cos \xi, \\ AC^2 &= AP^2 + PC^2 - 2AP \cdot PC \cdot \cos (\beta + \gamma); \\ AB &= 19211, \quad BC = 9207, \quad AC = 27366. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15. \quad CD^2 &= \frac{c}{a} (ac - b^2), \quad BD^2 = \frac{a}{c} (ac - b^2), \\ \cos \alpha &= \frac{b(a+c)}{2ac} \text{ für } AB = a, \quad AD = b, \quad AC = c; \\ CD &= 20, \quad BD = 10, \quad \alpha = 30^\circ. \end{aligned}$$

$$16. \quad x^2 = b^2 - 4a \operatorname{tang} \frac{1}{2} \alpha, \quad x = 428,845.$$

$$\begin{aligned} 17. \quad AC^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \quad AC = 0,8482; \\ \sin BAC &= a \sin \beta : AC, \quad BAC = 67^\circ 21'; \\ \cos DAC &= (d^2 + AC^2 - c^2) : 2d \cdot AC, \\ DAC &= 21^\circ 4' 12'', 5; \quad BC^2 = c^2 + d^2 - 2cd \cos (BAC + DAC), \\ BD &= 0,85704; \quad \sin ADB = c \sin (BAC + DAC) : BD, \\ ADB &= 71^\circ 50' 55''; \quad \sin ABD = d \sin (BAC + DAC) : BD, \\ ABD &= 19^\circ 33' 52''; \quad x = BD - f - g = 0,654. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18. \quad \text{Setze } W^2 &= \sin \gamma^2 \sin (\beta + \gamma + \delta)^2 + \sin (\gamma + \delta)^2 \\ &\cdot \sin (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2 \sin \gamma \sin (\gamma + \delta) \sin (\alpha + \beta + \gamma) \\ &\cdot \sin (\beta + \gamma + \delta) \cos \alpha, \text{ so ist} \\ x &= a \sin (\alpha + \beta + \gamma) \sin (\beta + \gamma + \delta) : W = 229. \end{aligned}$$

$$19. \quad \frac{\sqrt{4(a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma) - (a+b)^2 \sin \gamma} - 2(a-b) \cos \frac{1}{2} \gamma^2}{4 \sin \frac{1}{2} \gamma}.$$

$$20. \quad a \sin \alpha \sin \beta : \sin (\beta - \alpha); \text{ a) } 295,5; \text{ b) } 525,89; \text{ c) } 196,97.$$

$$21. \quad a \sin \alpha \sin \beta : \sin (\alpha - \beta) = 368,08.$$

22. $AE = b \sin \beta : \sin (\alpha - \beta)$, $AD = b \sin \alpha : \sin (\alpha - \beta)$,
 $x^2 = a^2 + AE^2 - 2a \cdot AE \cdot \cos \alpha = (a + b)^2 + AD^2$
 $- 2(a + b) \cdot AD \cdot \cos \beta$, $x = 762,03$.
23. $\frac{a}{2 \sin (\beta - \alpha)} \sqrt{\sin^2 \alpha + \sin^2 (\beta - \alpha) - 2 \sin \alpha \sin (\beta - \alpha) \cos \beta}$
 $= 457$.
24. Höhe: $h \sin \alpha : \cos \beta \sin (\alpha + \beta) = 151,01$,
 Entf.: $h \tan \beta = 299,59$.
25. $a \sin \beta \tan \gamma : \sin (\alpha + \beta) = a \sin \alpha \tan \delta : \sin (\alpha + \beta) = 113,97$;
 $\sin \beta \tan \gamma = \sin \alpha \tan \delta$.
26. $AB = a$, $AH = b$, $BH = c$,
 $x^2 = \frac{a^2 - (b^2 + c^2) \sin \alpha^2 + \cos \alpha \sqrt{a^4 - (b^2 - c^2)^2 \sin \alpha^2}}{2 \sin \alpha^2}$,
 $x = 132,3$.
27. $\cot g x = \sqrt{a^2 \cot g \beta^2 + b^2 - ab \cot g \beta \sqrt{2}} : a$,
 $x = 42^\circ 0' 5''$.
28. $a : \sqrt{\cot g \alpha^2 + \cot g \beta^2 - 2 \cot g \alpha \cot g \beta \cos 22^\circ 30'} = a \sin \alpha \sin \beta$;
 $\sqrt{\sin (\alpha + \beta)^2 - \sin 2\alpha \cdot \sin 2\beta \cdot \cos \frac{1}{2} \varphi^2} = 18,503$.
29. Höhe: $x = c \sin \alpha \sin \beta$;
 $\sqrt{\sin \alpha^2 + \sin \beta^2 - 2 \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma} = 1584,56$,
 Entf. von A , $x : \sin \alpha = 1661,46$; von B ,
 $x : \sin \beta = 3145,36$.
30. $x^2 = \frac{-ab \sin \beta^2 \cdot \sin \alpha^2 \cdot \sin \gamma^2 \cdot (a + b)}{b \sin (\alpha + \beta) \sin (\alpha - \beta) \sin \gamma^2 + a \sin (\beta + \gamma) \sin (\gamma - \beta) \sin \alpha^2}$,
 $x = 10$.
31. $a \sin (\beta + \delta) \sin (\gamma + \delta) : \sin (\gamma - \beta) \cos \delta = 60$.
32. $\frac{a \sin \alpha \sin (\beta - \varphi)}{\sin (\alpha + \beta)} + b = \frac{a \sin \beta \sin (\alpha + \varphi)}{\sin (\alpha + \beta)} = 264$,
 $\sin \varphi = \frac{b}{a}$.
33. $\sin \varphi = \frac{c - b}{a}$, $x = \frac{a \sin (\alpha - \varphi) \sin \beta}{\sin (\beta - \alpha)} + c$
 $= \frac{a \sin (\beta - \varphi) \sin \alpha}{\sin (\beta - \alpha)} + b = 99$.
34. $12^m,052$.
35. $c^2 = a^2 \cot g \alpha^2 + b^2 \cot g \beta^2 - 2ab \cot g \alpha \cot g \beta \cos \gamma$,
 $x^2 = (a - b)^2 + c^2$; $x = 203,06$.
36. $h \sqrt{\tan \alpha^2 + \tan \beta^2 - 2 \tan \alpha \tan \beta \cos \gamma} = 276,14$.

13. Berechnet man aus den Seiten des Dreiecks ABC die Winkel $ABC = \beta$, $BAC = \alpha$, setzt $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, $BDA = \varphi$, $ADC = \psi$, ferner $\lg \vartheta = \sin \gamma \cdot \sin (\psi - \beta) : \sin \beta \cdot \sin (\varphi - \gamma)$, $\lg \frac{1}{2}(\xi - \eta) = \cotg \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \cotg (45^\circ + \vartheta)$, $\xi + \eta = 180^\circ - (\varphi + \psi)$, so ist $x = a \sin \eta : \sin (\varphi + \psi) = 629$, $y = c \sin (\beta + \xi) : \sin \varphi = 680$.

$$14. AP = \frac{a \sin \delta}{\sin (\alpha + \beta + \gamma + \delta)}, BP = \frac{a \sin (\delta + \varepsilon)}{\sin (\alpha + \beta + \delta + \varepsilon)},$$

$$BQ = \frac{a \sin (\alpha + \beta)}{\sin (\alpha + \beta + \delta + \varepsilon)}, CQ = \frac{a \sin \alpha}{\sin (\alpha + \delta + \varepsilon + \xi)},$$

$$PC = \frac{a \sin (\delta + \varepsilon + \xi)}{\sin (\alpha + \delta + \varepsilon + \xi)},$$

$$AB^2 = AP^2 + BP^2 - 2AP \cdot BP \cdot \cos \gamma,$$

$$BC^2 = BQ^2 + CQ^2 - 2BQ \cdot CQ \cos \xi,$$

$$AC^2 = AP^2 + PC^2 - 2AP \cdot PC \cdot \cos (\beta + \gamma);$$

$$AB = 19211, BC = 9207, AC = 27366.$$

$$15. CD^2 = \frac{c}{a} (ac - b^2), BD^2 = \frac{a}{c} (ac - b^2),$$

$$\cos \alpha = \frac{b(a+c)}{2ac} \text{ für } AB = a, AD = b, AC = c;$$

$$CD = 20, BD = 10, \alpha = 30^\circ.$$

$$16. x^2 = b^2 - 4a \tan \frac{1}{2} \alpha, x = 428,845.$$

$$17. AC^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, AC = 0,8482;$$

$$\sin BAC = a \sin \beta : AC, BAC = 67^\circ 21';$$

$$\cos DAC = (d^2 + AC^2 - e^2) : 2d \cdot AC,$$

$$DAC = 21^\circ 4' 12'', 5; BC^2 = c^2 + d^2 - 2cd \cos (BAC + DAC),$$

$$BD = 0,85704; \sin ADB = c \sin (BAC + DAC) : BD,$$

$$ADB = 71^\circ 50' 55''; \sin ABD = d \sin (BAC + DAC) : BD,$$

$$ABD = 19^\circ 33' 52''; x = BD - f - g = 0,654.$$

$$18. \text{Setze } W^2 = \sin \gamma^2 \sin (\beta + \gamma + \delta)^2 + \sin (\gamma + \delta)^2$$

$$\cdot \sin (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2 \sin \gamma \sin (\gamma + \delta) \sin (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\cdot \sin (\beta + \gamma + \delta) \cos \alpha, \text{ so ist}$$

$$x = a \sin (\alpha + \beta + \gamma) \sin (\beta + \gamma + \delta) : W = 229.$$

$$19. \frac{\sqrt{4(a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma) - (a+b)^2 \sin \gamma - 2(a-b) \cos \frac{1}{2} \gamma^2}}{4 \sin \frac{1}{2} \gamma}.$$

$$20. a \sin \alpha \sin \beta : \sin (\beta - \alpha); a) 295,5; b) 525,89; c) 196,97.$$

$$21. a \sin \alpha \sin \beta : \sin (\alpha - \beta) = 368,08.$$

$$22. AE = b \sin \beta : \sin (\alpha - \beta), AD = b \sin \alpha : \sin (\alpha - \beta), \\ x^2 = a^2 + AE^2 - 2a \cdot AE \cdot \cos \alpha = (a + b)^2 + AD^2 \\ - 2(a + b) \cdot AD \cdot \cos \beta, x = 762,03.$$

$$23. \frac{a}{2 \sin (\beta - \alpha)} \sqrt{\sin \alpha^2 + \sin (\beta - \alpha)^2 - 2 \sin \alpha \sin (\beta - \alpha) \cos \beta} \\ = 457.$$

$$24. \text{Höhe: } h \sin \alpha : \cos \beta \sin (\alpha + \beta) = 151,01, \\ \text{Entf.: } h \tan \beta = 299,59.$$

$$25. a \sin \beta \tan \gamma : \sin (\alpha + \beta) = a \sin \alpha \tan \delta : \sin (\alpha + \beta) = 113,97; \\ \sin \beta \tan \gamma = \sin \alpha \tan \delta.$$

$$26. AB = a, AH = b, BH = c, \\ x^2 = \frac{a^2 - (b^2 + c^2) \sin \alpha^2 + \cos \alpha \sqrt{a^4 - (b^2 - c^2)^2 \sin \alpha^2}}{2 \sin \alpha^2}, \\ x = 132,3.$$

$$27. \cot g x = \sqrt{a^2 \cot g \beta^2 + b^2 - ab \cot g \beta \sqrt{2}} : a, \\ x = 42^\circ 0' 5''.$$

$$28. a : \sqrt{\cot g \alpha^2 + \cot g \beta^2 - 2 \cot g \alpha \cot g \beta \cos 22^\circ 30'} = a \sin \alpha \sin \beta : \\ \sqrt{\sin (\alpha + \beta)^2 - \sin 2\alpha \cdot \sin 2\beta \cdot \cos \frac{1}{2} \varphi^2} = 18,503.$$

$$29. \text{Höhe: } x = c \sin \alpha \sin \beta : \\ \sqrt{\sin \alpha^2 + \sin \beta^2 - 2 \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma} = 1584,56, \\ \text{Entf. von } A, x : \sin \alpha = 1661,46 : \text{von } B, \\ x : \sin \beta = 3145,36.$$

$$30. x^2 = \frac{-ab \sin \beta^2 \cdot \sin \alpha^2 \cdot \sin \gamma^2 \cdot (a + b)}{b \sin (\alpha + \beta) \sin (\alpha - \beta) \sin \gamma^2 + a \sin (\beta + \gamma) \sin (\gamma - \beta) \sin \alpha^2}, \\ x = 10.$$

$$31. a \sin (\beta + \delta) \sin (\gamma + \delta) : \sin (\gamma - \beta) \cos \delta = 60.$$

$$32. \frac{a \sin \alpha \sin (\beta - \varphi)}{\sin (\alpha + \beta)} + b = \frac{a \sin \beta \sin (\alpha + \varphi)}{\sin (\alpha + \beta)} = 264, \\ \sin \varphi = \frac{b}{a}.$$

$$33. \sin \varphi = \frac{c - b}{a}, x = \frac{a \sin (\alpha - \varphi) \sin \beta}{\sin (\beta - \alpha)} + c \\ = \frac{a \sin (\beta - \varphi) \sin \alpha}{\sin (\beta - \alpha)} + b = 99.$$

$$34. 12^m, 052.$$

$$35. c^2 = a^2 \cot g \alpha^2 + b^2 \cot g \beta^2 - 2ab \cot g \alpha \cot g \beta \cos \gamma, \\ x^2 = (a - b)^2 + c^2; x = 203,06.$$

$$36. h \sqrt{\tan g \alpha^2 + \tan g \beta^2 - 2 \tan g \alpha \tan g \beta \cos \gamma} = 276,14.$$

$$37. \frac{h}{\sin \beta \sin \gamma} \sqrt{\sin^2 \beta + \sin^2 \gamma - 2 \sin \beta \sin \gamma \cos \alpha} = 383,05.$$

$$38. BC = \frac{a \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} = 205; AC = \frac{a \sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha + \gamma)} = 445;$$

$$AB = \frac{a \sin \beta \sin \gamma}{\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha + \gamma)} = 624,$$

Höhe von B gleich $AB \cdot \sin \delta = 38,925 (39)$,

von C gleich $BC \cdot \sin \varepsilon + AB \cdot \sin \delta = 84$.

$$39. R = 133,54, \quad \angle P | R = 41^\circ 55' 32'', 2,$$

$$\angle Q | R = 30^\circ 4' 27'', 8.$$

$$40. P | R = 56^\circ, \quad Q | R = 57^\circ 20'.$$

$$41. P = 5169,9, \quad Q = 9632,5.$$

$$42. Q = 244, \quad Q | R = 26^\circ 47' 5'', 3.$$

$$43. Q = 137, \quad P | R = 26^\circ 47' 7'', 6.$$

$$44. R = 3700, \quad Q = 1201.$$

$$45. x = \frac{(a+2b)(a-b)}{6(a+b)\sin(\alpha+\beta)} \sqrt{\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - 2 \sin \alpha \sin \beta \cos(\alpha+\beta)};$$

$$a) \frac{(a+2b)(a-b)}{6(a+b)} \tan \alpha; \quad b) \frac{1}{2}c;$$

$$c) \frac{a}{6 \sin(\alpha+\beta)} \sqrt{\sin^2 \alpha + \text{etc.}}, \text{ wie vorher.}$$

$$46. c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma, \quad c = 123;$$

$$d = b(b - a \cos \gamma) : 2c = 16,5; \quad x = \frac{2}{3}(c - d) = 71,$$

$$y = \frac{1}{3}(c + 2d) = 52.$$

$$49. g t^2 \sin(45^\circ - \frac{1}{2}\alpha)^2 = 36,586.$$

$$50. 333 \sqrt{2b^2 + 2bc + c^2 - 2b(b+c) \cos \alpha} = 4550,9.$$

$$51. \sin \beta = a \sin \alpha : l, \quad \varphi = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 79^\circ 20'.$$

$$52. a) 90^\circ - \alpha, \quad b) 180^\circ - \alpha, \quad c) 180^\circ - 2\alpha.$$

$$53. a) AC = \frac{2r \sin \frac{1}{2}\beta \cos(\delta \pm \frac{1}{2}\beta)}{\sin(\gamma - \beta \mp \delta)},$$

$$x^2 = AC^2 + r^2 + 2r AC \cdot \cos \gamma; \quad b) 59,336.$$

$$54. 12\frac{1}{2}\frac{1}{3} = 12,4138.$$

$$55. \tan \alpha = \frac{3b+2x}{5a-2y}, \text{ oder } \frac{3b+2x}{3a+2y}; \quad 20^\circ 11' 40'' \text{ oder } 29^\circ 18' 39'', 2.$$

$$56. \sqrt{a^2 + ab + b^2}.$$

$$57. \text{ Es ist gleichseitig. } 58. F_1 = 10,3445.$$

$$59. n = 3 \text{ oder } 1; \quad F = \frac{1}{2}hh' : \sin \gamma \text{ oder } \frac{1}{2}hh' : \sin \gamma.$$

60. Ist F der Flächeninhalt des gegebenen Dreiecks, so ist

$$S = \sqrt{\frac{1}{4}(a^2 + b^2 + c^2) + 6F : \sqrt{3}},$$

$$\Sigma = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + c^2) - 2F : \sqrt{3}.$$

61. $\alpha = 180^\circ - \alpha_1$; $\beta = \alpha_1 + \gamma_1 - 180^\circ$; $\gamma = 180^\circ - \gamma_1$;

$$a = \frac{b_1 - a_1 \cos \gamma_1}{\sin \gamma_1} + \frac{c_1 - a_1 \cos \beta_1}{\sin \beta_1}, \text{ etc.}$$

$$a = 62,481; b = 52,090; c = 52,045.$$

62. $\tan \varphi = \frac{m+n}{m-n} \tan \alpha$, $\varphi = 45^\circ$.

63. $\cos(2x_1 + \gamma) = \sqrt{2} \cdot \sin(45^\circ - \gamma)$;

$$\cos(2x_{11} - \gamma) = \sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ - \gamma); x_1 = x_{11} = 45^\circ.$$

64. $a^2(\sin \alpha - \frac{1}{4}\pi)$; $a^2(1 - \frac{1}{4}\pi) = 0,214602 a^2$.

65. $\frac{1}{2}b \pm \sqrt{4b^2 - a(a-b)} \tan \frac{1}{2}\beta^2$; 1,2; 0,05.

66. $R = c \sin \frac{1}{4}(\beta + \alpha) \cos \frac{1}{4}(\beta - \alpha) = 392,42$;

$$r = c \cos \frac{1}{4}(\beta + \alpha) \cdot \sin \frac{1}{4}(\beta - \alpha) = 170,99.$$

67. $\cos \alpha = \frac{d^2 + (q+r)^2 - (q+R)^2}{2d(q+r)}$, $\cos \beta = \frac{(q+r)^2 + (q+R)^2 - d^2}{2(q+r)(q+R)}$,

$$\alpha + \frac{1}{2}\beta - 90^\circ = 29^\circ 49' 44''.$$

68. $\pm \frac{d^2 + R^2 - r^2 - 2dR \cos \alpha}{2(r \mp R \pm d \cos \alpha)}$.

69. $x^2 = 2a^2 \tan \alpha \sin \beta \frac{\cos(\beta - \alpha) \pm \sqrt{\sin \beta \sin(2\alpha - \beta)}}{\cos \alpha}$.

70. Setzt man $\frac{r}{a} = p$, $\frac{\sin \alpha \pm p \cos(\alpha - \gamma)}{\sin(\alpha - \gamma)} = q$, so ist

$$q \sin \varphi \pm p \cos \varphi = 1, \text{ und für } \frac{p}{q} = \tan \gamma,$$

$$\sin(\varphi \pm \gamma) = \frac{\cos \beta}{q}.$$

71. Setzt man $AC = a$, $BC = b$, $\sphericalangle ACB = \gamma$, $\sphericalangle ACO = \varphi$,

$$\text{so ist für } \frac{a(b^2 - r^2)}{b(a^2 - r^2) \sin \gamma} - \cot \gamma = \cot \vartheta,$$

$$\cos(\vartheta + \varphi) = \frac{r(b^2 - a^2) \sin \vartheta}{b(a^2 - r^2) \sin \gamma}.$$

72. Er ist um $0^\circ 6' 38''$ zu klein.

73. Er ist um $c \cdot 0^\circ 1' 3''$ zu klein.

74. Um $1^\circ 42' 5'',8$ zu gross. 75. Um $0^\circ 2' 30''$ zu klein.

76. Um $0^\circ 5' 25''$ zu gross.

77. Um $0^\circ 12' 28''$. Um $0,0072a$.

§. 29.

- a) 1. $f = 99$, $F = 4116$, $\alpha = 123^\circ 8' 48''$, $\beta = 59^\circ 29' 23''$, $\gamma = 145^\circ 57' 32''$, $\delta = 31^\circ 24' 16''$, 3.
2. $c = 12,0415$, $d = 10,8168$, $f = 16$, $F = 112$,
 $\alpha = 105^\circ 42' 32''$, $\beta = 89^\circ 24' 53''$, $\gamma = 89^\circ 33' 8''$, 3,
 $\alpha_2 = 49^\circ 23' 55''$, $\beta_1 = 40^\circ 36' 4''$, $\beta_2 = 48^\circ 48' 50''$, 4,
 $\gamma_1 = 41^\circ 11' 9''$, $\delta_1 = 41^\circ 38' 2''$, $\delta_2 = 33^\circ 41' 24''$, 4.
3. $b = 12,0415$, $d = 12,2066$, $f = 18$, $F = 144$,
 $\alpha = 103^\circ 49' 19''$, $\beta = 89^\circ 33' 7''$, $\gamma = 89^\circ 38' 48''$, 1,
 $\delta = 76^\circ 58' 45''$, 1, ferner die Winkel α_1 , β_1 , β_2 , γ_1 ,
 δ_1 , δ_2 der Reihe nach: $55^\circ 0' 28''$, 9; $41^\circ 11' 9''$, 5;
 $48^\circ 21' 57''$, 9; $41^\circ 38' 2''$, 1; $41^\circ 59' 14''$, 0; $34^\circ 59' 31''$, 1.
4. Für das eine der beiden Dreiecke ist: $d = 7,07109$,
 $e = 6$, $f = 10$, $F = 30$, $\alpha = 153^\circ 26' 9''$, 1,
 $\gamma = 85^\circ 25' 34''$, 0, α_1 bis $\delta_2 = 81^\circ 52' 11''$, 8;
 $71^\circ 33' 57''$, 3; $18^\circ 26' 2''$, 7; $59^\circ 2' 10''$, 4; $30^\circ 57' 49''$, 6,
 $54^\circ 27' 44''$, 4; $35^\circ 32' 15''$, 6; $8^\circ 7' 48''$, 2.
5. $c = 5$, $d = 4,12318$, $e = 4$, $f = 6$, $F = 12$,
 $\alpha = 139^\circ 23' 55''$, 5, $\gamma = 86^\circ 49' 12''$, 8, $\delta = 50^\circ 54' 21''$, 8;
 α_2 bis δ_2 $63^\circ 26' 5''$, 7; $26^\circ 33' 54''$, 3; $56^\circ 18' 35''$, 6;
 $33^\circ 41' 24''$, 4; $36^\circ 52' 11''$, 6; $14^\circ 2' 10''$, 2.
6. Zweideutig, das Zahlenbeispiel eindeutig; $b = 5,831$,
 $c = 7,81033$, $d = 6,08271$, $f = 9$, $F = 27$,
 $\alpha = 152^\circ 6' 12''$, 7; α_1 u. s. w.: $80^\circ 32' 15''$, 4;
 $71^\circ 33' 57''$, 3; $18^\circ 26' 2''$, 7; $59^\circ 2' 10''$, 4; $30^\circ 57' 49''$, 6;
 $50^\circ 11' 39''$, 5; $39^\circ 48' 20''$, 5; $9^\circ 27' 44''$, 6.
7. $d = 24$, $F = 132$, $\alpha = 36^\circ 52' 11''$, 6, $\delta = 61^\circ 55' 39''$, 1.
8. Zweideutig, das Beispiel eindeutig: $c = 11,4018$, $e = 10$,
 $f = 14$, $F = 70$, $\alpha = 130^\circ 36' 7''$, 7, $\beta = 85^\circ 25' 34''$, 0,
 $\gamma = 87^\circ 39' 45''$, 8, $\delta = 56^\circ 18' 32''$, 5, α_1 etc.: $71^\circ 33' 57''$, 3;
 $54^\circ 27' 44''$, 4; $35^\circ 32' 15''$, 6; $52^\circ 7' 30''$, 2; $37^\circ 52' 29''$, 8;
 $18^\circ 26' 2''$, 7.
9. $d_1 = 10,7703$, $e = 12$, $f = 17$, $F = 102$,
 $\alpha = 128^\circ 27' 14''$, 0, $\gamma = 92^\circ 31' 35''$, 1, $\delta = 60^\circ 27' 39''$, 2;
 α_1 etc.: $68^\circ 11' 52''$, 2; $60^\circ 15' 18''$, 75; $29^\circ 44' 41''$, 25;
 $48^\circ 48' 50''$, 5; $41^\circ 11' 9''$, 5; $51^\circ 20' 25''$, 6; $21^\circ 48' 4''$, 8.

10. $b = 7,211$, $d = 9,2196$, $e = 8$, $f = 13$, $F = 52$,
 $\beta = 82^\circ 52' 29'', 9$, $\gamma = 90^\circ$, α_2 etc.: $63^\circ 26' 5'', 7$;
 $26^\circ 33' 54'', 3$; $56^\circ 18' 35'', 6$; $33^\circ 41' 24'', 4$; $56^\circ 18' 35'', 6$;
 $33^\circ 41' 24'', 4$; $12^\circ 31' 44'', 0$.
11. $a_1 = 2,2361$, $b = 4,47215$, $c = 6,40314$,
 $\alpha = 142^\circ 7' 30'', 3$, $\beta = 90^\circ$, $\gamma = 78^\circ 54' 19'', 9$,
 $\delta = 49^\circ 49' 9'', 9$; $F = 17,5$; α_1 etc.: $78^\circ 41' 24'', 6$;
 $63^\circ 26' 5'', 7$; $26^\circ 33' 54'', 3$; $63^\circ 26' 5'', 7$; $51^\circ 20' 25'', 6$;
 $38^\circ 39' 34'', 4$.
12. $c = 10,8168$, $d = 9,0556$, $e = 7$, $f = 12$, $F = 42$,
 $\alpha = 155^\circ 13' 32'', 3$, $\gamma = 82^\circ 52' 29'', 9$, $\delta = 40^\circ 1' 49'', 4$;
 α_2 etc.: $71^\circ 33' 57'', 3$; $18^\circ 26' 2'', 7$; $63^\circ 26' 5'', 7$;
 $26^\circ 33' 54'', 3$; $56^\circ 18' 35'', 6$; $33^\circ 41' 24'', 4$.
- b) 1. Aus $\triangle ABC$ bestimme e , α_2 , γ_1 , setze $r = a : 2 \sin \delta_2$,
 $p^2 = e^2 + r^2 - 2er \sin(\alpha_2 + \delta_2)$, $\sin \vartheta = r \cos(\alpha_2 + \delta_2) : p$,
 $\cos \eta = (c^2 + p^2 - r^2) : 2cp$, so ist $\gamma_2 = \vartheta \pm \eta$; be-
 rechne dann das $\triangle ACD$, u. s. w. $d = 7,07109$, $e = 6$,
 $f = 9$, $F = 27$, $\alpha = 145^\circ 18' 17'', 5$, $\gamma = 76^\circ 15' 49'', 2$,
 $\delta = 43^\circ 40' 3'', 8$; α_1 etc.: $81^\circ 52' 11'', 8$; $63^\circ 26' 5'', 7$;
 $26^\circ 33' 54'', 3$; $68^\circ 11' 55'', 2$; $21^\circ 48' 4'', 8$; $54^\circ 27' 44'', 4$;
 $35^\circ 32' 15'', 6$.
2. Aus $\triangle ABC$ ergeben sich e , α_2 , γ_1 . Setzt man
 $\alpha_2 + \beta_1 - \delta = \sigma$, so ist $e \cos(\sigma + 2\delta_2) = e \cos \sigma$
 $- 2a \sin \beta_1 \sin \delta = e \cos(\sigma - 2\gamma_2)$, u. s. w. $c = 9,2196$,
 $d = 7,07109$, $e = 7$, $f = 9$, $\alpha = 145^\circ 18' 17'', 5$,
 $\gamma = 67^\circ 50' 1'', 1$, $F = 31,5$; α_1 etc.: $81^\circ 52' 11'', 8$;
 $63^\circ 26' 5'', 7$; $71^\circ 33' 54'', 3$; $18^\circ 26' 5'', 7$; $49^\circ 23' 55'', 4$;
 $40^\circ 36' 4'', 7$; $8^\circ 7' 48'', 2$.
3. $\sin \alpha : \sin \gamma = b \sin \delta_2 : a \sin \delta_1 = \operatorname{tg} \varphi$;
 $\operatorname{tang} \frac{1}{2}(\alpha - \gamma) = \operatorname{tang} \frac{1}{2}(\alpha + \gamma) \operatorname{tang}(\varphi - 45^\circ)$,
 $\frac{1}{2}(\alpha + \gamma) = 180^\circ - \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2 + \beta)$; $c = 9,434$,
 $d = 8,06225$, $e = 6$, $f = 11$, $F = 33$,
 $\alpha = 154^\circ 26' 27'', 3$, $\gamma = 88^\circ 57' 30'', 0$, $\delta = 39^\circ 7' 49'', 6$,
 α_1 etc.: $82^\circ 52' 30'', 0$; $71^\circ 33' 57'', 3$; $18^\circ 26' 2'', 7$;
 $59^\circ 2' 10'', 4$; $30^\circ 57' 49'', 6$; $57^\circ 59' 40'', 4$.
- c) 1. $\delta = 360^\circ - (\alpha + \beta + \gamma)$; $b = \frac{c \sin \delta - a \sin \alpha}{\sin(\gamma + \delta)}$,

$$d = \frac{c \sin \gamma - a \sin \beta}{\sin (\gamma + \delta)}, F = \frac{c^2 \sin \delta \sin \gamma - a^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin (\gamma + \delta)^2};$$

$$b = 29, d = 84, F = 614, \delta = 12^\circ 40' 49'', 4.$$

$$2. \sin \varphi = (a \sin \alpha - c \sin \delta) : b, \beta = 180^\circ - (\alpha + \varphi), \\ \gamma = \varphi + 180^\circ - \delta,$$

$$d = \frac{b \sin (\alpha + \varphi) + c \sin (\alpha + \delta)}{\sin \alpha} = \frac{a \sin (\alpha + \delta) + b \sin (\delta - \varphi)}{\sin \delta},$$

$$d = 9,4868, c = 7, f = 13, F = 45,5, \beta = 70^\circ 20' 45'', 8, \\ \gamma = 90^\circ.$$

$$3. \delta = 360^\circ - (\alpha + \beta + \gamma), \delta_2 = \delta - \delta_1, \\ \beta_2 = 180^\circ - (\gamma + \delta_1), \beta_1 = \beta - \beta_2, v = \sin \alpha \sin \gamma : \\ \sqrt{\sin \alpha^2 \sin \delta_1^2 + \sin \gamma^2 \sin \delta_2^2 - 2 \sin \alpha \sin \gamma \sin \delta_1 \sin \delta_2 \cos \beta},$$

$$a = \frac{v \cdot \sin \delta_2}{\sin \alpha} \cdot e, b = \frac{v \cdot \sin \delta_1}{\sin \gamma} \cdot e, c = \frac{v \cdot \sin \beta_2}{\sin \gamma} \cdot e,$$

$$d = \frac{v \cdot \sin \beta_1}{\sin \alpha} \cdot e; a = 15,81145, b = 29,155, c = 51,478, \\ d = 47,434, f = 60, \delta = 35^\circ 23' 41'', 7, F = 900.$$

$$4. a = 3,6055, b = 5,831, d = 6,32457, e = 7, f = 9, \\ F = 31,5, \alpha = 127^\circ 52' 32'', 9, \gamma = 102^\circ 31' 46'', 9, \\ \delta = 48^\circ 14' 23'', 2.$$

$$5. a = 5,3851, b = 8,6023, c = 11,4018, d = 9,2196, \\ e = 9, \alpha = 145^\circ 40' 11'', 2, \gamma = 87^\circ 39' 45'', 76, \\ \delta = 50^\circ 24' 13'', 8, F = 63.$$

$$6. \text{Es ist } \sin \alpha_1 \cdot \sin \beta_1 \cdot \sin \gamma_1 \cdot \sin \delta_1 = \sin \alpha_2 \cdot \sin \beta_2 \cdot \sin \gamma_2 \\ \cdot \sin \delta_2 = P, \alpha_2 + \beta_2 = 180^\circ - (\beta_1 + \gamma_1), \\ (\gamma_2 + \delta_2) = 180^\circ - (\alpha_1 + \delta_1), \text{daher f\"ur } \alpha_2 - \beta_2 = x, \gamma_2 - \delta_2 = y, \\ 4P = [\cos x + \cos (\beta_1 + \gamma_1)] \cdot [\cos y - \cos (\alpha_1 + \delta_1)] \\ \text{und } y - x = \alpha_1 + \beta_1 - \gamma_1 - \delta_1, \text{ u. s. w.}$$

$$7. \cos (\alpha_1 - \gamma + 2\gamma_2) = \frac{2a \sin \beta \sin \alpha_1}{c} + \cos (\alpha_1 + \gamma).$$

$$8. \alpha_1 = \beta_2 + \gamma_1 - \delta_2, \gamma_1 + \alpha_2 = x, \\ A \cos 2x + B \sin 2x = C \text{ f\"ur} \\ A = a^2 (\sin \delta_2^2 - 2 \cos \alpha_1 \cos \beta_2 \sin \gamma_1 \sin \delta_2 + \sin \gamma_1^2), \\ B = 2a^2 \sin \gamma_1 \sin \beta_2 (\cos \alpha_1 \sin \delta_2 - \sin \gamma_1 \cos \beta_2), \\ C = A - c^2 \sin \gamma_1^2 \sin \delta_2^2.$$

$$9. \delta = 180^\circ - (\alpha_1 + \gamma_2), \delta_2 = \delta - \delta_1, \\ \sin \alpha_1 \sqrt{a^2 - f^2 \sin \delta_2^2} - \sin \gamma_2 \sqrt{b^2 - f^2 \sin \delta_1^2} \\ = f (\sin \gamma_2 \cos \delta_1 - \sin \alpha_1 \cos \delta_2), \text{ u. s. w.}$$

- B a) 1.** $\sin \alpha = F : ab$. $c_1 = 867$, $\alpha = 95^\circ 22' 18''{,}4$,
 $\alpha_2 = 33^\circ 51' 18''{,}1$, $\alpha_1 = 61^\circ 22' 0''{,}3$, $\beta_1 = 30^\circ 52' 11''{,}4$,
 $\beta_2 = 53^\circ 55' 30''{,}2$, $\varphi = 64^\circ 43' 29''{,}5$, $f = 941,357$.
- 2.** $b = F : a \sin \alpha = 509$, $e = 555$, $f = 881,014$,
 $\alpha_2 = 55^\circ 47' 40''{,}4$, $\alpha_1 = 59^\circ 48' 50''{,}3$, $\beta_1 = 31^\circ 23' 56''{,}6$,
 $\beta_2 = 32^\circ 59' 32''{,}7$, $\varphi = 87^\circ 11' 37''{,}0$.
- 3.** $\sin \varphi = 2F : ef$; $a^2 = \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4}f^2 - \frac{1}{2}ef \cos \varphi$,
 $b^2 = \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4}f^2 + \frac{1}{2}ef \cos \varphi$; $a = b = 325$,
 $\alpha = 12^\circ 43' 9''{,}6$, $\alpha_1 = \alpha_2 = 6^\circ 21' 34''{,}8$,
 $\beta_1 = \beta_2 = 83^\circ 38' 25''{,}2$, $\varphi = 90^\circ$.
- 4.** $f = 2F : e \sin \varphi$, a und b wie vorher. $a = 173,858$,
 $b = 174,544$, $f = 84,5$, $\alpha = 151^\circ 55' 42''{,}0$,
 $\alpha_2 = 75^\circ 30' 46''{,}5$, $\alpha_1 = 76^\circ 24' 55''{,}5$, $\beta_1 = 14^\circ 0' 27''{,}5$,
 $\beta_2 = 14^\circ 3' 50''{,}5$.
- 5.** $(e + f)^2 = 2(b^2 + a^2) + 2(b^2 - a^2) : \cos \varphi$,
 $(e - f)^2 = 2(b^2 + a^2) - 2(b^2 - a^2) : \cos \varphi$,
 $\sin \alpha_2 = f \sin \varphi : 2a$, $\sin \alpha_1 = f \sin \varphi : 2b$,
 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, u. s. w. $e = f = 377$, $F = 52440$,
 $\alpha = 90^\circ$, $\alpha_2 = \beta_1 = 66^\circ 13' 21''{,}7$, $\alpha_1 = \beta_2 = 23^\circ 46' 38''{,}3$.
- 6.**
 $b = \frac{a}{\sin \varphi} \sqrt{1 + \cos \varphi^2 - 2 \cos \alpha^2 \cos \varphi^2 + 2 \sin \alpha \cos \varphi \sqrt{1 - \cos \alpha^2 \cos \varphi^2}}$,
 $\alpha_1 + \beta_2 = \varphi$, $\cos [\alpha - (\alpha_1 - \beta_2)] = \cos \alpha \cos \varphi$, u. s. w.
 $b = 545$, $e = 663$, $F = 309852$, $\alpha_2 = 50^\circ 41' 32''{,}5$,
 $\alpha_1 = 59^\circ 2' 21''{,}3$, $\beta_1 = 33^\circ 3' 52''{,}7$, $\beta_2 = 37^\circ 12' 13''{,}5$.
- 7.** $\sin \alpha_2 = F : ae$, $b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2$. (Zahlen-
beispiel eindeutig.) $b = 23$, $f = 32,5269$, $\alpha = 90^\circ$,
 $\alpha_2 = \alpha_1 = \beta_1 = \beta_2 = 45^\circ$, $\varphi = 90^\circ$.
- 8.** $(e + f)^2 = 4a^2 + 4F \cotg \frac{1}{2} \varphi$, $(e - f)^2 = 4a^2 - 4F \tan \frac{1}{2} \varphi$,
 $b^2 = a^2 + 2F \cotg \varphi$; $b = 357$, $e = f = 365$, $\alpha = 90^\circ$,
 $\alpha_2 = 77^\circ 58' 55''{,}1 = \beta_1$, $\alpha_1 = \beta_2 = 12^\circ 1' 4''{,}9$.
- 9.** $(a + e)^2 = b^2 + 2F \cotg \frac{1}{2} \alpha_2$, $(a - e)^2 = b^2 - 2F \tan \frac{1}{2} \alpha_2$;
 $a = 136$, $e = f = 305$, $\alpha = 90^\circ$, $\alpha_1 = \beta_2 = 26^\circ 28' 51''{,}7$,
 $\beta_1 = 63^\circ 31' 8''{,}3$, $\varphi = 52^\circ 57' 43''{,}4$.
- 10.** $f^4(1 + 8 \sin \beta_2^2) + 2f^2[4 \sin \beta_2^2(e^2 - 2a^2) - e^2 - 4a^2]$
 $+ (e^2 - 4a^2)^2 = 0$; $b = 89$, $f = 78$, $F = 6240$,
 $\alpha = 51^\circ 58' 42''{,}4$, $\alpha_2 = \alpha_1 = 25^\circ 59' 21''{,}2$,
 $\beta_1 = \beta_2 = 64^\circ 0' 38''{,}8$.

$$11. (a+b)^2 = \frac{e^2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2 - f^2 \sin \frac{1}{2} \alpha^2}{\cos \alpha},$$

$$(a-b)^2 = \frac{f^2 \cos \frac{1}{2} \alpha^2 - e^2 \sin \frac{1}{2} \alpha^2}{\cos \alpha},$$

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2}(\beta_2 - \beta_1) = \sqrt{\frac{f^2 \cotg \frac{1}{2} \alpha^2 - e^2}{e^2 - f^2 \operatorname{tang} \frac{1}{2} \alpha^2}}; a=b=85, F=5544.$$

$$\alpha_2 = \alpha_1 = 25^\circ 3' 27'', 4, \beta_1 = \beta_2 = 64^\circ 56' 32'', 6, \varphi = 90^\circ.$$

$$12. \sin \frac{1}{2}(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{(a-b) \sin \frac{1}{2} \alpha}{e}, a+b = \frac{e \cos \frac{1}{2}(\alpha_2 - \alpha_1)}{\cos \frac{1}{2} \alpha},$$

$$\alpha_2 + \alpha_1 = \alpha; a = 964, b = 773, f = 1723, 07,$$

$$F = 187980, \alpha_2 = 42^\circ 4' 30'', 1, \alpha_1 = 123^\circ 18' 48'', 4,$$

$$\beta_1 = 6^\circ 29' 53'', 1, \beta_2 = 8^\circ 6' 48'', 4.$$

$$13. b+a = \frac{1}{2}u,$$

$$b-a = u (\sqrt{\sin^2 \alpha + \operatorname{tang}^2 \varphi} - \operatorname{tang} \varphi) : 2 \sin \alpha;$$

$$a = 532, b = 629, e = 435, f = 1080, 79,$$

$$F = 228228, \alpha_2 = 80^\circ 28' 21'', 8, \alpha_1 = 56^\circ 31' 27'', 9,$$

$$\beta_1 = 23^\circ 23' 12'', 4, \beta_2 = 19^\circ 36' 57'', 9.$$

$$b) 1. \cos \alpha = \frac{a-c}{2b}, \operatorname{tang} \alpha_2 = \frac{2b \sin \alpha}{a+c},$$

$$e^2 = b^2 \sin^2 \alpha + \frac{1}{4}(a+c)^2, F = \frac{1}{4}(a+c) b \sin \alpha.$$

$$2. b = \frac{a-c}{2 \cos \alpha}, 4e^2 = (a-c)^2 \operatorname{tang}^2 \alpha + (a+c)^2,$$

$$\operatorname{tang} \alpha_2 = \frac{a-c}{a+c} \operatorname{tang} \alpha, F = \frac{1}{4}(a^2 - c^2) \operatorname{tang} \alpha.$$

$$3. b = \frac{d}{2 \cos \alpha}, \sin \alpha_2 = \frac{d}{2e} \operatorname{tang} \alpha, a+c = 2e \cos \alpha_2,$$

$$F = \frac{1}{2} e d \operatorname{tang} \alpha \cos \alpha_2.$$

$$4. \operatorname{tang} \alpha = \frac{2h}{d}, b^2 = h^2 + \frac{1}{4}d^2, \sin \alpha_2 = \frac{h}{e},$$

$$a+c = 2e \cos \alpha_2, F = h e \cos \alpha_2.$$

$$5. \cos \alpha_2 = \frac{a+c}{2e}, h = e \sin \alpha_2, \operatorname{tang} \alpha = \frac{2h}{a-c},$$

$$b = \frac{h}{\sin \alpha}, F = \frac{1}{2}(a+c) h.$$

$$6. e = \frac{a+c}{2 \cos \alpha_2}, \operatorname{tang} \alpha = \frac{2e \sin \alpha_2}{a-c}, b = \frac{a-c}{2 \cos \alpha},$$

$$F = \frac{1}{2}(a+c) e \sin \alpha_2.$$

$$7. \cos \alpha_2 = \frac{s}{2e}, a-c = 2e \cotg \alpha \sin \alpha_2, b = \frac{e \sin \alpha_2}{\sin \alpha},$$

$$F = \frac{1}{2} s e \sin \alpha_2.$$

8. $\tan \alpha_2 = \frac{h^2}{F}$, $e^2 = h^2 + \frac{F^2}{h^2}$, $\sin \alpha = \frac{h}{b}$, $a + c = \frac{2F}{h}$,
 $a - c = 2b \cos \alpha$.
9. $\sin \gamma_1 = \frac{a \sin \alpha_1}{c}$, $\alpha_2 = 90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha_1 + \gamma_1)$, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$,
 $e = \frac{a+c}{2 \cos \alpha_2}$, $b = \frac{a-c}{2 \cos \alpha}$, $F = \frac{1}{4}(a+c)^2 \tan \alpha_2$.
10. $a^2 = c^2 + 4ch \cot \alpha_1 - 4h^2$, $\tan \alpha = 2h : (a - c)$.
 Vergl. b) 2.

Zahlenbeispiele zu b) 1—10.

a	b	c	e	F	α	α_1	α_2	γ_1	h
1052	269	532	795	54648	14° 51' 46", 2	9° 53' 1", 5	4° 58' 44", 7	160° 9' 29", 1	69
244	197	188	291	42120	81.49.43,6	39.45.13,5	42. 4.30,1	56. 5.46,3	195
668	221	388	555	90288	50. 41.32,5	32.44.49,6	17.56.42,9	111. 21.44,6	171
1244	317	628	939	70200	13.41. 8,0	9. 6.15,6	4.34.52,4	161.43.59,6	75
484	123	244	365	9828	12.40.49,4	8.26.17,5	4.14.31,9	163. 4.38,7	27

c) 1. $\cos \alpha = \frac{d^2 + (a-c)^2 - b^2}{2d(a-c)}$, $\cos \beta = \frac{b^2 + (a-c)^2 - d^2}{2b(a-c)}$,
 $e^2 = \frac{(a^2 - b^2)c - (c^2 - d^2)a}{a-c}$, $f^2 = \frac{(a^2 - d^2)c - (c^2 - b^2)a}{a-c}$, etc.

2. $\sin(\gamma - \alpha) = \frac{a-c}{b} \sin \alpha$, $\beta = 180^\circ - \gamma$, $d = \frac{b \sin \beta}{\sin \alpha}$,
 $F = \frac{1}{2}(a+c)b \sin \beta$.

3. $\sin \beta = \frac{h}{b}$, $\sin \alpha_2 = \frac{h}{e}$, $a = \sqrt{e^2 - h^2} + \sqrt{b^2 - h^2}$,
 $d^2 = b^2 + (a-c)^2 - 2(a-c)\sqrt{b^2 - h^2}$, $\sin \alpha = h : d$.

4. $\sin \beta_1 = \frac{e \sin \varphi}{a+c}$, $\alpha_2 = \varphi - \beta_1$, $f = \frac{a+c}{\sin \varphi} \sin \alpha_2$,
 $d^2 = e^2 + c^2 - 2ec \cos \alpha_2$, $b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2$.

5. $\cos \beta_1 = \frac{f^2 + s^2 - e^2}{2fs}$, $\cos \alpha_2 = \frac{e^2 + s^2 - f^2}{2es}$,
 $\sin \beta = \frac{e}{b} \sin \alpha_2$, $a = \frac{b \sin(\beta + \alpha_2)}{\sin \alpha_2}$.

6. $a = \frac{2F}{h} - c$, $f = \frac{h}{\sin \beta_1}$, $\tan \alpha_2 = \frac{h^2}{2F - h^2 \cot \beta_1}$,
 $e = \frac{h}{\sin \alpha_2}$, $b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2$,
 $d^2 = a^2 + f^2 - 2af \cos \beta_1$.

$$7. b = \frac{a-c \sin \alpha}{\sin \alpha + \beta}, d = \frac{a-c \sin \beta}{\sin \alpha - \beta},$$

$$f^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos \alpha.$$

$$8. \alpha_2 = \varphi - \beta_1, c = \frac{(a+c \sin \beta)}{\sin \varphi}, f = \frac{a+c \sin \alpha_2}{\sin \varphi},$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \alpha_2, d^2 = a^2 + f^2 - 2af \cos \beta_1.$$

$$9. \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \cos \alpha_2 = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac},$$

$$\tan \frac{1}{2} \delta = \frac{c \sin \alpha_2}{s - c \cos \alpha_2}, d = \frac{c \sin \alpha_2}{\sin \delta}, c = \frac{c \sin (\delta + \alpha_2)}{\sin \delta}.$$

$$10. \sin \frac{1}{2} (\alpha + \beta) = \frac{a-c}{b-d} \sin \frac{1}{2} (\alpha - \beta),$$

$$b + d = (a - c) \cdot \frac{\cos \frac{1}{2} \alpha - \beta}{\cos \frac{1}{2} (\alpha + \beta)}, \sin \beta_1 = \frac{d}{c} \sin \alpha,$$

$$a = \frac{c}{\sin \alpha} \sin (\alpha + \beta_1).$$

$$11. k = s : 4 \cos \frac{1}{2} \alpha \cdot \cos \frac{1}{2} \beta \cdot \sin \frac{1}{2} (\alpha + \beta), b = k \sin \alpha,$$

$$d = k \sin \beta, a - c = k \sin (\alpha + \beta),$$

$$\sin \beta_1 = d \cdot \sin \alpha : c, a = c \cdot \sin (\alpha + \beta_1) : \sin \alpha.$$

$$12. \varphi - \beta_1 = \alpha_2, c = \frac{s \cos \frac{1}{2} \varphi}{\cos \frac{1}{2} (\alpha_2 - \beta_1)} - a, e = \frac{a \sin \beta_1}{\sin \varphi},$$

$$f = \frac{a \sin \alpha_2}{\sin \varphi}, b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \alpha_2.$$

$$13. \beta = 180^\circ - \gamma, b = \frac{h}{\sin \gamma}, d = \frac{h}{\sin \alpha},$$

$$a - c = \frac{h \sin (\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}, a + c = u - b - d.$$

Zahlenbeispiele zu c) 1-13.

a	b	c	d	e	f	F	α	β
428	289	260	257	307,936	471	87720	82° 50' 50",4	61° 55' 39'',1
268	255	0	281	281	255	30954	55. 17. 31,0	64. 56. 32,6
1004	223,395	696	305	943	807	175950	42. 44. 28,5	67. 54. 46,7
436	158	12	377	388,23	159	30240	20. 58. 58,6	61. 55. 39,1
1676	145	1144	425	1562,4	1263	122670	12. 48. 44,2	36. 52. 11,6

α_2	β_1
41° 7' 50'',5	32° 46' 44'',7
55. 17. 31,0	64. 56. 32,6
12. 40. 49,4	14. 51. 46,2
20. 20. 55,4	58. 6. 33,2
3. 11. 31,6	3. 56. 59,6

- d) 1. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \delta_1 = b : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$,
 $\delta = \delta_1 + \gamma_1$, $\alpha = \alpha_1 + \delta_1$, $\beta = 180^\circ - \delta$,
 $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $d = 2r \sin \beta_1$,
 $e = 2r \sin \beta$, $f = 2r \sin \alpha$, $F = \frac{1}{2}(ab + cd) \sin \beta$.
2. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \delta_1 = b : 2r$, $\alpha_1 = \alpha - \delta_1$,
 $c = 2r \sin \alpha_1$, $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \gamma - \gamma_1$,
 $d = 2r \sin \beta_1$, $\beta = \alpha_1 + \beta_1$, etc.
3. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$, $\delta_1 = \alpha - \alpha_1$,
 $b = 2r \sin \delta_1$, $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \gamma - \gamma_1$,
 $d = 2r \sin \beta_1$.
4. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$, $2\beta_1 = \sigma - \alpha_1 - \gamma_1$,
 $\beta = \alpha_1 + \beta_1$, $\gamma = \beta_1 + \gamma_1$, $\alpha = 180^\circ - \gamma$,
 $\delta = 180^\circ - \beta$, $d = 2r \sin \beta_1$, $b = 2r \sin \delta_1$.
5. $\sin \alpha = f : 2r = \sin \gamma$, $\sin \beta = e : 2r = \sin \delta$,
 $2\gamma_1 = \gamma + \delta - \varphi$.
6. $\delta = 180^\circ - \beta$, $\gamma_1 + \delta_1 = \delta$,
 $\tan \frac{1}{2}(\gamma_1 - \delta_1) = (a - b) \cotg \frac{1}{2}\beta : (a + b)$.
7. $\cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - e^2}{2ab}$, $\cos \gamma_1 = \frac{b^2 + e^2 - a^2}{2be}$,
 $\cos \delta_1 = \frac{a^2 + e^2 - b^2}{2ae}$, $\sin \alpha = \frac{f \sin \gamma_1}{a}$, $\alpha_1 = \alpha - \delta_1$,
 $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $d = a \sin \beta_1 : \sin \gamma_1$.
8. $\delta = 180^\circ - \beta$, $\sin \gamma_1 = a \sin \beta : e$, $\sin \alpha_1 = c \sin \beta : e$,
 $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $\gamma = \beta_1 + \gamma_1$.
9. $f_2 = \frac{e_1 \cdot e_2}{f_1}$, $\cos \beta_1 = \frac{a^2 + f_1^2 - e_1^2}{af_1}$,
 $\cos \delta_1 = \frac{a^2 + e_1^2 - f_1^2}{ae_1}$, $c = \frac{e_2 \sin(\beta_1 + \delta_1)}{\sin \delta_1}$,
 $b^2 = f_1^2 + e_2^2 - 2f_1 e_2 \cos(\beta_1 + \delta_1)$,
 $d^2 = e_1^2 + f_2^2 - 2e_1 f_2 \cos(\beta_1 + \delta_1)$.
10. $CE = q = -\frac{1}{2}c + \sqrt{p(a+p) + \frac{1}{4}c^2}$,
 $\cos \beta = \frac{q^2 - b^2 - p^2}{2bp}$, $\cos \gamma = \frac{p^2 - b^2 - q^2}{2bq}$,
 $\alpha = 180^\circ - \gamma$, $\delta = 180^\circ - \beta$,
 $d = (a + p) \sin(\alpha + \delta) : \sin \delta$.
11. $d = \frac{p^2 - ac}{b}$, $\cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}$,
 $\cos \alpha = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}$.

$$12. f_2 = \frac{e_1 \cdot e_2}{f_1}, \sin \alpha = \frac{f}{e} \sin \vartheta, \tan \eta = \frac{e_2 + e_1}{e_2 - e_1} \cotg \vartheta,$$

$$\tan \vartheta = \frac{f_2 + f_1}{f_2 - f_1} \cotg \alpha, \varphi = \eta + \vartheta,$$

$$a^2 = e_1^2 + f_1^2 + 2e_1 f_1 \cos \varphi, b^2 = e_2^2 + f_1^2 - 2e_2 f_1 \cos \varphi.$$

Zahlenbeispiele zu d) 1—12.

(Sind dieselben in Folge der Bestimmung durch Sinus zwei- oder mehrdeutig, so ist in dem Folgenden nur eins der Vierecke angegeben.)

a	b	c	d	e	f	F	α
56	33	16	63	65	45,769	1428	44° 45' 36'',9
84	13	36	77	85	47,353	1932	83. 51. 18,1
14	13	13	4	15	15,6	108	106. 15. 36,8
180	299	180	299	349	349	58820	90.
3,72350	6,86267	9,69660	2,60735	9	6	23,383	142. 10. 22,2

β	α_1	β_1	γ_1
90°	14° 15' 0'',1	75° 44' 59'',9	59° 29' 23'',2
90°	25. 3. 27,4	64. 56. 32,6	81. 12. 9,3
67° 22' 48'',5	53. 7. 48,4	14. 15. 0,1	59. 29. 23,1
90.	81. 2. 53,6	58. 57. 6,4	81. 2. 53,6
113. 5. 10,0	97. 37. 46,1	15. 27. 23,9	22. 22. 13,9

δ_1	r
30° 30' 36'',8	32,5
8. 47. 50,7	42,5
53. 7. 48,4	8,125
58. 57. 6,4	$e_1 = e_2 = f_1 = f_2 = 174,5$
44. 32. 36,1	$e_1 = 1, e_2 = 8, f_1 = 4,$
	$f_2 = 2, \varphi = 60^\circ.$

e) 1. $\sin \gamma_1 = \frac{a}{e} \sin \beta, \alpha_2 = 180^\circ - \beta - \gamma_1,$

$$b = \frac{e}{\sin \beta} \sin \alpha_2, \cotg \frac{1}{2} \gamma = \frac{b}{e} - \cotg \frac{1}{2} \beta,$$

$$\cotg \frac{1}{2} \alpha = \frac{a}{e} - \cotg \frac{1}{2} \beta, \text{ etc. } b = c = d = 65,$$

$$f = 66, \alpha = 61^\circ 1' 13'', 6, \gamma_1 = \gamma_2 = \alpha_1 = \alpha_2 = 30^\circ 30' 36'', 8,$$

$$F = 3696.$$

2. $\cotg \frac{1}{2} \alpha = \frac{a}{e} - \cotg \frac{1}{2} \beta, \cotg \frac{1}{2} \gamma = \frac{b}{e} - \cotg \frac{1}{2} \beta,$

$$c = \frac{q \sin \frac{1}{2}(\gamma + \delta)}{\sin \frac{1}{4}\gamma \sin \frac{1}{4}\delta}, \quad d = \frac{q \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}{\sin \frac{1}{4}\alpha \sin \frac{1}{4}\beta}, \quad c = 28,$$

$$d = 75,6, \quad F = 2822,4, \quad \alpha = 45^\circ 14' 23'', 0,$$

$$\gamma = 134^\circ 45' 37'', 0, \quad \delta = 106^\circ 15' 36'', 8.$$

$$3. \quad \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \quad d = a + c - b,$$

$$\cos \gamma = \frac{c^2 + d^2 - e^2}{2cd}, \quad d = 10, \quad \alpha = \gamma = 90^\circ, \quad \beta = 120^\circ,$$

$$\delta = 60^\circ, \quad F = 57,735.$$

$$4. \quad \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \quad q = \frac{a \sin \frac{1}{4}\alpha \sin \frac{1}{4}\beta}{\sin \frac{1}{4}(\alpha + \beta)},$$

$$\cotg \frac{1}{2}\gamma = \frac{b}{q} - \cotg \frac{1}{2}\beta, \quad c = \frac{q \sin \frac{1}{2}(\gamma + \delta)}{\sin \frac{1}{4}\gamma \sin \frac{1}{4}\delta},$$

$$a = 75, \quad b = 58, \quad c = 24, \quad d = 41, \quad q = 20, \quad F = 1980,$$

$$\alpha = 77^\circ 19' 10'', 6, \quad \beta = 43^\circ 36' 10'', 1, \quad \gamma = 136^\circ 23' 49'', 9,$$

$$\delta = 102^\circ 40' 49'', 4.$$

$$5. \quad q = \frac{a \sin \frac{1}{4}\alpha \sin \frac{1}{4}\beta}{\sin \frac{1}{4}(\alpha + \beta)}, \quad \cotg \frac{1}{2}\gamma = \frac{b}{q} - \cotg \frac{1}{2}\beta,$$

$$c = \frac{q \sin \frac{1}{2}(\gamma + \delta)}{\sin \frac{1}{4}\gamma \sin \frac{1}{4}\delta}; \quad c = 102, \quad d = 229,732, \quad q = 60,$$

$$F = 18223,92, \quad \gamma = 159^\circ 13' 20'', 0, \quad \delta = 66^\circ 47' 49'', 2.$$

$$6. \quad \sin \alpha = 2q : d, \quad \sin \beta = 2q : b, \quad \gamma = 180^\circ - \beta,$$

$$\delta = 180^\circ - \alpha, \quad a + c = b + d,$$

$$a - c = d \sin(\alpha + \beta) : \sin \beta, \quad F = (b + d)q;$$

$$a = 1083, \quad c = 135, \quad F = 173565, \quad \alpha = 17^\circ 56' 42'', 9;$$

$$\beta = 76^\circ 34' 49'', 2, \quad \gamma = 103^\circ 25' 10'', 8, \quad \delta = 162^\circ 3' 17'', 1.$$

$$7. \quad d = s - b, \quad \sin \alpha = 2q : d, \quad \sin \beta = 2q : b,$$

$$a - c = d \sin(\alpha + \beta) : \sin \beta; \quad a = 241, \quad c = 54,$$

$$d = 195, \quad F = 14652, \quad \alpha = 30^\circ 30' 36'', 8,$$

$$\beta = 78^\circ 34' 43'', 7, \quad \gamma = 101^\circ 25' 16'', 3, \quad \delta = 149^\circ 29' 23'', 2.$$

$$8. \quad \sin \beta = \frac{2q}{b}, \quad \gamma = 180^\circ - \beta, \quad \cotg \frac{1}{2}\delta = \frac{c}{q} - \cotg \frac{1}{2}\gamma,$$

$$\alpha = 180^\circ - \delta, \quad d = \frac{2q}{\sin \alpha}, \quad a = \frac{q \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}{\sin \frac{1}{4}\alpha \sin \frac{1}{4}\beta}.$$

Zahlenbeispiel, vergl. 5.

$$f) 1. \quad \gamma = 180^\circ - \alpha, \quad \delta = 180^\circ - \beta, \quad q = \frac{a \sin \frac{1}{4}\alpha \sin \frac{1}{4}\beta}{\sin \frac{1}{4}(\alpha + \beta)},$$

$$b = \frac{q \sin \frac{1}{2}(\beta + \gamma)}{\sin \frac{1}{4}\beta \sin \frac{1}{4}\gamma}, \quad \text{etc.}$$

$$2. \quad \gamma = 180^\circ - \alpha, \quad \cotg \frac{1}{2}\beta = \frac{a}{q} - \cotg \frac{1}{2}\alpha, \quad \delta = 180^\circ - \beta,$$

b wie vorher.

3. $\alpha = 180^\circ - \gamma$. Vergl. 2.

4. $c = \frac{F}{q} - a$. Setzt man $\frac{2q}{\sqrt{ac}} = \sin \varphi$, so ist

$$\cotg \frac{1}{2}\alpha = \text{tang } \frac{1}{2}\gamma = \frac{a}{q} \cos \frac{1}{2}\varphi^2,$$

$$\cotg \frac{1}{2}\beta = \text{tang } \frac{1}{2}\delta = \frac{a}{q} \sin \frac{1}{2}\varphi^2.$$

Zahlenbeispiele zu f) 1—4.

q	b	c	d	a	F	α	β
23	240	49,0205	21,4427	212,4222	7320,4	116° 13' 6'',4	16° 20' 32'',8
120	378	140	210	448	70660	73. 44. 23,2	45. 14. 23,0.

g) 1. $\sin \frac{1}{2}\beta = \frac{e}{2a}$, $\cotg \frac{1}{2}\alpha = \frac{a}{q} - \cotg \frac{1}{2}\beta$,

$$c = \frac{e}{2 \sin(\alpha + \frac{1}{2}\beta)}, \text{ etc. } a = 29, c = 75, e = 42, \\ f = 92, F = 1932, \alpha = 117^\circ 20' 33'',4, \beta = 92^\circ 47' 39'',8, \\ \delta = 32^\circ 31' 13'',4.$$

2. $a = \frac{s}{1 + 2 \sin \frac{1}{2}\beta}$, $\text{tang } \frac{1}{2}\delta = \frac{e}{2(f - a \cos \frac{1}{2}\beta)}$,
 $c^2 = \frac{1}{4}e^2 + (f - a \cos \frac{1}{2}\beta)^2$; $a = 689, c = 2055,$
 $e = 222, f = 2732, F = 303252, \alpha = 167^\circ 37' 57'',9,$
 $\delta = 6^\circ 11' 33'',4.$

3. $\sin \frac{1}{2}\beta = \frac{e'}{a}$, $\text{tang } \frac{1}{2}\delta = \frac{e'}{2f' - a \cos \frac{1}{2}\beta}$,
 $c^2 = e'^2 + (2f' - a \cos \frac{1}{2}\beta)^2$; $c = 569, e = 462,$
 $f = 628, F = 145068, \alpha = 91^\circ 6' 19'',3, \beta = 129^\circ 53' 5'',2,$
 $\delta = 47^\circ 54' 16'',2.$

4. $\text{tang } \frac{1}{2}\beta = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4p_a^2}}{2p_a}$, $e = 2a \sin \frac{1}{2}\beta$,
 $\cos \frac{1}{2}\delta = \frac{2p_c}{e}$; $c_1 = 70,41667, e = 130, f = 137,3864,$
 $F = 8930,1, \alpha = 82^\circ 6' 34'',7, \beta = 61^\circ 1' 13'',6,$
 $\delta = 134^\circ 45' 37'',0.$

5. $c = \frac{d'}{2 \sin \frac{1}{2}\delta - 1}$, $e = \frac{2d'' \sin \frac{1}{2}\delta}{2 \sin \frac{1}{2}\delta - 1}$, $a = e - d'$,
 $\sin \frac{1}{2}\beta = \frac{e}{2a}$; $a = 375, c = 449, e = 702, f = 412,$

$$F = 144612, \alpha = 59^\circ 11' 23'', 2, \beta = 138^\circ 46' 50'', 2, \\ \delta = 102^\circ 50' 23'', 4.$$

$$6. a = \frac{s(2\sin\frac{1}{2}\beta + \cos\frac{1}{2}\beta) + \sqrt{c^2(2\sin\frac{1}{2}\beta + \cos\frac{1}{2}\beta)^2 + (c^2 - s^2)\sin\frac{1}{2}\beta^2}}{(2\sin\frac{1}{2}\beta + \cos\frac{1}{2}\beta)^2 + \sin\frac{1}{2}\beta^2}, \\ e = 2a \sin\frac{1}{2}\beta, \sin\frac{1}{2}\delta = a \sin\frac{1}{2}\beta : c, \text{ Beispiel, siehe g) 1.}$$

$$7. e = 2a \sin\frac{1}{2}\beta, f = \frac{n}{m} e, \tan\frac{1}{2}\delta = \frac{a \sin\frac{1}{2}\beta}{f - a \cos\frac{1}{2}\beta}, \\ c = \frac{e}{2 \sin\frac{1}{2}\delta}. \text{ Siehe g) 2.}$$

$$8. e = \sqrt{\frac{2m}{n}} F, f = \sqrt{\frac{2n}{m}} F, \sin\frac{1}{2}\beta = \frac{e}{2a}, \\ \tan\frac{1}{2}\delta = \frac{e}{2(f - a \cos\frac{1}{2}\beta)}. \text{ Siehe g) 5.}$$

§. 30.

A) 1. $e = 16,15, \delta = 65^\circ 34' 51'', \varepsilon = 130^\circ 43' 9''.$

2. $96^\circ 30' 28''; 1,0478; 6,8273.$

3. $AB=15, BC=13, CD=37, DE=17, EF=36,0942, \\ FG=15, GA=40, \sphericalangle A=126^\circ 52' 11'', 6, \\ B=120^\circ 30' 36'', 9, C=167^\circ 26' 6'', 0, D=80^\circ 51' 7'', 8, \\ E=167^\circ 4' 17'', 6, F=110^\circ 23' 28'', 4, G=126^\circ 52' 11'', 6, \\ F=1933,93.$

4. $AC=884, BC=116, BD=404, CD=480, CE=106, \\ DE=394, CF=123, EF=65, EG=93, FG=34.$

5. $DC=442, \sphericalangle EDC=30^\circ 22' 42'', 8, \sphericalangle EAB=239^\circ 37' 17'', 2, \\ F=65580.$

6. $a = -2r \sin(\gamma + \varepsilon), b = -2r \sin(\alpha + \delta), \\ c = -2r \sin(\beta + \varepsilon), d = -2r \sin(\alpha + \gamma), \\ e = -2r \sin(\beta + \delta), \\ F = 2r^2 \cdot [\sin \gamma \cdot \sin(\alpha + \delta) \cdot \sin(\beta + \varepsilon) \\ + \sin \varepsilon \cdot \sin(\alpha + \gamma) \cdot \sin(\beta + \delta) \\ - \sin \gamma \cdot \sin \varepsilon \cdot \sin(\gamma + \varepsilon)].$

7. $C = 61^\circ 55' 40'', 5 (39,1), A = 28^\circ 4' 19'', 5 (20,9), \\ AE=93, ED=123, DC=102, EB=65, BD=106, \\ F=8868.$

Aufg. 5.

5. $\cos 2x = 45^\circ$; $x_1 = 70^\circ 23' 55''$, 9.
 9. $\sin 2x = \sqrt{6} - 2$; $x_1 = 13^\circ 21' 20''$.
 10. $9 \cos x^4 - 13 \cos x^2 = 8$; $35^\circ 53' 21''$, 1.
 11. $35^\circ 18' 31''$; $159^\circ 38' 14''$. 12. $\sin x = 0$ oder $\cos x = \frac{1}{2}$.
 13. $\sin(x - y) = 0,1$, $\sin(x + y) = 0,3$; $x_1 = 11^\circ 35' 54''$,
 $y_1 = 5^\circ 51' 33''$. 14. 45° ; $37^\circ 42''$.
 15. $\tan \frac{1}{2}(x + y) = \pm 1$; $x_1 = 53^\circ 7' 48''$, 2, $y_1 = 36^\circ 52' 11''$, 8,
 $x_{11} = 143^\circ 7' 48''$, 2, $y_{11} = 126^\circ 52' 11''$, 8, etc.
 16. 45° ; 180° ; 225° ; 270° .
 17. $\cotg \frac{1}{2}\beta = \frac{a-b}{c} = \tan \frac{1}{2}\alpha$; $\alpha = 44^\circ 24' 31''$,
 $\beta = 45^\circ 35' 29''$, $b = 404,74$, $c = 566,55$, $F = 80240$.
 18. $c = \sqrt{\frac{1}{2}S}$, $a + b = s - c$, $a - b = \sqrt{c^2 + 2cs - s^2}$;
 $c = 55$, $a = 44$, $b = 33$, $F = \frac{1}{2}s(s - \sqrt{2S}) = 726$,
 $\alpha = 53^\circ 7' 48''$, 4, $\beta = 36^\circ 52' 11''$, 6.
 19. $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}s$, $b = \frac{3-\sqrt{5}}{2}s$, $c = \sqrt{5 - 2\sqrt{5}} \cdot s$,
 $F = \frac{\sqrt{5}-2}{2}s^2$, $\alpha = 58^\circ 16' 57''$.
 20. $c = \frac{1}{4}a$, $b = \frac{3}{4}a$, $F = \frac{3}{8}a^2$, $\alpha = 53^\circ 7' 48''$, 4,
 $\beta = 36^\circ 52' 11''$, 6.
 21. $76^\circ 20' 44''$; $51^\circ 49' 38''$. 22. $a(1 + \sin \frac{1}{2}\beta) : \pi = 10$.
 23. $a = s\sqrt{2} : 4 \cos(45^\circ - \frac{1}{2}\alpha)$, $F = a^2 \sin \alpha$, $a = 9,594$,
 $F = 82,194$.
 24. $a^2 = \frac{1}{2}[4m_a^2 - 3h^2 \pm \sqrt{9h^4 - 40h^2m_a^2 + 16m_a^4}]$,
 $b^2 = m^2 - \frac{1}{4}a^2$,
 $\sin \alpha^2 = [3h^2 + 4m^2 \pm \sqrt{9h^4 - 40h^2m^2 + 16m^4}] : 8m^2$.
 25. $m \cdot \frac{1 + \cos \alpha + \cos \alpha \cos \beta}{1 - \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$.
 27. $(a - b)^2 = c^2 - (s^2 - c^2) \tan \frac{1}{2}\beta^2$, $a = 316$, $b = 305$,
 $F = 86268$.
 28. $\sin \frac{1}{2}\alpha = \frac{2}{3}\pi$; $F\left(\frac{\alpha^\circ}{360} - \frac{\sin \alpha}{2\pi}\right) = 603,42$.

29. $a = p + q$, $\tan \varphi = \frac{a}{q \cot g w - p \cot g v}$, $b = \frac{q \sin \varphi}{\sin w}$,
 $c = \frac{p \sin \varphi}{\sin v}$, $\beta = 180^\circ - (\varphi + v)$, $\gamma = \varphi - w$, $\alpha = 86^\circ$,
 $\varphi = 70^\circ 50' 3''$, $\beta = 172^\circ 6' 16''$, $\gamma = 7^\circ 45' 3''$,
 $b = 4685,9$, $c = 4600,7$, $F = 27174,6$.
30. $\cos \gamma^2 \cdot (256 + 36\pi^2) a^2 b^2 - \cos \gamma \cdot 36\pi^2 \cdot ab \cdot (a^2 + b^2)$
 $= 256 a^2 b^2 - 9\pi^2 (a^2 + b^2)^2$; $\gamma = 79^\circ 30' 42''$, 3 od. $108^\circ 29''$, 1.
31. $h = \frac{2}{3} a \sqrt{3} = 3,46410$, $b = a \sqrt{3} = 5,19615$,
 $c = \frac{5}{6} a \sqrt{3} = 4,33013$, $\alpha = 53^\circ 7' 48''$, 4.
32. $F = \frac{5d^2}{8 \sin 108^\circ} = 42,058$; $u = \frac{5d}{2 \sin 54^\circ} = 24,721$.
33. $\alpha) 124^\circ 58' 33''$, 6; 2,9; 10,1; 126. $\beta) 41^\circ 6' 43''$, 5;
73; 55; 2814.
34. 184; $16^\circ 15' 36''$, 7; $148^\circ 35' 20''$, 2; 5460.
35. $1 - \sin 2\alpha : 1$.
36. $\sin 2\alpha = (n - m) : m = 1$, $\alpha = 45^\circ$. Die Eckpunkte
des kleinsten halbiren die Seiten des gegebenen Quadrats.
37. $x^2 = 2a^2 + 2ab + b^2$, $y^2 = a^2 + 2ab + 2b^2$,
 $\sin(x, a) = a : x$, $\sin(y, b) = b : y$,
 $\sin(x, c) = a^2 : x \sqrt{a^2 + b^2}$,
 $\sin(y, c) = b^2 : y \sqrt{a^2 + b^2}$.
38. $73^\circ 44' 23''$, 3; $106^\circ 15' 36''$, 7; 65; 62,401; 1428.
39. $c^2 + e^2 = d^2 + f^2$, $d^2 - e^2 = cd \cos \alpha - fe \cos \gamma$,
 $d^2 - c^2 = de \cos \beta - cf \cos (\alpha + \beta + \gamma)$.
40. $a^2 = \frac{1}{2} [b^2 + e^2 \pm \sqrt{4b^2 e^2 - (c^2 - d^2)^2}]$,
 $c^2 + d^2 = b^2 + e^2$, $\sin(b, a) = (a^2 + b^2 - d^2) : 2ab$, etc.
41. $F = \frac{hk}{\sin \gamma}$, $\tan \varphi = \frac{h \sin \gamma}{k + h \cos \gamma}$, $\tan \psi = \frac{k \sin \gamma}{h + k \cos \gamma}$.
42. $\sin(2\varphi - \alpha) = 3 \sin \alpha$, $x = a \tan \varphi = 58,56$.
43. $29^m, 625$.
44. $\tan \alpha = \frac{h_1 + h_2}{\sqrt{d^2 - (h_2 - h_1)^2}}$, $\alpha = 54^\circ 12' 46''$, 7;
 $S_1 X = \frac{h_1}{\sin \alpha} = 716,62$, $S_2 X = \frac{h_2}{\sin \alpha} = 3092,9$.
45. $\alpha_1 = 180^\circ - 2\alpha$, $\beta_1 = 180^\circ - 2\beta$, $\gamma_1 = 180^\circ - 2\gamma$,
 $a_1 = 2a \cos \alpha$, $b_1 = 2b \cos \beta$, $c_1 = 2c \cos \gamma$,
 $F_1 = 8F \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$.

$$7. \quad b = \frac{(a-c) \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}, \quad d = \frac{(a-c) \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}, \\ f^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos \alpha.$$

$$8. \quad \alpha_2 = \varphi - \beta_1, \quad e = \frac{(a+c) \sin \beta_1}{\sin \varphi}, \quad f = \frac{(a+c) \sin \alpha_2}{\sin \varphi}, \\ b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2, \quad d^2 = a^2 + f^2 - 2af \cos \beta_1.$$

$$9. \quad \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - e^2}{2ab}, \quad \cos \alpha_2 = \frac{a^2 + e^2 - b^2}{2ae}, \\ \tan \frac{1}{2} \delta = \frac{e \sin \alpha_2}{s - e \cos \alpha_2}, \quad d = \frac{e \sin \alpha_2}{\sin \delta}, \quad c = \frac{e \sin(\delta + \alpha_2)}{\sin \delta}.$$

$$10. \quad \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) = \frac{a-c}{b-d} \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta), \\ b + d = (a-c) \cdot \frac{\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}, \quad \sin \beta_1 = \frac{d}{e} \sin \alpha, \\ a = \frac{e}{\sin \alpha} \sin(\alpha + \beta_1).$$

$$11. \quad k = s : 4 \cos \frac{1}{2} \alpha \cdot \cos \frac{1}{2} \beta \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta), \quad b = k \sin \alpha, \\ d = k \sin \beta, \quad a - c = k \sin(\alpha + \beta), \\ \sin \beta_1 = d \cdot \sin \alpha : e, \quad a = e \cdot \sin(\alpha + \beta_1) : \sin \alpha.$$

$$12. \quad \varphi - \beta_1 = \alpha_2, \quad c = \frac{s \cos \frac{1}{2} \varphi}{\cos \frac{1}{2}(\alpha_2 - \beta_1)} - a, \quad e = \frac{a \sin \beta_1}{\sin \varphi}, \\ f = \frac{a \sin \alpha_2}{\sin \varphi}, \quad b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2.$$

$$13. \quad \beta = 180^\circ - \gamma, \quad b = \frac{h}{\sin \gamma}, \quad d = \frac{h}{\sin \alpha}, \\ a - c = \frac{h \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}, \quad a + c = u - b - d.$$

Zahlenbeispiele zu c) 1—13.

a	b	c	d	e	f	F	α	β
428	289	260	257	307,936	471	87720	82° 50' 50'',4	61° 55' 39'',1
238	255	0	281	281	255	30954	55. 17. 31,0	64. 56. 32,6
1004	223,395	696	305	943	807	175950	42. 44. 28,5	67. 54. 46,7
436	153	12	377	388,23	159	30240	20. 58. 58,6	61. 55. 39,1
1676	145	1144	425	1562,4	1263	122670	12. 48. 44,2	36. 52. 11,6

α_2	β_1
41° 7' 50'',5	32° 46' 44'',7
55. 17. 31,0	64. 56. 32,6
12. 40. 49,4	14. 51. 46,2
20. 20. 55,4	58. 6. 33,2
3. 11. 31,6	3. 56. 59,6

- d) 1. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \delta_1 = b : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$,
 $\delta = \delta_1 + \gamma_1$, $\alpha = \alpha_1 + \delta_1$, $\beta = 180^\circ - \delta$,
 $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $d = 2r \sin \beta_1$,
 $e = 2r \sin \beta$, $f = 2r \sin \alpha$, $F = \frac{1}{2}(ab + cd) \sin \beta$.
2. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \delta_1 = b : 2r$, $\alpha_1 = \alpha - \delta_1$,
 $c = 2r \sin \alpha_1$, $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \gamma - \gamma_1$,
 $d = 2r \sin \beta_1$, $\beta = \alpha_1 + \beta_1$, etc.
3. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$, $\delta_1 = \alpha - \alpha_1$,
 $b = 2r \sin \delta_1$, $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \gamma - \gamma_1$,
 $d = 2r \sin \beta_1$.
4. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$, $2\beta_1 = \sigma - \alpha_1 - \gamma_1$,
 $\beta = \alpha_1 + \beta_1$, $\gamma = \beta_1 + \gamma_1$, $\alpha = 180^\circ - \gamma$,
 $\delta = 180^\circ - \beta$, $d = 2r \sin \beta_1$, $b = 2r \sin \delta_1$.
5. $\sin \alpha = f : 2r = \sin \gamma$, $\sin \beta = e : 2r = \sin \delta$,
 $2\gamma_1 = \gamma + \delta - \varphi$.
6. $\delta = 180^\circ - \beta$, $\gamma_1 + \delta_1 = \delta$,
 $\tan \frac{1}{2}(\gamma_1 - \delta_1) = (a - b) \cotg \frac{1}{2}\beta : (a + b)$.
7. $\cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - e^2}{2ab}$, $\cos \gamma_1 = \frac{b^2 + e^2 - a^2}{2be}$,
 $\cos \delta_1 = \frac{a^2 + e^2 - b^2}{2ae}$, $\sin \alpha = \frac{f \sin \gamma_1}{a}$, $\alpha_1 = \alpha - \delta_1$,
 $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $d = a \sin \beta_1 : \sin \gamma_1$.
8. $\delta = 180^\circ - \beta$, $\sin \gamma_1 = a \sin \beta : e$, $\sin \alpha_1 = c \sin \beta : e$,
 $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $\gamma = \beta_1 + \gamma_1$.
9. $f_2 = \frac{e_1 \cdot e_2}{f_1}$, $\cos \beta_1 = \frac{a^2 + f_1^2 - e_1^2}{af_1}$,
 $\cos \delta_1 = \frac{a^2 + e_1^2 - f_1^2}{ae_1}$, $c = \frac{e_2 \sin(\beta_1 + \delta_1)}{\sin \delta_1}$,
 $b^2 = f_1^2 + e_2^2 - 2f_1 e_2 \cos(\beta_1 + \delta_1)$,
 $d^2 = e_1^2 + f_2^2 - 2e_1 f_2 \cos(\beta_1 + \delta_1)$.
10. $CE = q = -\frac{1}{2}c + \sqrt{p(a+p) + \frac{1}{4}c^2}$,
 $\cos \beta = \frac{q^2 - b^2 - p^2}{2bp}$, $\cos \gamma = \frac{p^2 - b^2 - q^2}{2bq}$,
 $\alpha = 180^\circ - \gamma$, $\delta = 180^\circ - \beta$,
 $d = (a + p) \sin(\alpha + \delta) : \sin \delta$.
11. $d = \frac{p^2 - ac}{b}$, $\cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}$,
 $\cos \alpha = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}$.

$$11. a + b)^2 = \frac{c^2 \cos \frac{1}{2} x^2 - c^2 \sin \frac{1}{2} x^2}{\cos x},$$

$$(a - b)^2 = \frac{c^2 \cos \frac{1}{2} x^2 - c^2 \sin \frac{1}{2} x^2}{\cos x}.$$

$$\tan \frac{1}{2} (\beta_2 - \beta_1) = \frac{c^2 \cos \frac{1}{2} x^2 - c^2}{c^2 - c^2 \cos \frac{1}{2} x^2}; a = b = 5, F = 5544.$$

$$\alpha_2 = \alpha_1 = 25^\circ 3' 27''.4, \beta_1 = \beta_2 = 64^\circ 56' 32''.6, \varphi = 90^\circ.$$

$$12. \sin \frac{1}{2} (\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{a - b \sin \frac{1}{2} \alpha}{c}, a + b = \frac{c \cos \frac{1}{2} (\alpha_2 - \alpha_1)}{\cos \frac{1}{2} \alpha},$$

$$\alpha_2 + \alpha_1 = \alpha; a = 564, b = 773, f = 1723,07,$$

$$F = 187980, \alpha_2 = 42^\circ 4' 30'',1, \alpha_1 = 123^\circ 18' 48'',4,$$

$$\beta_1 = 6^\circ 29' 53'',1, \beta_2 = 8^\circ 6' 48'',4.$$

$$13. b + a = \frac{1}{2} u,$$

$$b - a = u (\sin \alpha^2 + \tan \varphi^2 - \tan \varphi) : 2 \sin \alpha;$$

$$a = 532, b = 629, c = 435, f = 1080,79,$$

$$F = 228228, \alpha_2 = 80^\circ 28' 21'',8, \alpha_1 = 56^\circ 31' 27'',9,$$

$$\beta_1 = 23^\circ 23' 12'',4, \beta_2 = 19^\circ 36' 57'',9.$$

$$b) 1. \cos \alpha = \frac{a - c}{2b}, \tan \alpha_2 = \frac{2b \sin \alpha}{a + c},$$

$$e^2 = b^2 \sin \alpha^2 + \frac{1}{4}(a + c)^2, F = \frac{1}{4}(a + c) b \sin \alpha.$$

$$2. b = \frac{a - c}{2 \cos \alpha}, 4e^2 = (a - c)^2 \tan \alpha^2 + (a + c)^2,$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{a - c}{a + c} \tan \alpha, F = \frac{1}{4}(a^2 - c^2) \tan \alpha.$$

$$3. b = \frac{d}{2 \cos \alpha}, \sin \alpha_2 = \frac{d}{2e} \tan \alpha, a + c = 2e \cos \alpha_2,$$

$$F = \frac{1}{2} e d \tan \alpha \cos \alpha_2.$$

$$4. \tan \alpha = \frac{2h}{a}, b^2 = h^2 + \frac{1}{4}d^2, \sin \alpha_2 = \frac{h}{e},$$

$$a + c = 2e \cos \alpha_2, F = h e \cos \alpha_2.$$

$$5. \cos \alpha_2 = \frac{a + c}{2e}, h = e \sin \alpha_2, \tan \alpha = \frac{2h}{a - c},$$

$$b = \frac{h}{\sin \alpha}, F = \frac{1}{4}(a + c) h.$$

$$6. e = \frac{a + c}{2 \cos \alpha_2}, \tan \alpha = \frac{2e \sin \alpha_2}{a - c}, b = \frac{a - c}{2 \cos \alpha},$$

$$F = \frac{1}{4}(a + c) e \sin \alpha_2.$$

$$7. \cos \alpha_2 = \frac{a}{2e}, a - c = 2e \cotg \alpha \sin \alpha_2, b = \frac{e \sin \alpha_2}{\sin \alpha},$$

$$F = \frac{1}{4} s e \sin \alpha_2.$$

8. $\tan \alpha_2 = \frac{h^2}{F}$, $e^2 = h^2 + \frac{F^2}{h^2}$, $\sin \alpha = \frac{h}{b}$, $a + c = \frac{2F}{h}$,
 $a - c = 2b \cos \alpha$.
9. $\sin \gamma_1 = \frac{a \sin \alpha_1}{c}$, $\alpha_2 = 90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha_1 + \gamma_1)$, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$,
 $e = \frac{a+c}{2 \cos \alpha_2}$, $b = \frac{a-c}{2 \cos \alpha}$, $F = \frac{1}{4}(a+c)^2 \tan \alpha_2$.
10. $a^2 = c^2 + 4ch \cot \alpha_1 - 4h^2$, $\tan \alpha = 2h : (a - c)$.
 Vergl. b) 2.

Zahlenbeispiele zu b) 1–10.

a	b	c	e	F	α	α_1	α_2	γ_1	h
1052	269	532	795	54648	14°51'46'',2	9°53'1'',5	4°58'44'',7	160° 9' 29'',1	69
244	197	188	291	42120	31.49.43,6	39.45.13,5	42. 4.30,1	56. 5.46,3	195
668	221	388	555	90288	50.41.32,5	32.44.49,6	17.56.42,9	111.21.44,6	171
1244	317	628	939	70200	13.41. 8,0	9. 6.15,6	4.34.52,4	161.43.59,6	75
484	123	244	365	9828	12.40.49,4	8.26.17,5	4.14.31,9	163. 4.38,7	27

c) 1. $\cos \alpha = \frac{d^2 + (a-c)^2 - b^2}{2d(a-c)}$, $\cos \beta = \frac{b^2 + (a-c)^2 - d^2}{2b(a-c)}$,
 $e^2 = \frac{(a^2 - b^2)c - (c^2 - d^2)a}{a-c}$, $f^2 = \frac{(a^2 - d^2)c - (c^2 - b^2)a}{a-c}$, etc.

2. $\sin(\gamma - \alpha) = \frac{a-c}{b} \sin \alpha$, $\beta = 180^\circ - \gamma$, $d = \frac{b \sin \beta}{\sin \alpha}$,
 $F = \frac{1}{2}(a+c)b \sin \beta$.

3. $\sin \beta = \frac{h}{b}$, $\sin \alpha_2 = \frac{h}{e}$, $a = \sqrt{e^2 - h^2} + \sqrt{b^2 - h^2}$,
 $d^2 = b^2 + (a-c)^2 - 2(a-c)\sqrt{b^2 - h^2}$, $\sin \alpha = h : d$.

4. $\sin \beta_1 = \frac{e \sin \varphi}{a+c}$, $\alpha_2 = \varphi - \beta_1$, $f = \frac{a+c}{\sin \varphi} \sin \alpha_2$,
 $d^2 = e^2 + c^2 - 2ec \cos \alpha_2$, $b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2$.

5. $\cos \beta_1 = \frac{f^2 + s^2 - e^2}{2fs}$, $\cos \alpha_2 = \frac{e^2 + s^2 - f^2}{2es}$,
 $\sin \beta = \frac{e}{b} \sin \alpha_2$, $a = \frac{b \sin(\beta + \alpha_2)}{\sin \alpha_2}$.

6. $a = \frac{2F}{h} - c$, $f = \frac{h}{\sin \beta_1}$, $\tan \alpha_2 = \frac{h^2}{2F - h^2 \cot \beta_1}$,
 $e = \frac{h}{\sin \alpha_2}$, $b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2$,
 $d^2 = a^2 + f^2 - 2af \cos \beta_1$.

$$7. \quad b = \frac{(a-c) \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}, \quad d = \frac{(a-c) \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}, \\ f^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos \alpha.$$

$$8. \quad \alpha_2 = \varphi - \beta_1, \quad e = \frac{(a+c) \sin \beta_1}{\sin \varphi}, \quad f = \frac{(a+c) \sin \alpha_2}{\sin \varphi}, \\ b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2, \quad d^2 = a^2 + f^2 - 2af \cos \beta_1.$$

$$9. \quad \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \quad \cos \alpha_2 = \frac{a^2 + e^2 - b^2}{2ae}, \\ \tan \frac{1}{2} \delta = \frac{e \sin \alpha_2}{s - e \cos \alpha_2}, \quad d = \frac{e \sin \alpha_2}{\sin \delta}, \quad c = \frac{e \sin(\delta + \alpha_2)}{\sin \delta}.$$

$$10. \quad \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) = \frac{a-c}{b-d} \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta), \\ b + d = (a-c) \cdot \frac{\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}, \quad \sin \beta_1 = \frac{d}{e} \sin \alpha, \\ a = \frac{e}{\sin \alpha} \sin(\alpha + \beta_1).$$

$$11. \quad k = s : 4 \cos \frac{1}{2} \alpha \cdot \cos \frac{1}{2} \beta \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta), \quad b = k \sin \alpha, \\ d = k \sin \beta, \quad a - c = k \sin(\alpha + \beta), \\ \sin \beta_1 = d \cdot \sin \alpha : e, \quad a = e \cdot \sin(\alpha + \beta_1) : \sin \alpha.$$

$$12. \quad \varphi - \beta_1 = \alpha_2, \quad c = \frac{s \cos \frac{1}{2} \varphi}{\cos \frac{1}{2}(\alpha_2 - \beta_1)} - a, \quad e = \frac{a \sin \beta_1}{\sin \varphi}, \\ f = \frac{a \sin \alpha_2}{\sin \varphi}, \quad b^2 = a^2 + e^2 - 2ae \cos \alpha_2.$$

$$13. \quad \beta = 180^\circ - \gamma, \quad b = \frac{h}{\sin \gamma}, \quad d = \frac{h}{\sin \alpha}, \\ a - c = \frac{h \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}, \quad a + c = u - b - d.$$

Zahlenbeispiele zu c) 1—13.

a	b	c	d	e	f	F	α	β
428	289	260	257	307,936	471	87720	82° 50' 50",4	61° 55' 39",1
268	255	0	281	281	255	30954	55. 17. 31,0	64. 56. 32,6
1004	223,395	696	305	943	807	175950	42. 44. 28,5	67. 54. 46,7
436	153	12	377	388,23	159	30240	20. 58. 58,6	61. 55. 39,1
1676	145	1144	425	1562,4	1263	122670	12. 48. 44,2	36. 52. 11,6

α_2	β_1
41° 7' 50",5	32° 46' 44",7
55. 17. 31,0	64. 56. 32,6
12. 40. 49,4	14. 51. 46,2
20. 20. 55,4	58. 6. 33,2
3. 11. 31,6	3. 56. 59,6

- d) 1. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \delta_1 = b : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$,
 $\delta = \delta_1 + \gamma_1$, $\alpha = \alpha_1 + \delta_1$, $\beta = 180^\circ - \delta$,
 $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $d = 2r \sin \beta_1$,
 $e = 2r \sin \beta$, $f = 2r \sin \alpha$, $F = \frac{1}{2}(ab + cd) \sin \beta$.
2. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \delta_1 = b : 2r$, $\alpha_1 = \alpha - \delta_1$,
 $c = 2r \sin \alpha_1$, $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \gamma - \gamma_1$,
 $d = 2r \sin \beta_1$, $\beta = \alpha_1 + \beta_1$, etc.
3. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$, $\delta_1 = \alpha - \alpha_1$,
 $b = 2r \sin \delta_1$, $\gamma = 180^\circ - \alpha$, $\beta_1 = \gamma - \gamma_1$,
 $d = 2r \sin \beta_1$.
4. $\sin \gamma_1 = a : 2r$, $\sin \alpha_1 = c : 2r$, $2\beta_1 = \sigma - \alpha_1 - \gamma_1$,
 $\beta = \alpha_1 + \beta_1$, $\gamma = \beta_1 + \gamma_1$, $\alpha = 180^\circ - \gamma$,
 $\delta = 180^\circ - \beta$, $d = 2r \sin \beta_1$, $b = 2r \sin \delta_1$.
5. $\sin \alpha = f : 2r = \sin \gamma$, $\sin \beta = e : 2r = \sin \delta$,
 $2\gamma_1 = \gamma + \delta - \varphi$.
6. $\delta = 180^\circ - \beta$, $\gamma_1 + \delta_1 = \delta$,
 $\tan \frac{1}{2}(\gamma_1 - \delta_1) = (a - b) \cotg \frac{1}{2}\beta : (a + b)$.
7. $\cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - e^2}{2ab}$, $\cos \gamma_1 = \frac{b^2 + e^2 - a^2}{2be}$,
 $\cos \delta_1 = \frac{a^2 + e^2 - b^2}{2ae}$, $\sin \alpha = \frac{f \sin \gamma_1}{a}$, $\alpha_1 = \alpha - \delta_1$,
 $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $d = a \sin \beta_1 : \sin \gamma_1$.
8. $\delta = 180^\circ - \beta$, $\sin \gamma_1 = a \sin \beta : e$, $\sin \alpha_1 = c \sin \beta : e$,
 $\beta_1 = \beta - \alpha_1$, $\gamma = \beta_1 + \gamma_1$.
9. $f_2 = \frac{e_1 \cdot e_2}{f_1}$, $\cos \beta_1 = \frac{a^2 + f_1^2 - e_1^2}{af_1}$,
 $\cos \delta_1 = \frac{a^2 + e_1^2 - f_1^2}{ae_1}$, $c = \frac{e_2 \sin(\beta_1 + \delta_1)}{\sin \delta_1}$,
 $b^2 = f_1^2 + e_2^2 - 2f_1 e_2 \cos(\beta_1 + \delta_1)$,
 $d^2 = e_1^2 + f_2^2 - 2e_1 f_2 \cos(\beta_1 + \delta_1)$.
10. $CE = q = -\frac{1}{2}c + \sqrt{p(a+p) + \frac{1}{4}c^2}$,
 $\cos \beta = \frac{q^2 - b^2 - p^2}{2bp}$, $\cos \gamma = \frac{p^2 - b^2 - q^2}{2dq}$,
 $\alpha = 180^\circ - \gamma$, $\delta = 180^\circ - \beta$,
 $d = (a + p) \sin(\alpha + \delta) : \sin \delta$.
11. $d = \frac{p^2 - ac}{b}$, $\cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}$,
 $\cos \alpha = \frac{a^2 + d^2 - b^2 - c^2}{2(ad + bc)}$.

8. Seiten: $41^{\circ} 48' 32''$; $42^{\circ} 50' 1''$; $59^{\circ} 10' 12''$.

Winkel: $50^{\circ} 43' 42''$; $52^{\circ} 8' 23''$; $94^{\circ} 18' 56''$.

9. $\alpha = 109^{\circ} 28' 16''$; $\tan \frac{1}{2}\alpha = \sqrt{2}$; $\beta = 70^{\circ} 31' 44''$,

$O = 12a^2 \sin \alpha = 8a^2 \sqrt{2}$, $V = \frac{1}{3}a^3 \sqrt{3}$.

10. $\tan \frac{1}{2}\alpha = b : \sqrt{3b^2 - a^2}$, $\tan \frac{1}{2}\beta = 2\sqrt{3b^2 - a^2} : a$.

11. $\cos x = \frac{\sin \beta \sin \gamma - \cos \alpha}{\cos \beta \cos \gamma}$;

$\tan \frac{1}{2}x = \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \gamma) \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta + \gamma)}{\cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma) \cos \frac{1}{2}(\beta + \gamma - \alpha)}}$.

12. $\cos x = \sin \varphi \sin \varphi' + \cos \varphi \cos \varphi' \cos (l - l')$; $15 x^{\circ}$.

a) $64,5$ M., b) $617,5$ M., c) $3\frac{1}{2}$ M.

13. $\cos (l - l') = \frac{\cos \frac{1}{2}x^{\circ} - \sin \varphi \sin \varphi'}{\cos \varphi \cos \varphi'}$;

a) circa 44° ; b) circa $76^{\circ} 22'$ w. L.

14. $75^{\circ} 38'$ von Süden nach Osten.

15. $58^{\circ} 6' 15''$ n. Br., $4^{\circ} 50' 22''$ w. L.

16. Berechnung eines Dreiecks aus zwei Seiten $90^{\circ} - b$, c und dem eingeschlossenen Winkel $90^{\circ} - l$; $\delta = 32^{\circ} 23' 47'',5$, $\alpha = 301^{\circ} 48' 17''$.

17. Ebenso aus $90^{\circ} - \delta$, c und $90^{\circ} + \alpha$; $b = -5^{\circ} 40'$, $l = 68^{\circ} 29' 19''$.

18. Berechnung eines Dreiecks aus zwei Seiten $90^{\circ} - h$, $90^{\circ} - \delta$ und einem gegenüberliegenden Winkel $180^{\circ} - \alpha$; $w = 45^{\circ} 42' (134^{\circ} 18')$, $\varphi = 67^{\circ} 58' 55''$.

19. Ebenso aus $90^{\circ} - h$, $90^{\circ} - \delta$ und w ; im Zahlenbeispiel $\sin \varphi = \sin h : \sin \delta$; $\varphi = 54^{\circ} 43' 20''$.

20. Aus zwei Seiten $90^{\circ} - \delta$, $90^{\circ} - \varphi$ und dem eingeschlossenen Winkel w die dritte Seite $90^{\circ} - h$ zu berechnen. $h = 65^{\circ} 37' 30''$.

21. Berechnung eines Winkels $180^{\circ} - \alpha$ aus den drei Seiten p , z , $90^{\circ} - \varphi$; $\alpha = 97^{\circ} 53' 51'',4$.

22. Gegeben eine Seite $90^{\circ} - \varphi$ und die anliegenden Winkel $180^{\circ} - \alpha$, w ; gesucht eine Seite $90^{\circ} - \delta$; $\delta = +20^{\circ} 48' 14'',3$.

23. Berechnung eines Dreiecks aus zwei Seiten p , $90^{\circ} - \varphi$ und dem eingeschlossenen Winkel w ; $h = 58^{\circ} 25' 15''$, $\alpha = 27^{\circ} 32'$.

24. Berechnung eines Winkels w aus den drei Seiten $90^{\circ} - h$, $90^{\circ} - \varphi$, $90^{\circ} - \delta$; $x = \frac{w'}{15} = 3^h 59^m 27^s$ (wahre Sonnen-Zeit).

$$25. \cos w' = -\frac{\sin r + \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta} = -\frac{\sin 35'}{\cos \varphi \cos \delta} - \tan \varphi \tan \delta.$$

26. Für den wahren Sonnenaufgang ist $\cos w = -\tan \varphi \tan \delta$,
daher $2 \sin \frac{1}{2}(w - w') \sin \frac{1}{2}(w + w') = -\frac{\sin r}{\cos \varphi \cos \delta}$;

$$w' - w = \frac{\sin r}{\cos \varphi \cos \delta \cos w}.$$

Der Zeitunterschied ist derselbe für je zwei Tage des Sommers und des Winters, welche gleiche nördliche und südliche Declination der Sonne haben, insbesondere also auch für den längsten und den kürzesten Tag; er ist am kleinsten für $\delta = 0$, d. h. zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen, er wächst mit der nördlichen und südlichen Declination der Sonne und ist zur Zeit der Sonnenwenden am grössten.

27. $\cos w$ nach 25; $\frac{2w}{15}$ Stunden. Nimmt man an, die Declination der Sonne ändere sich gleichmässig während 24 Stunden und sei am wahren Mittag gleich δ , so ist näherungsweise

$$-\sin r = \sin \varphi \sin \left(\delta - \frac{nw}{360^\circ} \right) + \cos \varphi \cos \left(\delta - \frac{nw}{360^\circ} \right) \cos w',$$

$$-\sin r = \sin \varphi \sin \left(\delta + \frac{nw}{360^\circ} \right) + \cos \varphi \cos \left(\delta + \frac{nw}{360^\circ} \right) \cos w'',$$

wo w nach 25 zu bestimmen ist. Die gesuchte Zeit ist dann $(w' + w'') : 15$ Stunden.

28. $\varphi = 90^\circ - (\delta + r)$, $\delta = 23^\circ 27' 40''$, $r = 35'$, $\varphi = 65^\circ 57' 20'$,
(für den Sonnen-Mittelpunkt).

29. Unter der Breite $\varphi > 66^\circ 0' 20''$ bleibt der Sonnen-Mittelpunkt sichtbar von dem Momente, in welchem die Declination der Sonne $\delta = 90^\circ - (\varphi + r)$ ist bis zu dem Momente, in welchem sie wieder die gleiche wird. Für den äussersten Sonnenrand ist $\delta = 90^\circ - (\varphi + r + 16')$ zu setzen.

30. Sind a, a' die beobachteten Differenzen der Azimuthe in Beziehung auf den ersten Stern, h, h', h'' die beobachteten Höhen, so setze man

$$\tan \vartheta = \tan \frac{1}{2}(h' + h) \tan \frac{1}{2}(h' - h) \cotg \frac{1}{2}a,$$

$$\tan \vartheta' = \tan \frac{1}{2}(h'' + h) \tan \frac{1}{2}(h'' - h) \cotg \frac{1}{2}a',$$

$$\tan \psi = \frac{\cotg \frac{1}{2}(h'' - h) \sin \frac{1}{2}a' \cos \vartheta}{\cotg \frac{1}{2}(h' - h) \sin \frac{1}{2}a \cos \vartheta'}, \text{ und es ist}$$

$$\begin{aligned} & \text{tang} [\alpha + \tfrac{1}{2}(\vartheta' + \vartheta) + \tfrac{1}{2}(a' + a)] \\ &= \text{tang} [\tfrac{1}{2}(\vartheta' - \vartheta) + \tfrac{1}{2}(a' - a)] \text{tang} (45^\circ + \psi). \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich das zwischen 0° und 180° liegende erste Azimuth α . Ferner ist

$$-\text{tang } \varphi = \text{cotg } \tfrac{1}{2}(h' - h) \sin \tfrac{1}{2}a \sin (\alpha + \varphi + \tfrac{1}{2}a) : \cos \varphi$$

und

$$\sin \delta = \sin \varphi \sin h - \cos \varphi \cos h \cos \alpha.$$

31. Bedeutung der Buchstaben, wie vorher.

$$\text{tang } \psi = \frac{\cos \tfrac{1}{2}(\delta + \delta') \sin \tfrac{1}{2}(\delta - \delta') \sin \tfrac{1}{2}a'}{\cos \tfrac{1}{2}(\delta + \delta'') \sin \tfrac{1}{2}(\delta - \delta'') \sin \tfrac{1}{2}a}$$

$$\text{tang} [\alpha + \tfrac{1}{2}(a + a')] = \text{tang } \tfrac{1}{2}(a' - a) \text{tang} (45^\circ + \psi),$$

wo α zwischen 0 und 180° liegt. Ferner

$$\text{tang } \vartheta^2 = \sin \tfrac{1}{2}a^2 \frac{2 \cos \tfrac{1}{2}(\delta + \delta') \sin \tfrac{1}{2}(\delta - \delta')}{\sin (\alpha + \tfrac{1}{2}a) \sin \tfrac{1}{2}a \sin \delta},$$

$$\text{tang } \eta^2 = \cos \tfrac{1}{2}a^2 \frac{2 \cos \tfrac{1}{2}(\delta + \delta') \sin \tfrac{1}{2}(\delta - \delta')}{\sin (\alpha + \tfrac{1}{2}a) \sin \tfrac{1}{2}a \sin \delta},$$

$$\cos (\varphi + h) = -\sin \delta : \cos \vartheta^2, \quad \cos (\varphi - h) = \sin \delta \cos 2\eta : \cos \eta^2.$$

Schlusswort.

Die Resultate zu den nicht mit besonderen Zahlenbeispielen versehenen Aufgaben des §. 27 sind mit Rücksicht auf die beigegebene Anleitung zur Auflösung, um den Umfang des Resultatenheftes nicht ohne Noth zu steigern, weggelassen worden. Für die Zahlenbeispiele zu denselben ist die Tabelle, Seite 161 bis 164, beigegeben worden, welche in jedem einzelnen Fall auch die Resultate liefert. Einzelne kleine Unregelmässigkeiten der auf Ersparung von Raum berechneten Schreibweise der Resultate bittet der Verf. zu entschuldigen.

Auf Seite 38 des vorliegenden Heftes ist einzuschalten:

§. 25 b.

20. 1 : 1,87939. 21. 5,438; 6,857. 22. 0,1729; 0,1990.
23. 18° , 36° , 126° . 24. 72° , 45° , 63° ; 1,4142; 1,0515; 1,3249;
und auf Seite 48:

43. b) $\beta = 82^\circ 59', 2$, $\gamma = 70^\circ 42', 3$, $b = 11,197$, $c = 10,648$,
 $F = 26,421$.

Frischauf, J., Professor an der Universität zu Graz, Elemente der Geometrie. Zweite Auflage. [VIII u. 164 S.] gr. 8. geh. n. *M* 2. —

Kirchhoff, Dr. G., Professor der Physik an der Universität zu Berlin, Vorlesungen über mathematische Physik. Mechanik. Zweite Auflage. [VIII u. 466 S.] gr. 8. geh. n. *M* 13. —

Klekler, Karl, Prof. a. d. k. k. Marine-Akademie zu Fiume, die Methoden der darstellenden Geometrie zur Darstellung der geometrischen Elemente und Grundgebilde. Mit 13 lithographirten Tafeln. [X u. 151 S.] gr. 8. geh. n. *M* 4. 40.

Kohlrausch, F., o. Professor an der Universität Würzburg, Leitfaden der praktischen Physik mit einem Anhang das elektrische und magnetische absolute Maass-System. Dritte vermehrte Auflage. [XII u. 254 S.] gr. 8. geh. n. *M* 5. —

Lorberg, Dr. H., Oberlehrer am kaiserl. Lyceum zu Strassburg. Lehrbuch der Physik für höhere Lehranstalten. Mit zahlreichen Holzschnitten und einer lithogr. Tafel. [XVI u. 320 S.] gr. 8. geh. n. *M* 4. —

Matthiessen, Dr. L., o. Professor der Physik an der Universität zu Rostock, Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme. Mathematische Einleitung in die Dioptrik des menschlichen Auges. [VIII u. 276 S.] gr. 8. geh. n. *M* 8. —

Montag, J. B., praktische leichtfaßliche Anleitung zur Buchstabenrechnung und Algebra mit vielen Beispielen und im Anhang die Aufgabensammlungen von Meier, Firsch und B. Für Seminarien, Gewerbeschulen, höhere Bürgerschulen Selbstunterricht. Fünfte, gänzlich umgearbeitete und mehrte Auflage. [VIII u. 388 S.] gr. 8. geh.

Müller, Dr. Hubert, Oberlehrer am Lyceum, Leitfaden der Stereometrie mit Benutzung der Anschauungsweisen für die Schule. In 2 Theile. Theil: Die Grundgebilde und die Formen. Mit zahlreichen Holzschnitten. [X u. 127 S.] gr. 8. geh. n. *M* 2. —

Neumann, Dr. C., o. Professor, Vorlesungen über die Gesetze hinsichtlich der in neuerer Zeit entdeckten Kräfte von Ampère und Weber erhalten. Zweite Auflage. [XI u. 340 S.] gr. 8. geh. n. *M* 10. —

Reidt, Dr. Friedrich, Oberlehrer am Gymnasium und der höheren Bürgerschule zu Hamm, Sammlung von Aufgaben und Beispielen aus der Trigonometrie und Stereometrie. I. Theil: Trigonometrie. Zweite Auflage. [VIII u. 247 S.] gr. 8. geh. n. *M* 4. —

----- II. Theil: Stereometrie. Zweite Auflage. gr. 8. [VIII u. 183 S.] gr. 8. geh. n. *M* 3. —

Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen und angewandten Mathematik. „Originalberichte der Verfasser.“ Gesammelt und herausgegeben von L. KOENIGSBERGER und G. ZEUNER. I. Band. 4. u. 5. Heft. [S. 285—464.] gr. 8. Jedes Heft à n. *M* 1. 20.

----- dasselbe, erster Band vollständig. [IV u. 464 S.] gr. 8. geh. n. *M* 7. 20.

Salmon, G., Vorlesungen über die Algebra der linearen Transformationen. Deutsch bearbeitet von Dr. WILHELM FIEDLER, Professor am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage. [XIV u. 478 S.] gr. 8. geh. n. *M* 10. —

Schröder, Dr. Ernst, ord. Professor an der polytechnischen Schule in Karlsruhe, der Operationskreis des Logikkalküls. [VI u. 37 S.] gr. 8. 1877. geh. *M* 1. 50.

Schüze, G. Th., Oberlehrer am Seminar zu Waldburg, praktische Anweisung zur Behandlung der Bruchrechnung und der bürgerlichen Rechnungsarten für angehende Lehrer. Zugleich ein ausgeführter Lehrgang in sechs Kreisen. [XVI u. 368 S.] gr. 8. geh. n. *M* 4. —

Zeitschrift für Mathematik und Physik, herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction von Dr. O. SCHLÖMILCH, Dr. M. CANTOR und Dr. E. KAHL. XXII. Jahrgang. Supplement. gr. 8. geh. n. *M* 5. —

Inhalt: Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik. I. Heft.

RESULTATE

DER

RECHNUNGS-AUFGABEN IN DER SAMMLUNG

VON

AUFGABEN UND BEISPIELEN

AUS DER

TRIGONOMETRIE UND STEREOMETRIE

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. FRIEDRICH REIDT,

OBERLEHRER AM GYMNASIUM UND DER HÖHEREN BÜRGERSCHULE IN HAMM.

II. THEIL: STEREOMETRIE.

ZWEITE AUFLAGE.



LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1878.

Mathematics

QA

537

R361

1878

Mathematics

GA
537
.R361
1878

mathematisches
 Rechen
 4-4-24
 10207

Resultate der Rechnungs-Aufgaben aus der Stereometrie.

Einleitung.

1. $6, \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$. 2. $\frac{n(n-1) - \alpha(\alpha-1) - \beta(\beta-1) - \gamma(\gamma-1)}{1 \cdot 2} + 3$.
 3. $\frac{n(n-1)p^2}{1 \cdot 2} + n$, 58. 4. $\frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$, 35.
 5. ab , 45. 6. $\frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$, 6.
 7. $\frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$, 15. 8. 4. 13. $\frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$, 10.
 14. $\frac{n(n-1) - \alpha(\alpha-1) - \beta(\beta-1) - \gamma(\gamma-1)}{1 \cdot 2} + 2$; 49.
 15. $\frac{p \cdot (p-1)}{1 \cdot 2}$ für $p = \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$; 24090.

Erster Abschnitt. I. Capitel.

§. 1.

32. $\sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{(a-b)(a+b)}$; α 10,4; β 31,5.
 33. $\sqrt{a^2 + r^2}$; α $32\frac{1}{8}$; β $14\frac{1}{10}$.
 34. $\sqrt{\frac{a^2 n^2 - b^2 m^2}{n^2 - m^2}}$; α 21; β 132.
 35. $\sqrt{(a-b)^2 + c^2}$; α $1\frac{1}{10}$; β 38,9.
 36. $\sqrt{a^2 + b^2 - 2c^2}$; α 4; β 9.
 37. $F_1 = \frac{3}{4}(b^2 - c^2)\sqrt{3}$; $F_2 = \frac{1}{4}\sqrt{3}(b^2 - c^2)(b^2 + 3c^2)$.
 38. $\frac{1}{2} a \sqrt{2}$; 39. $(bm \pm an) : (m \pm n)$.
 40. $a \cdot \cos \alpha$; 221; 3,3. 41. $\tan \alpha = r : p$, $\alpha = 60^\circ 27'$.
 42. $\cos \alpha = a : b$, $\alpha = 70^\circ$. 43. $(a-b) : \cos \alpha = 2,24$.

§. 2.

22. $a\sqrt{2}$. 23. $\frac{1}{2} a$.
 24. $\sqrt{bc(b+c+a)(b+c-a)} : (b+c) = 4\frac{1}{4}$.
 1* R.H. II.

$$25. \sqrt{a^2 + b^2} = 2. \quad 26. 60^\circ. \quad 27. a \cdot \cos \varphi = 3992.$$

$$28. b : a = \cos \varphi, \varphi = 39^\circ. \quad 29. a : \sin \varphi = 73,09.$$

$$30. \tan \varphi = (b - c) : a, \varphi = 18^\circ.$$

$$31. \cos \varphi = \cos \alpha \cdot \cos \beta, \varphi = 45^\circ.$$

$$32. \cos \varphi = \cos \alpha : \cos \beta, \varphi = 5^\circ 40'.$$

$$33. \cos \varphi = \frac{a}{m} \sqrt{\frac{m^2 - n^2}{a^2 - b^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{3}, \varphi = 30^\circ;$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{b}{n} \sqrt{\frac{m^2 - n^2}{a^2 - b^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{2}, \varphi_1 = 45^\circ.$$

$$34. \frac{2hm}{\sqrt{4m^2 - n^2}}, \frac{2hm^2}{n\sqrt{4m^2 - n^2}}; 34; 19\frac{4}{15}.$$

$$35. F = \sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)},$$

$$2s = a + b + c; \tan x = \frac{4hF}{abc}, x = 76^\circ 23' 21''.$$

§. 3.

$$18. \frac{p+q}{p} \cdot a = 4,95. \quad 19. \left(\frac{p+q}{p}\right)^2 \cdot F.$$

$$20. \sin \varphi = \frac{c \cdot \sin \alpha}{d}, \varphi = 67^\circ. \quad 21. h \cdot \sqrt{3}.$$

$$22. \cos \varphi = \frac{a^2 + b^2 - c^2 + (d - e)^2}{2ab}.$$

II. Capitel.

§. 4.

$$34. 30^\circ. \quad 35. \sqrt{a^2 - \frac{1}{4}b^2} = 224. \quad 36. b \cdot a' : a = 5,20.$$

$$37. \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 29. \quad 38. a \cdot \tan \alpha = 5,419.$$

$$39. \cos \varphi = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \varphi = 60^\circ.$$

$$40. \sin \alpha : \sin \beta : \sin \varphi = 8615 : 8000 : 9231.$$

$$41. F \cdot \cos \varphi = 717. \quad 42. F \cdot \cos \varphi = 12,31.$$

$$43. \sin \varphi = \sqrt{\sin \alpha^2 + \sin \beta^2}, \varphi = 50^\circ.$$

$$44. \cos \varphi = \frac{l^2 \sin \alpha \cdot \sin \beta \pm \sqrt{(p - l \cos \beta)(p + l \cos \beta)(p - l \cos \alpha)(p + l \cos \alpha)}}{(l + p)(l - p)}.$$

$$45. h = \frac{d \cdot \sin \varphi}{\sin \delta}, s = \sqrt{h^2 + \frac{1}{4}a^2}, \tan \beta = \frac{2h}{a},$$

$$\tan \frac{1}{2} \alpha = \frac{a}{2h}, F = \frac{1}{2} \frac{ad \sin \varphi}{\sin \delta}; s = 229;$$

$$\alpha = 30^\circ 22' 43'', 2; \beta = 74^\circ 48' 38'', 4; F = 13260.$$

46. $x = \sqrt{p^2 \sin^2 \alpha + q^2}$; $\cos \varphi = p : x$,
 $\cos \psi = \frac{q}{x}$; $x = 17$, $\varphi = 22^\circ$, $\psi = 52^\circ$.
47. $\sin \varphi^2 = \frac{m^2(q^2 - p^2)}{n^2 q^2 - m^2 p^2}$, $\sin \psi^2 = \frac{n^2(q^2 - p^2)}{n^2 q^2 - m^2 p^2}$; $60^\circ, 45^\circ$.
48. $\cos x = \frac{\cos \alpha - \sin \beta \sin \gamma}{\cos \beta \cos \gamma}$,
 $\sin \varphi = \frac{1}{\sin \alpha} \cdot \sqrt{\sin^2 \beta + \sin^2 \gamma - 2 \sin \beta \sin \gamma \cos \alpha}$;
 $x = 142^\circ 44'$, $\varphi = 36^\circ 17' 31'', 4$.

§. 5.

33. $\sqrt{a^2 - b^2 + c^2} = 3,9$. 34. $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 173$.
35. $\frac{4}{3} a \sqrt{7} = 2\frac{1}{2}$.
36. $\cos \varphi = (a^2 - b^2 + c^2 + d^2) : 2cd$; $\varphi = 52^\circ$.

III. Capitel.

§. 7.

29. $\sin x : \sin y = \sin \alpha : \sin \beta$.
30. $\cos \alpha = \frac{\cos a - \cos b \cdot \cos c}{\sin b \cdot \sin c}$; $\alpha = 18^\circ 37' 15''$;
 $\beta = 26^\circ 59' 0''$; $\gamma = 140^\circ 14' 54'', 5$.
31. $\cos a = \frac{\cos \alpha + \cos \beta \cdot \cos \gamma}{\sin \beta \cdot \sin \gamma}$; $a = 124^\circ 12' 32''$;
 $b = 54^\circ 18' 14''$; $c = 97^\circ 12' 26''$.
32. $\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cdot \cos a$;
 $\alpha = 101^\circ 44' 21''$; $b = 27^\circ 16' 9'', 5$; $c = 88^\circ 11'$.
 (Genauer: $\alpha = 101^\circ 44' 20''$; $b = 27^\circ 16' 8''$; $c = 88^\circ 12' 19''$.)
33. $\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos \alpha$;
 $a = 53^\circ 20' 10'', 7$ ($19' 34''$); $\beta = 54^\circ 52' 7'', 7$ ($50'', 4$);
 $\gamma = 32^\circ 25' 39'', 4$ ($56'', 6$).
34. $\tan x = \tan \varphi : \sin \frac{m}{m+n} \alpha$;
 $\tan y = \tan \varphi : \sin \frac{n}{m+n} \alpha$;
 $x = 49^\circ 17' 26''$, $y = 42^\circ 20' 26''$.
35. Aus $\cos \gamma_1 = \tan \frac{1}{2} b : \tan x$, $\cos \gamma_2 = \tan \frac{1}{2} a : \tan x$,
 $\cos \gamma = \cos (\gamma_1 + \gamma_2)$ folgt $\tan x^2 = (\tan \frac{1}{2} a^2 + \tan \frac{1}{2} b^2$
 $- 2 \tan \frac{1}{2} a \cdot \tan \frac{1}{2} b \cdot \cos \gamma) : \sin \gamma^2$, wo $\cos \gamma =$
 $(\cos c - \cos a \cdot \cos b) : \sin a \cdot \sin b$ ist.

36. $\cos \alpha = [2h^2(2t^2 - pq + qt + pt) - 3pq t^2] : \sqrt{[3q^2 t^2 + 4h^2(q^2 + t^2 + qt)] \cdot [3p^2 t^2 + 4h^2(t^2 + p^2 + pt)]}$ etc.
37. Vgl. 33.

Zweiter Abschnitt. IV. Capitel.

§. 8.

30. $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 125.$
31. $c\sqrt{a^2 + b^2} = 12\sqrt{106}, b\sqrt{a^2 + c^2} = 117,$
 $a\sqrt{b^2 + c^2} = 75.$
32. $\frac{1}{4}u + \frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{4}u^2 - 4f^2}, \frac{1}{4}u - \frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{4}u^2 - 4f^2},$
 $\sqrt{a^2 - \frac{1}{4}u^2 + 2f}.$
33. $F\sqrt{2} = 10.$ 34. $\frac{1}{16}u\sqrt{u^2 + 64p^2} = 15; 0,65.$
35. Er ist ein regelmässiges Sechseck und $1\frac{1}{2}$ mal so gross als jedes der Dreiecke.
36. a) $u = 3a\sqrt{2}, F = \frac{1}{4}a^2\sqrt{3}.$
 b) Dieselben sind einander gleich.
37. Ein gleichschenkeliges Dreieck und ein symmetrisches Fünfeck. Die Flächeninhalte der Dreiecke sind bezüglich gleich $\frac{1}{16}a^2\sqrt{7}$ und $\frac{1}{16}a^2\sqrt{15}$. $\alpha) 1,1575; 1,6944.$ $\beta) 2,5257; 3,6972.$
38. Sie sind gleich gross.
39. Diagonalaxen: $a\sqrt{2}$ und $a\sqrt{6}$, spitzer Neigungswinkel der Flächen $\varphi = 70^\circ 31' 43'', 3$, $\cos \varphi = \frac{1}{3}$, spitzer Neigungswinkel der Kanten gegen die Flächen $\psi = 54^\circ 44' 7'', 1$, $\cos \psi = \sqrt{\frac{1}{3}}.$
40. $19^\circ.$
41. Die eine ist ein regelmässiges Sechseck mit der Seite $\frac{1}{3}a\sqrt{6}$; die andere entweder ein Sechseck, in dem je zwei gegenüberliegende Seiten gleich und parallel sind, oder ein Rechteck. Die Flächeninhalte verhalten sich wie $1 : \cos \alpha.$
42. $\frac{1}{3}a^2 : \cos \alpha.$
43. $x^2 = b^2 + d^2 - 2bd \cos \beta, y^2 = a^2 + d^2 - 2ad \cos \alpha,$
 $16F^2 = 4c^2x^2 - (c^2 + x^2 - y^2)^2; 1800.$
44. Aus a, b, c berechne man den Flächenwinkel φ an der genannten Seitenkante, aus a, α und b, β zwei Grundkanten a_1, b_1 , aus φ, α, β den Winkel γ zwischen a_1 und b_1 und den

Flächenwinkel δ an a_1 , dann die dritte Grundkante c_1 aus a_1 , b_1 und γ , endlich aus h , δ und α die Seitenkante.

§. 9.

$$44. \sqrt{h^2 + \frac{1}{3}a^2} = 11,4. \quad 45. \sqrt{2(b+h)(b-h)} = 0,4.$$

$$46. \sqrt{(b+a)(b-a)} = 3,08. \quad 47. \frac{1}{2}a^2(\sqrt{2}+1) = 50.$$

$$48. h \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{3}(G+g)} - \sqrt{g}}{\sqrt{G} - \sqrt{g}} = 7,265.$$

$$49. \frac{h \cdot \sqrt[4]{V_g}}{\sqrt[4]{G} + \sqrt[4]{V_g}} = 1,2032.$$

$$50. \frac{1}{4}h^2(\sqrt{5}-1) = 0,61803h^2 \text{ und } h^2(\sqrt{5}-2) = 0,23607h^2.$$

$$51. \frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{h}, x = 2,4. \quad 52. \frac{1}{x} = \frac{1}{h} + \frac{\sqrt{2}}{a}, x = 2.$$

$$53. n : \sqrt{12(4-n^2)} = 1 : 6. \quad 54. \frac{4}{3}\sqrt{2}.$$

$$55. \frac{\pi r}{\sqrt{4-n^2}} = 8. \quad 56. \frac{ab}{a+b} = \alpha) 1,875; \beta) 1,2.$$

$$57. \frac{1}{3}(G + 4\sqrt{Gg} + 4g) \text{ und } \frac{1}{3}(4G + 4\sqrt{Gg} + g); 19,6 \text{ und } 25,6.$$

$$58. q(m-1) : p = 4 : 17.$$

$$59. \cos \varphi = \frac{1}{3}a\sqrt{3} : b, \cos \psi = \frac{1}{3}a\sqrt{3} : \sqrt{4b^2 - a^2}; \varphi = 25^\circ 46' 30'', \psi = 44^\circ.$$

$$60. a) \sin \frac{1}{2}\varphi = \frac{\sqrt{9n^2+3}}{6n}, \cos \frac{1}{2}\varphi = \frac{\sqrt{27n^2-3}}{6n} = \frac{3}{4}, \varphi = 82^\circ 49' 10''. \quad b) \cos \psi = 1 : 3n = \frac{1}{4}, \psi = 60^\circ.$$

61. Neigungswinkel: $\tan \alpha_1 = \tan \alpha_2 = 3b : a$;
 $\tan \alpha_3 = 3b\sqrt{2} : a$; ebene Winkel der Seitenkanten
 gegen die Hypotenuse: $\tan \beta = \sqrt{18b^2 + a^2} : 3a$,
 gegen die Katheten an dem rechten Winkel
 $\tan \gamma = \sqrt{9b^2 + a^2} : a$, an den anderen Eckpunkten
 $\tan \delta = \sqrt{9b^2 + a^2} : 2a. \quad a) \alpha_1 = 67^\circ 22' 48'', 3,$
 $\alpha_3 = 73^\circ 35' 0'', 0, \beta = 49^\circ 42' 25'', 6,$
 $\gamma = 68^\circ 57' 44'', 1, \delta = 52^\circ 25' 53'', 0.$
 $b) \alpha_1 = 73^\circ 44' 23'', 1, \alpha_3 = 78^\circ 20' 48'', 3,$
 $\beta = 58^\circ 47' 8'', 3, \gamma = 74^\circ 21' 27'', 5, \delta = 60^\circ 45' 4'', 0.$

$$62. \tan \alpha = p \sqrt{m^2 + n^2} : mn, \tan \beta = n \sqrt{p^2 + m^2} : pm, \\ \tan \gamma = m \sqrt{p^2 + n^2} : pn; \alpha = 67^\circ 24' 41'', \\ \beta = 59^\circ 11' 34'', \gamma = 39^\circ 48' 21''.$$

$$63. \sin \frac{1}{2} \varphi = \sin \left(\frac{n-2}{n} \cdot 90^\circ \right) : \cos \frac{1}{2} \alpha; \varphi = 165^\circ.$$

$$64. g = s \cdot \cos \alpha, G = 2s \cdot \cos \alpha; g = 254, G = 508.$$

$$65. \cos \alpha = \frac{\sqrt{m} - \sqrt{n}}{2\sqrt{m} \cdot \sin 36^\circ}, \alpha = 57^\circ 40'.$$

$$66. 143^\circ 7' 48'', 7.$$

$$67. x = a \cdot \sin \beta : \sin (\alpha + \beta), y = a \cdot \sin \alpha : \sin (\alpha + \beta) \\ = b \cdot \sin \delta : \sin (\gamma + \delta), z = b \cdot \sin \gamma : \sin (\gamma + \delta). \\ \text{Die Winkel ergeben sich aus den Seiten } x, z, c \text{ des} \\ \text{Dreiecks.}$$

$$68. \text{Es seien } a, d \text{ und } c, f \text{ die Längen der halbirten, } b, e \\ \text{die der nicht halbirten Kantenpaare, so ist } \cos \varphi \\ = (c^2 + f^2 - a^2 - d^2) : 2be.$$

§. 10.

$$41. rh\sqrt{2} = 1,4. \quad 42. \frac{1}{4}r\sqrt{12h^2 + 3r^2} = 2.$$

$$43. \frac{3}{4}d(4 - \sqrt{2}). \quad 44. \text{Wie } 2 : \pi. \quad 45. \text{Wie } 4 : \pi.$$

$$46. \frac{h}{c} \cdot \sqrt{(R+r+c)(R+r-c)(R-r+c)(-R+r+c)} = 1760.$$

$$47. h = \frac{1}{2}(\sqrt{d^2 + 2F} - \sqrt{d^2 - 2F}), \\ r = \sqrt{c^2 + \frac{1}{8}(d^2 + \sqrt{d^4 - 4F^2})}; \\ h_1 = 8, r = \frac{1}{2}\sqrt{261} = 8,0778; h_2 = 15, r_2 = 5.$$

$$48. \frac{1}{2}F\sqrt{3}.$$

$$49. \text{Berechne: } 2s = a + b + c = 336,$$

$$q = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}} = 32; F = q \cdot s = 5376,$$

$$R = \frac{abc}{4F} = 65, H = \sqrt{(d-R)(d+R)} = 72,$$

$$r = \frac{H^2 q \pm q \sqrt{4q^2 f^2 + f^2 H^2 - 4q^2 H^2}}{4q^2 + H^2},$$

$$r_1 = 23\frac{9}{15}, r_2 = 12 \text{ und } h = \frac{H(q-r)}{q},$$

$$h_1 = 18\frac{8}{15}, h_2 = 45.$$

$$50. 2ar \sin \alpha = 5,723.$$

$$51. 2ar\sqrt{1 - \cos \alpha^2 \cos \beta^2} = 119,405.$$

$$52. r = \frac{1}{2}\sqrt{\{a^2 + b^2 - 2\sqrt{(ab+F)(ab-F)}\}} = 17,2616;$$

$$h = F : 2r = 17,8432.$$

§. 11.

$$24. m^2 r^2 \pi : (m + n)^2.$$

$$25. \frac{h}{R-r} \{R - \sqrt{\frac{1}{2}(R^2 + r^2)}\} = 6.$$

$$26. r\pi. \quad 27. \sqrt{h^2 + r^2}; \alpha) 2,29; \beta) 28,9; \gamma) 25,7.$$

$$28. \sqrt{\frac{1}{2}(S^2 + s^2) - a^2} = 17,6786.$$

$$29. a = \sqrt{\frac{1}{2}(S^2 + s^2) - r^2}; s = \sqrt{2(a^2 + r^2) - S^2};$$

$$S = \sqrt{2(a^2 + r^2) - s^2}.$$

$$30. \frac{1}{2} r \sqrt{2h^2 + r^2} = 38\frac{1}{2}. \quad 31. r \sqrt{3(r^2 + h^2)}.$$

$$32. \frac{Rr}{R+r}. \quad 33. \sqrt{[s^2 - \frac{1}{4}a^2 + (1 - \frac{1}{2}\sqrt{2})ab]} = 6,705(1).$$

$$34. r = h \tan \frac{1}{2} \alpha = 7; s = h : \cos \frac{1}{2} \alpha = 25.$$

$$35. h = a \cdot \sin \varphi = 308; S = \sqrt{a^2 + r^2 + 2ar \cos \varphi} = 533;$$

$$s = \sqrt{a^2 + r^2 - 2ar \cos \varphi} = 317.$$

$$36. \sin \varphi = h : a; \varphi = 69^\circ 37' 28''6;$$

$$s = \sqrt{a^2 + r^2 - 2ar \cdot \cos \varphi} = 42,1;$$

$$S = \sqrt{a^2 + r^2 + 2ar \cos \varphi} = 54,1;$$

$$\sin \alpha = h : S; \alpha = 50^\circ 55' 36'',1.$$

$$37. h = S \cdot \sin \alpha = 10; \sin \beta = S \cdot \sin \alpha : s;$$

$$\beta_1 = 57^\circ 25' 0'', \beta_2 = 122^\circ 35' 0'';$$

$$\gamma_1 = 78^\circ 40' 55'',7, \gamma_2 = 13^\circ 30' 55'',7;$$

$$r = \frac{1}{2} s \cdot \sin \gamma : \sin \alpha; r_1 = 8,39117, r_2 = 2;$$

$$(1,99995); \tan \varphi = h : (S \cdot \cos \alpha - r);$$

$$\varphi_1 = 78^\circ 41' 28'',2, \varphi_2 = 50^\circ 0' 0''.$$

$$38. \sin \beta = r \cdot \sin \alpha : a; \beta = 36^\circ 26' 28'',6.$$

$$\varphi = \alpha + \beta; \varphi = 71^\circ 55' 50'',2.$$

$$S = a \cdot \sin \varphi : \sin \alpha; S = 6,89.$$

$$s = \sqrt{a^2 + r^2 - 2ar \cdot \cos \varphi}; s = 5,$$

$$h = a \cdot \sin \varphi; h = 4.$$

§. 12.

$$77. \varrho = \sqrt{r^2 - p^2}; \alpha) 2,99; \beta) 7,56; \gamma) 79,2.$$

$$78. r = \sqrt{(m^2 \varrho_1^2 - n^2 \varrho^2) : (m^2 - n^2)} = 25.$$

$$79. r = \frac{1}{2} a \sqrt{219} = 219. \quad 80. R = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + 2r^2} = 28,5.$$

$$81. \varrho = \frac{2}{3} r = 15; p = \frac{4}{3} r = 20.$$

$$82. p = 3r \cdot \frac{m \pm \sqrt{9 - 8m}}{m + 9} = \frac{2}{3} r. \quad (\text{Der zweite Werth für } m = 1 \text{ ist } p = 0.) \quad \text{Radius für die Halbkugel:}$$

$$\frac{r}{m + 9} \cdot \sqrt{-8m^2 + 90m + 18m \sqrt{9 - 8m}} = \frac{1}{2} r.$$

$$\text{Radius für den Kegel: } \frac{r}{m + 9} (9 + \sqrt{9 - 8m}) = \frac{1}{2} r.$$

$$83. r_1 = \frac{ma}{m + n} \cdot \frac{3 - \sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} a;$$

$$r_2 = \frac{na}{m + n} \cdot \frac{3 - \sqrt{3}}{2} = \frac{7 - 3\sqrt{3}}{6} a.$$

$$84. \text{Die Seitenlinie muss gleich der Summe der beiden Radien sein. } R = \sqrt{r \cdot r_1} = 6,6.$$

$$85. G = 4a^2; r = \frac{a}{3} \sqrt{6}; 2 : 1.$$

$$86. r_1 = r (\sqrt{2} - 1); r_2 = r (\sqrt{2} + 1). \quad 87. 7 : 3.$$

$$88. p = \frac{hr^2(n-1)}{nr^2 + h^2} \quad (\text{oder } p = h); \text{ Beisp. } p = \frac{hr^2}{2r^2 + h^2}.$$

$$89. f_1 + f_2 + f_3 = 2s = 471,38;$$

$$h^2 = \sqrt{s \cdot (s - f_1)(s - f_2)(s - f_3)} : 4g; h = 1,85;$$

$$r = abc : 4g; R = \sqrt{r^2 + \frac{1}{4} h^2} = 434,4 \dots$$

$$90. 2 : 1. \quad 91. \sqrt{5 + 2\sqrt{2}} : \sqrt{17} = 1 : \sqrt{5 - 2\sqrt{2}}.$$

$$92. \frac{R^2}{4(r - \varrho)} - \varrho = 4. \quad 93. x = r \cdot \frac{\sqrt{h^2 + r^2} - r}{h + \sqrt{2}(\sqrt{h^2 + r^2} - r)}.$$

$$94. R. \quad 95. s : h. \quad 96. \frac{1}{2} R (3\sqrt{2} - 4).$$

$$97. a_1 = 2r \cdot \sin \frac{1}{2} \alpha = 37,0; b_1 = 2r \cdot \sin \frac{1}{2} \beta = 143,2;$$

$$c_1 = 2r \cdot \sin \frac{1}{2} \gamma = 108,6; a_1 + b_1 + c_1 = 2s = 288,8;$$

$$F = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)} = 816,24.$$

$$98. R^2 = r^2 + (a^2 - r^2)^2 : 4a^2 \sin^2 \varphi; R = 25.$$

$$99. \text{Ist } m = \sqrt{R^2 - r^2} \cdot \sin \varphi, \text{ so ist } a = \sqrt{r^2 + m^2} \pm m, \\ \text{tang } \alpha = r : \sqrt{R^2 - r^2}; a_1 = 59,7299, \alpha_1 = 19^\circ 43' 54''.$$

$$100. (m^2 \cotg \frac{1}{2} \varphi^2 - n^2) : mn (\cotg \frac{1}{2} \varphi^2 - 1).$$

§. 13.

36. Tetraëder: $R = \frac{1}{4} a \sqrt{6}$, $r = \frac{1}{12} a \sqrt{6}$, $d = \frac{1}{4} a \sqrt{2}$.

Oktaëder: $R = \frac{1}{2} a \sqrt{2}$, $r = \frac{1}{6} a \sqrt{6}$, $d = \frac{1}{4} a$.

Ikosaëder: $R = \frac{1}{4} a \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$, $r = \frac{1}{12} a \sqrt{3} (3 + \sqrt{5})$,
 $d = \frac{1}{4} a \sqrt{6 + 2\sqrt{5}}$.

Hexaëder: $R = \frac{1}{2} a \sqrt{3}$, $r = \frac{1}{6} a$, $d = \frac{1}{4} a \sqrt{2}$.

Dodekaëder: $R = \frac{1}{4} a \sqrt{18 + 6\sqrt{5}}$,

$r = \frac{1}{20} a \sqrt{250 + 110\sqrt{5}}$, $d = \frac{1}{4} a \sqrt{\frac{1}{2} (7 + 3\sqrt{5})}$.

37. 1 : 1. 38. 1 : 1.

39. Sie ist ein regelmässiges Sechseck und gleich $1\frac{1}{2} F$.

40. Der Umfang ist stets gleich $3a$, der Inhalt ist gleich $\frac{3}{8} \sqrt{3} (a^2 - 2d^2)$.

41. Er ist constant gleich der doppelten Kante des Tetraëders.

42. Sie sind einander gleich.

43. $\sqrt{m^2 + \frac{4}{3} mn - \frac{4}{3} m \sqrt{mn}} : n = 1 : 3$.

44. $2\sqrt{6} : 3$. 45. $(2 - \sqrt{2}) : 1$. 46. $\sqrt{5 + 2\sqrt{5}} : \sqrt{3}$.

47. Die Umfänge verhalten sich wie $\frac{1}{4} (\sqrt{5} + 1) : 1 : 1$, oder der Umfang des ersten Schnitts verhält sich zum Umfang des zweiten, wie die Seite des dritten zur Kante des Körpers, und der zweite und dritte Schnitt haben gleiche Umfänge. Es ist $u_1 = \frac{1}{4} a (3 + \sqrt{5})$, $u_2 = u_3 = \frac{1}{2} a (\sqrt{5} + 1)$. Die Flächeninhalte sind $F_1 = \frac{1}{2} a^2 (7 + 3\sqrt{5})$, $F_2 = \frac{1}{8} a^2 \sqrt{650 + 290\sqrt{5}}$, $F_3 = \frac{5}{16} a^2 \sqrt{130 + 58\sqrt{5}}$, oder es ist $F_1 : F_2 = \sqrt{\frac{1}{2} (5 + \sqrt{5})} : 20$, $F_3 : F_2 = 5\sqrt{5} : 2$.

48. a) $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\alpha = 70^\circ 31' 43''.6$; b) $\cos \frac{1}{2} \alpha = \frac{1}{3} \sqrt{3}$,
 $\alpha = 109^\circ 28' 16''.4$; c) $\sin \frac{1}{2} \alpha = \frac{2}{3} \sqrt{3} \cdot \sin 54^\circ$,
 $\alpha = 138^\circ 11' 23''$; d) $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$, $\alpha = 116^\circ 33' 54''.2$.

49. $\sin \varphi = \frac{1}{3} \sqrt{3}$, $\varphi = 35^\circ 15' 52''$.

50. $H : h = 3,4549 : 1$ oder nahezu wie $919 : 266$.

51. $54^\circ 44',1$; $70^\circ 31',8$; $\frac{1}{4} a^2 \sqrt{2}$.

52. $\tan \varphi = 2m \sqrt{2} : (m + 3n) = \frac{2}{3} \sqrt{2}$ oder $\frac{1}{3} \sqrt{2}$.
 $\varphi = 22^\circ 0'$ oder $48^\circ 31' 39''$. (Genauer $22^\circ 0' 6''$ und $48^\circ 31' 37''$.)

$$53. h = \frac{1}{2} a, s = \frac{1}{2} a \sqrt{6}, \tan \frac{1}{2} \alpha = \frac{1}{2} \sqrt{2}, \\ \frac{1}{2} \alpha = 35^\circ 15' 52''.$$

$$54. h = \frac{1}{2} a \sqrt{6}, s = \frac{1}{2} a \sqrt{6}, \sin \frac{1}{2} \alpha = \frac{1}{2} \sqrt{6}.$$

$$55. 0,23278 a.$$

§. 15.

$$1. 2a(a + 2b). \quad \alpha) 2880,5; \beta) 61\frac{1}{2}; \gamma) 0,0464.$$

$$2. 3a^2 \sqrt{3} + 6ab. \quad \alpha) 12,4151; \beta) 547,2836.$$

$$3. 4a \cdot \{a(\sqrt{2} + 1) + 2b\} = 4a \cdot (2,41421a + 2b); \\ \alpha) 300,35029; \beta) 0,56027.$$

$$4. \sqrt{2a^2 - \frac{1}{2}u^2} = w = \pm 1,5; \\ O = \frac{1}{4} (\frac{1}{2}u - w)^2 + \frac{1}{4} \sqrt{2} (\frac{1}{2}u^2 - w^2); \\ O_1 = 20,25 + 54 \sqrt{2} = 96,618; \\ O_2 = 36 + 54 \sqrt{2} = 112,368.$$

$$5. \frac{2a^2}{a^2 + b^2} ab + ac + bc = 846.$$

$$6. 4ah + a^2(\sqrt{2} - 1) = 215 + 25\sqrt{2} = 250,355.$$

$$7. 3ab. \quad 8. 2 \cdot 240 + 90 \cdot 50 = 4980.$$

$$9. a^2 = \frac{1}{2} O : (2 + \sqrt{5} + 2\sqrt{5}). \quad 10. a^2 + 2ab\sqrt{2}.$$

$$11. 3a (\frac{1}{2} a \sqrt{3} + \sqrt{h^2 + \frac{3}{4}a^2}) = 105,62.$$

$$12. a^2 = O^2 : (2O + 4h^2); a = 20.$$

$$13. a^2 = \frac{1}{6} O \sqrt{3}; a = 8,77.$$

$$14. \sqrt{f} = 75; a = \frac{h}{p} \sqrt{f} = 112,5; h_1 = \sqrt{h^2 + \frac{1}{4}a^2} = 237,75; \\ h_2 = \sqrt{p^2 + \frac{1}{4}f} = 158,5; \\ O = f + a^2 + 2(a + \sqrt{f})(h_1 - h_2) = 48000.$$

$$15. \frac{1}{16} u^2 + \frac{1}{2} \sqrt{32 F^2 + \frac{1}{4} u^4} = \frac{1}{16} \cdot 64 + \frac{1}{2} \cdot 72 = 40.$$

$$16. \frac{3}{4} [\sqrt{3}(s^2 - h^2) + \sqrt{3(s^2 - h^2)(s^2 + 3h^2)}] = 90,796.$$

$$17. g^2 + 2g\sqrt{h^2 + \frac{1}{4}g^2} = 9,61 + 6,2 \cdot 4,93 = 40,176.$$

$$18. \frac{5}{4} \sqrt{(5 - 3\sqrt{5}) l^2 p^2 - \frac{5}{8} (3 - \sqrt{5}) p^4 + 2(5 + \sqrt{5}) l^4} \\ = 5\sqrt{210 - 6\sqrt{5}} = 70,104.$$

$$19. \frac{1}{2} (ap_1 + bp_2 + cp_3) + \frac{1}{2} a \sqrt{h^2 + p_1^2} + \frac{1}{2} b \sqrt{h^2 + p_2^2} \\ + \frac{1}{2} c \sqrt{h^2 + p_3^2}. \text{ Bedingungs-gleichung:}$$

$$\frac{1}{4} (ap_1 + bp_2 + cp_3) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

für $2s = a + b + c$.

$$20. \frac{a^2}{4} (3 + \sqrt{3}) = 2.$$

$$21. \frac{1}{4} b^2 (3 + \sqrt{3}) - \frac{1}{4} a^2 (3 - \sqrt{3}) = 100.$$

22. Durch die Formel $F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ leicht zu lösen. Im besonderen Fall sind die vier Dreiecke congruent. $O = 4 \cdot 240 = 960$.

$$23. a) a^2 \sqrt{3}; b) 2a^2 \sqrt{3}; c) 5a^2 \sqrt{3}; d) 3a^2 \sqrt{25 + 10\sqrt{5}}.$$

$$24. \frac{1}{4} a \sqrt{2}. \quad 25. \sqrt{3} : 1. \quad 26. 1 : 2. \quad 27. \frac{1}{8} O \sqrt{3}.$$

§. 16.

$$1. M = 2r\pi h; \alpha) 2186,8; \beta) 24,85.$$

$$2. h = M : 2r\pi; \alpha) 39,91; \beta) 1,622.$$

$$3. r = M : 2h\pi; \alpha) 1,96; \beta) 200.$$

$$4. M = 2r^2\pi = 802,3.$$

$$5. h = O : 2r\pi - r, \alpha) 10; \beta) 30.$$

$$6. r = \sqrt{(O - M) : 2\pi} = 7.$$

$$7. r = \sqrt{\frac{O}{2\pi} + \frac{h^2}{4}} - \frac{h}{2}; \alpha) 80; \beta) 400.$$

$$8. h = M : \sqrt{2\pi(O - M)} = 5.$$

$$9. M = a^2\pi \sqrt{2}. \quad 10. M = a^2\pi.$$

11. Sein Radius ist das geometrische Mittel zwischen der Höhe und dem Durchmesser des Cylinders.

$$12. r. \quad 13. (M_1 + M_2 + M_3) \sqrt{3} : a\pi.$$

$$14. \sqrt{r\pi(h+r) + h^2} - h = 12,8. \quad 15. 2r\pi \cdot a.$$

$$16. \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}} \left[\sqrt{d^2 + \frac{2M}{\pi}} \pm \sqrt{d^2 - \frac{2M}{\pi}} \right], \text{insbesondere:}$$

$$\frac{1}{2} d \sqrt{2 - \sqrt{2}} \cdot (\sqrt{\frac{2}{3}} \pm \sqrt{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{2} d \sqrt{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{3})}.$$

$$17. 2\pi r^2 \cdot \frac{3n^2 + 2mn - m^2}{n^2} = 79 r^2\pi = 62,39.$$

$$18. \frac{1}{2} F\pi = 100.$$

$$19. \frac{1}{3} r\pi (r + 2h) - \frac{1}{4} r^2 \sqrt{3}; \frac{2}{3} r\pi (r + 2h) + \frac{1}{4} r^2 \sqrt{3}.$$

$$20. \frac{1}{3} r\pi (r + h) + 2rh. \quad 21. \alpha : (360^\circ - \alpha) = 2 : 7.$$

22. Setze $a+b+c+d=2s$; $\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}=F$,
 $\sqrt{(ac+bd)(ad+bc)(ab+cd)}:4F=r$, so ist
 $O=2r\pi h+r^2\pi-2F\cdot\frac{r_1^2}{r^2}+2s\cdot\frac{r_1}{r}\cdot h$.

§. 17.

1. $RS\pi$; α) 788,1; β) 320.
2. $R\pi\sqrt{H^2+R^2}=10$.
3. $S\pi\sqrt{S^2-H^2}=15S\pi=5325$.
4. $R\pi(R+S)=411,8$.
5. $R\pi(R+\sqrt{R^2+H^2})=1999,91$.
6. $(S\sqrt{S^2-H^2}+S^2-H^2)\pi=500$. 7. $M:S\pi=75$.
8. $M:R\pi=36,5$. 9. $\frac{1}{R\pi}\sqrt{M^2-R^4\pi^2}=22,1$.
10. $\sqrt{-\frac{1}{4}H^2+\sqrt{\frac{1}{4}H^4+\frac{M^2}{\pi^2}}}=12,003$.
11. $\sqrt{\frac{1}{4}H^2+\sqrt{\frac{1}{4}H^4+\frac{M^2}{\pi^2}}}=289$.
12. $\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{4O}{\pi}+S^2}-S\right)=29$. 13. $\frac{O}{R\pi}-R=17,6$.
14. $\sqrt{\frac{O}{\pi}\left(\frac{O}{R\pi}-2\right)}=2,47$.
15. $\sqrt{\left[\frac{1}{4}S^2-\frac{O}{\pi}+S\sqrt{\frac{1}{4}S^2+\frac{O}{\pi}}\right]}=2,31$.
16. $\frac{O}{\pi}:\sqrt{\frac{2O}{\pi}+H^2}=6,25014$.
17. $\left(\frac{O}{\pi}+H^2\right):\sqrt{H^2+\frac{2O}{\pi}}=47,241$.
18. $R=\sqrt{\frac{O-M}{\pi}}=3,8$; $S=\frac{M}{\sqrt{(O-M)\pi}}=4,61(4,6099)$;
 $H=\sqrt{S^2-R^2}=2,61$.
19. $\frac{H^2s\pi}{h^2}\sqrt{s^2-h^2}=1400$. 20. $\frac{R^2s\pi}{R-r}=600(599,99)$.
21. $\frac{R^2s\pi}{\sqrt{s^2-h^2}}=801,68$. 22. $\frac{R^2\pi}{R-r}\sqrt{(R-r)^2+h^2}=420$.
23. $\frac{H^2r\pi}{(H-h)^2}\sqrt{(H-h)^2+r^2}=710$.

$$24. \frac{(r + \sqrt{s^2 - h^2})^2}{\sqrt{s^2 - h^2}} \cdot h = 400. \quad 25. \frac{S^2 r \pi}{S - s} = 615.$$

$$26. \frac{S^2 \pi}{s} \sqrt{s^2 - h^2} = 304 (303,99).$$

$$27. \frac{h}{s} \sqrt{\frac{Ms}{\pi \sqrt{s^2 - h^2}}} = 13,11.$$

$$28. sH : \sqrt{\frac{1}{2} H^2 + \sqrt{\frac{1}{4} H^4 + \frac{M^2}{\pi^2}}} = 8,5.$$

$$29. \frac{h}{H} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} H^2 + \sqrt{\frac{1}{4} H^4 + \frac{M^2}{\pi^2}}} = 303.$$

$$30. M(R - r) : R^2 \pi = 1045,5.$$

$$31. R(M - Rs\pi) : M = 8,349.$$

$$32. \frac{M \pm \sqrt{M^2 - 4Mr s \pi}}{2s\pi} = 44 \text{ oder } 11.$$

$$33. \sqrt{\frac{M \sqrt{s^2 - h^2}}{s\pi}} = 119,1.$$

$$34. Mh : \sqrt{M^2 - R^4 \pi^2} = 462 \frac{8}{11}.$$

$$35. s \sqrt{M^2 - R^4 \pi^2} : M = 666.$$

$$36. \frac{R - r}{R} \cdot \sqrt{\frac{M^2}{R^2 \pi^2} - R^2} = \frac{316,8}{396} \cdot \sqrt{404^2 - 396^2} \\ = \frac{316,8}{396} \cdot 80 = 64.$$

$$37. S = M : R\pi = 261,2; H = \sqrt{S^2 - R^2} = 126; \\ R \cdot (H - h) : H = 114,4.$$

$$38. R = \sqrt{\left[-\frac{1}{2} H^2 + \sqrt{\frac{1}{4} H^4 + \frac{M^2}{\pi^2}}\right]} = 43,68; \\ H(R - r) : R = 2,7133 \dots$$

$$39. R \text{ wie vorher} = 4,6; R(H - h) : H = 4 \frac{2}{11}.$$

$$40. R^2 = M \sqrt{s^2 - h^2} : s\pi; \\ R - \sqrt{s^2 - h^2} = 250,8 - 83,6 = 167,2.$$

$$41. R = \frac{M \pm \sqrt{M^2 - 4Mr s \pi}}{2s\pi} = 40,48; (404,8); \\ \sqrt{s^2 - (R - r)^2} = 10,26.$$

$$42. \frac{S - s}{S} \cdot \frac{M}{s\pi} = \frac{S - s}{S} \cdot 3 = 1.$$

$$43. R = M : S\pi = 8; s = S \cdot (R - r) : R = 19,23.$$

$$44. R \text{ (wie 41)} = 9 \text{ oder } 4,5; S = s \cdot R : (R - r) = 4,9075 \text{ oder } 9,915.$$

$$45. S^2 = Ms : \pi \sqrt{s^2 - h^2} = Ms : 6\pi; S = 17,224.$$

$$46. R = M : S\pi = 21; h = s \cdot \sqrt{S^2 - R^2} : S = 16,835s : S = 12,025.$$

$$47. R = M : S\pi = 14; s = S \cdot h : \sqrt{S^2 - R^2} = S \cdot h : 8,58 = 8,21.$$

$$48. O_1 = \pi(R^2 + r^2 + Rs + rs); R = rS : (S - s) = 7,9(002); O_1 = 500(,02).$$

$$49. R = \sqrt{s^2 - h^2} + r = 8,0025; O_1 = 697,1.$$

$$50. r = \sqrt{s^2 - h^2} = 110; O_1 = 200000.$$

$$51. s = S \cdot (R - r) : R = 201,686 \cdot 2,3 : 35; O_1 = 2000.$$

$$52. R = Hr : (H - h) = 27,0006; s^2 = h^2 + (R - r)^2; O_1 = 1000.$$

$$53. \frac{O_1}{\pi} \cdot (S - s)^2 = r^2 [S^2 + (S - s)^2] + rs(S - s)(S + S - s);$$

$$\frac{O_1}{\pi} = 1,13; r = 0,5.$$

$$54. R^2 + Rs = \frac{O_1}{\pi} - r(r + s); S = \frac{sR}{R - r} = 7,8.$$

$$55. s^3 - 13s^2 + 36s - 24 = 0; 1 \text{ oder } 6 \pm \sqrt{12}.$$

$$56. \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{2O_1}{\pi} + h^2} - s - \sqrt{s^2 - h^2} \right] = 0,55643.$$

$$57. R = \sqrt{\left[\frac{O_1}{\pi} - r^2 - rs + \frac{s^2}{4} \right]} - \frac{s}{2};$$

$$h = \sqrt{s^2 - (R - r)^2} = 7,922.$$

$$58. \frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{2O_1}{\pi} + h^2} - s + \sqrt{s^2 - h^2} \right] = 6; (5,9999).$$

$$59. \text{Suche } r, \text{ dann } h = \sqrt{s^2 - (R - r)^2} = 0,156.$$

$$60. s = \left(\frac{O_1}{\pi} - R^2 - r^2 \right) : (R + r) = 1,6;$$

$$S = s \cdot R : (R - r) = 8,2.$$

$$61. r^2 = R \cdot (R^2 + RS - \frac{O_1}{\pi}) : (S - R); r = 1,4.$$

$$62. R^3 + R^2 \cdot S - R \cdot \left(\frac{O_1}{\pi} - r^2 \right) - r^2 S = 0; R = 3.$$

$$63. 2r^2\pi + \frac{R^2 - r^2}{R^2} \cdot O = 142.$$

$$64. S = \left(\frac{O}{\pi} - R^2 \right) : R = 80,408;$$

$$r = R \cdot (S - s) : S = 45,201; O_1 = 39532.$$

$$65. R = 1,469; O_1 = 35,5.$$

$$67. \frac{1}{2}h\sqrt{2}. \quad 68. r = -\frac{1}{6}b + \sqrt{\frac{a}{3\pi} + \frac{b^2}{36}} = 3,455; s = 13,910.$$

$$69. p^2\sqrt{2} : 4\pi.$$

$$70. r = \frac{s}{4} + \sqrt{\frac{d}{2\pi} + \frac{s^2}{16}} = 2; S = s - r = 18.$$

$$71. s = 2h. \quad 72. h^2\pi = 207. \quad 73. 2 : 1.$$

$$74. \frac{1}{2}a\pi\sqrt{2h^2 + a^2} = 100.$$

$$75. \frac{1}{2}a\pi(\sqrt{2} + 1) \cdot [a(\sqrt{2} + 1) + \sqrt{4h^2 + a^2(3 + 2\sqrt{2})}].$$

$$76. \frac{h^2 d \pi}{2(h-d)} = 37,654.$$

$$77. 2h : \sqrt{r^2 + h^2}; r\pi(2h + r + \sqrt{r^2 + h^2}).$$

$$78. 2r\pi(h + r\sqrt{2}) = 500.$$

$$79. \text{Es ist } h = 1\frac{1}{3}r.$$

$$80. \text{Die Höhe des Cylinders ist gleich } \frac{1}{2}h \pm \sqrt{\frac{1}{4}h^2 - \frac{1}{6}s h}.$$

$$81. n\pi a : \sqrt{81 - 3n^2\pi^2} = 18,31.$$

$$82. (R^2 - r^2)\pi\sqrt{2} = 1244.$$

$$83. x^2 = \frac{rs\pi - a}{2rs\pi} \cdot h^2; x = 13,6.$$

$$84. \frac{\pi}{36} [u^2 + 12h^2 + u\sqrt{u^2 - 12h^2}] = 4011,5.$$

$$85. \sqrt{\frac{M - (b-a)^2}{\pi(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}} = 4.$$

$$86. a) r\pi \left[r \left(\frac{m}{n} + 1 \right) + \left(\sqrt{\frac{m}{n}} + 1 \right) W \right] = 818,72;$$

$$W = \sqrt{h^2 + r^2 \left(\sqrt{\frac{m}{n}} - 1 \right)^2}.$$

$$b) r\pi \left[r \left(\frac{m}{n} - 1 \right) + 2h + \left(\sqrt{\frac{m}{n}} + 1 \right) W \right] = 931,45;$$

$$W = \sqrt{h^2 + r^2 \left(\sqrt{\frac{m}{n}} - 1 \right)^2}.$$

$$87. M_1 = M_2 = \frac{1}{2}(R + r)s\pi = 1000.$$

$$88. \frac{1}{2}(P + p)s = 252. \quad 89. 2F\pi.$$

$$90. s^2 \pi : \sqrt{3 \sin \alpha^2 + 1}. \quad 91. a^2 \pi \sqrt{2} = 100.$$

$$92. 4a^2 \sqrt{2} \pi = 20. \quad 93. 30^\circ.$$

§. 18.

$$1. 4r^2 \pi. \quad \alpha) 2000. \quad \beta) 5000. \quad \gamma) 2500_{,06}. \quad \delta) 3400_{,07}.$$

$$2. \frac{1}{2} \sqrt{\frac{0}{\pi}}; \quad \alpha) 2; \quad \beta) 4,5_{0005}. \quad 3. \left(\frac{u^2}{\pi^2} + 4p^2 \right) \pi = 1412_{,03}.$$

$$4. a) 9281800; \quad b) 9079200. \quad 5. 56,16 \text{ Mark.}$$

$$6. \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_4^2} = 421.$$

$$7. 16 r^2 \pi. \quad 8. \frac{1}{15} a^2 \pi \sqrt{3} = 2443,6.$$

$$9. a^2 \pi = 2. \quad 10. 3a^2 \pi = 1100.$$

$$11. \frac{1}{4} A \pi \sqrt{3} = 142. \quad 12. 1 : 3 : 9.$$

$$13. \alpha) 2 : 3 : 6; \quad \beta) 1 : 2 : 3. \quad 14. \frac{a \sqrt{2}}{\sqrt{\pi} + 1} = a (2 - \sqrt{2}).$$

$$15. s = \sqrt{h^2 + r^2} = 8,81; \quad O = \frac{4r^2 \pi (s-r)^2}{h^2} = 70,086.$$

$$16. \frac{1}{8} \pi u (u \pm \sqrt{8d^2 - u^2}) = 2052,7 \text{ oder } 1247,3.$$

$$17. 3 : 2. \quad 18. a) 2 \sqrt{3} : 3; \quad b) 1 : 2 : 3.$$

$$19. \frac{2}{3} O \sqrt{3} = 22.$$

$$20. \sqrt{4+2\sqrt{2}} \cdot (\sqrt{2}+1) : [(\sqrt{2}+1)^2 + \frac{1}{2}] = 2\sqrt{52+14\sqrt{2}} : 17$$

$$21. \frac{1}{4} \varrho \sqrt{2} \text{ oder } \frac{1}{4} \varrho \sqrt{3}.$$

$$23. 2h\pi(h \pm p); \quad \alpha) 200 \text{ oder } 75,353; \quad \beta) 30.$$

$$24. 2r\pi(r \pm p); \quad \alpha) 400 \text{ oder } 3523,6; \quad \beta) 700 \text{ oder } 6069,6.$$

$$25. r = \sqrt{p^2 + \varrho^2}; \quad M = 2r\pi(r \pm p); \quad \alpha) 49,989 \text{ oder } 22745; \\ \beta) 600 \text{ oder } 6561,9.$$

$$26. h \sqrt{O\pi} = 900.$$

$$27. h = F : 2r\pi; \quad x = rh : (r - h); \quad \alpha) 35,12; \quad \beta) 2,1349.$$

$$28. \frac{2ar^2\pi}{a+r} = 20. \quad 29. 3r. \quad 30. \frac{2r(n-1)}{\pi} = 16.$$

$$31. b : 2h\pi = 30 : \pi = 9,5492. \quad 32. \frac{\pi h}{2(m-n)}.$$

$$33. \sqrt{2q(q \pm \sqrt{q^2 - p^2})} : p = \sqrt{50} : 7 \text{ oder } \sqrt{50} : 1.$$

$$34. (m - n) : m. \quad 35. \frac{4}{5} r. \quad 36. \frac{2}{3} r (3 - \sqrt{3}).$$

$$37. x = \frac{ar}{R-r} = 5,2; O = \frac{2r^2\pi}{a}(a-R+r) = \frac{4}{3}\pi = 15,4664.$$

$$38. 2R\pi[\sqrt{R^2 - r_2^2} \pm \sqrt{R^2 - r_1^2}] = 47375 \text{ oder } 1633,6.$$

39. Heisse Zone ungefähr 3670300, jede gemässigte 2427700, jede kalte 378240 Quadratmeilen.

40. Der Abstand des Schnittes vom Mittelpunkt der Halbkugel ist gleich a) $\frac{1}{2}r$, b) $\frac{1}{4}r$.

$$41. 1 : 4. \quad 42. 5 : 13.$$

$$43. 1 : \cos \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_2) \text{ oder } 1 : \sin \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2).$$

$$44. [2R^2 - p(p+q)] : 2(R^2 - p^2).$$

$$45. \frac{\alpha r^2 \pi}{90^\circ} = \frac{2}{3}r^2\pi = 2.$$

$$46. a) 0,1813r^2; b) 0,18593r^2; c) 0,9678r^2.$$

$$48. \frac{Oe}{360^\circ}. \quad 49. \frac{F}{r^2\pi} \cdot 180^\circ = 3''. \quad 50. \frac{1}{2}e.$$

$$51. e_1 : e_2 = r_2^2 : r_1^2. \quad 53. \frac{4F \cdot 180^\circ}{e} = 21600 \square''.$$

$$54. \sin \frac{1}{2}\alpha = \sqrt{\frac{3h^2 + a^2}{12h^2 + a^2}}; F = \frac{r^2\pi}{60^\circ}(\alpha - 60^\circ) = 194,28.$$

$$55. 3201,23. \quad 57. (11 + 3\sqrt{5} - \sqrt{150 + 66\sqrt{5}}) : 4.$$

$$58. 85^\circ 53' 10''. \quad 59. 106^\circ 15' 39''.$$

$$60. 4O : (\sin \alpha - 2\cos \alpha + 2). \quad 61. \frac{1}{4}r\sqrt{22} = 5,5.$$

$$62. 4(\sqrt{3}+1):8(\sqrt{2}+1):2\pi(\sqrt{2}+1):8\pi:[3+\sqrt{7+4\sqrt{2}}]\pi:6\pi.$$

$$63. (n^2 - 1) : n^2.$$

$$64. \pi(R+r-s)\sqrt{(R-r+s)(r-R+s)}; \\ (R+r-s) : \sqrt{s^2 - (R-r)^2}.$$

$$65. \frac{s^2\pi}{h^2}(s^2 + 2h^2 \pm 2sh) = 76030 \text{ oder } 22973.$$

$$66. \cos \varphi = \frac{1}{3}; \varphi = 70^\circ 31' 43'', 3; \frac{1}{2}r\sqrt{6}, \text{ wenn } r \text{ der Radius der kleineren Grundfläche ist.}$$

§. 19.

$$1. a) 64; b) 729; c) 15625; d) 13,824; e) 0,000027.$$

$$2. \alpha) 3,6; \beta) 1. \quad 3. 56,7. \quad 4. abc : a_1b_1c_1 = 2400.$$

$$5. 403,2 \text{ Pfund.} \quad 6. 564. \quad 7. 1\frac{3}{4} = 1,968.$$

$$8. a) 215667 \text{ M.}; b) 7541,28 \text{ M.}$$

9. a) $\frac{0}{6} \sqrt{\frac{0}{6}} = 1,728$; b) $\frac{1}{3} a^3 \sqrt{3} = 1539,6$;
 c) $\frac{1}{8} u^3 (5 \sqrt{2} - 7) = 1000$; d) $F \sqrt{F} : \sqrt[3]{8} = 0,216$.
10. $6 \sqrt[3]{V^2} = 24 \square^m$. 11. $\sqrt[3]{V} \cdot \sqrt{3} = 10$. 12. 8 mal.
13. $\sqrt[3]{a^3 + b^3 + c^3} = 0,6$.
14. $\frac{1}{2} \left(b + \sqrt{\frac{4a-b^2}{3b}} \right) = 2,3$; $\frac{1}{2} \left(b - \sqrt{\frac{4a-b^2}{3b}} \right) = 1,2$.
15. $\sqrt{\frac{0}{6}} \cdot \frac{a}{\sqrt[3]{a^2 + b^2}} = 2,5$; $\sqrt{\frac{0}{6}} \cdot \frac{b}{\sqrt[3]{a^2 + b^2}} = 1,5$.
16. $\sqrt{\frac{4b-a^2}{12a}} + \frac{a}{2} = 7,2$ und $7,5$. 17. $\sqrt[3]{bhl}$.
18. $abf + ace + bcd = A = 84$; $ae f + bdf + cde = B = 84$;
 $g - def = C = 2520$; $\sqrt{4AC + B^2} = D = 924$;
 $(D - B) : 2A = E = 5$; $x = aE = 10$; $y = bE = 15$;
 $z = cE = 20$.
19. 6 und 2 Decimeter. 20. $\frac{f^3 ab}{a^2 + b^2} = 23957,5$.
21. 16, 13, 10. 22. $3 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4} = 2,25$.
23. Sie ist das Doppelte des Inhalts des ersten Prismas.
24. Die Kanten sind bez. gleich c , $\frac{1}{2}(s - c \pm \sqrt{s^2 - 2cs - 3c^2})$.
25. $\frac{1}{2} abc = 167,5$ Cubm.
26. $\frac{35}{2} (a + b) \cdot cd \text{ Pf.} = 840 \text{ Pf.}$
27. $\frac{3}{2} a^2 b \sqrt{3} = 1500$. 28. $2a^2 b (\sqrt{2} + 1) = 448$.
29. $\frac{1}{4} a^3 \sqrt{3} = 1000$. 30. $12 \sqrt[3]{3} : 16 : 5 \sqrt[3]{10} + 2 \sqrt[3]{5}$.
31. $19 \frac{8}{15} = 19,533 \dots \square^{cm}$.
33. $a + b + c + d = 2s = 30$;
 $F = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)} = 48$;
 $r = \sqrt{(ac+bd)(ad+bc)(ab+cd)} : 4F = \frac{1}{2} \sqrt{130}$;
 $h = \frac{mr}{2n} = 1 \frac{3}{4}$; $Fh = 156$.
34. $Fh \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{m}{m+n}} \right) = \frac{1}{3} hF = 208$.
35. Nach den entsprechenden Formeln für 33 berechne:
 $F=30$; $r=\frac{1}{6}\sqrt{1105}$; $h=\frac{V}{F}=8$, $R=\sqrt{r^2+\frac{1}{4}h^2}=6\frac{5}{6}$.

36. $\frac{1}{2} a^3 (27 \sqrt{2} - 22 \sqrt{3}) = 0,039323 a^3 = 17461.$
 37. $a^2 = 0 : 2 \sqrt{3}; V = 2 a^3 (5 \sqrt{2} - 7) = 23,5.$
 38. $2 a r^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \sin \varphi = 293,003.$
 39. $\frac{1}{4} a^2 s \sqrt{4 (\sin \beta^2 - \cos \alpha^2 + \cos \alpha \cdot \cos \beta) - 1} = 21350.$
 40. $\frac{u^3 \sin 2\alpha}{128 \cos \frac{1}{2} \alpha^6 \cos \beta} \sqrt{\sin (\beta + \alpha) \sin (\beta - \alpha)} = 35393.$
 41. $\frac{1}{2} \sin \alpha \sqrt{F^3 \cos \alpha} = 188,6;$
 $\frac{1}{2} \sqrt{F^3 \cos \alpha} (2 \cos \alpha - \sin \alpha) = 260,92.$
 42. $abc \sqrt{1 - \cos \alpha^2 - \cos \beta^2 - \cos \gamma^2 + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}.$
 43. $\frac{abc}{\sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma} [1 - \cos \alpha^2 - \cos \beta^2 - \cos \gamma^2 - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma].$
 44. $\frac{2}{3} a^3 \sqrt{2,2}.$
 45. $\frac{1}{4} d \sqrt{12 f^2 - d^4}$ oder $f^2 \sqrt{3 d^4 - 4 f^2 : d^3}.$ 46. $29^\circ 37' 34''.$
 47. $s \sin \varphi \left\{ \frac{1}{2} ab \sin \alpha + \right.$
 $\left. \frac{1}{4} \sqrt{[(c+d)^2 - (a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha)] [(a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha) - (c-d)^2]} \right\}$
 $= 1000.$

§. 20.

1. $\frac{1}{3} abh; \alpha) 1260; \beta) 0,368212; \gamma) 25,5.$
 2. $\frac{1}{3} F \sqrt{a^2 - \frac{1}{4} F}; \alpha) 480; \beta) 40,656; \gamma) 105,11; \delta) \frac{1}{3} F^{\frac{3}{2}}.$
 3. Ungefähr 2427780.
 4. $\frac{1}{3} ab \sqrt{c^2 - a^2} = 23,87.$
 5. 6,975 Thlr. = 20,87 M. 6. $\frac{3}{160} = 0,01875.$
 7. $\frac{1}{2} a^2 \sqrt{3(b^2 - a^2)}; \alpha) 30492; \beta) 117612; \gamma) 1,9965.$
 8. $\frac{1}{3} a F \sqrt{2} = 1000.$ 9. $r^3 \sqrt{429}.$
 10. $\alpha) 9520; \beta) 2016; \gamma) 0,1393.$
 11. $3 V : h = 52,5.$ 12. $2^m.$ 13. $\frac{5}{8} a^3.$
 14. $\frac{1}{3} F(r \pm \sqrt{r^2 - \frac{1}{4} F}) = 170\frac{2}{3}$ oder $682\frac{2}{3}$ Cubem.
 15. $\frac{1}{8} r^3 \cdot \frac{m^4 n^2}{(m^2 + n^2)^3} = \frac{9}{16}.$
 16. $V_1 = \frac{a^2}{216} \sqrt{3b^2 - a^2} = 23,0942; V_2 = 17 V_1 = 392,6.$
 17. $x : b = \sqrt[3]{6} : 2; x = 3, b - x = 0,30192.$
 18. Nach dem goldenen Schnitt.

$$19. 3\sqrt{5} : (4\sqrt{22} - 3\sqrt{5}). \quad 22. a^3\sqrt{3}.$$

$$23. O = \frac{1}{4}b(\sqrt{4a^2 - b^2} + \sqrt{4c^2 - b^2}) + a\sqrt{c^2 - a^2} = 10342,4;$$

$$V = \frac{1}{12}b\sqrt{(4a^2 - b^2)(c^2 - a^2)} = 44431.$$

$$24. \sqrt[3]{\frac{2}{3}}V = 2. \quad 25. 4V : 3h = 30. \quad 26. \frac{1}{4}a.$$

$$27. 27 : 8 : 72. \quad 28. 1 : 12.$$

$$29. \frac{5}{8}a^2b\sqrt{5} + 2\sqrt{5}. \quad 30. 2a.$$

$$31. h = \frac{1}{2}a = 3^m; V = \frac{1}{6}a(a+b)(a+2b) = 37,0872 \text{ Cubm.},$$

$$d = \frac{3ab + 2b^2}{2a} = 9,06^{\text{cm}}.$$

$$32. \frac{1}{108}hu^2 \cotg 20^\circ = 456,01.$$

$$33. \frac{1}{6}bcs\sqrt{1 - \cos\alpha^2 - \cos\delta^2 - \cos\varepsilon^2 + 2\cos\alpha \cdot \cos\delta \cdot \cos\varepsilon}.$$

$$34. d = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma} = 138;$$

$$p + q + d = 2s = 384;$$

$$\sqrt{s(s-p)(s-q)(s-d)} = f = 6624;$$

$$h = 2F : d = 96; V = \frac{1}{3}gh = \frac{2ab \sin\gamma \cdot F}{3d} = 139104.$$

$$35. \frac{1}{24}na^3 \cdot \cotg\left(\frac{180^\circ}{n}\right) \cdot \tan\alpha = 905.$$

$$36. \frac{1}{12}c^2l \cdot \sin 2\alpha \cdot \sin\varphi = 920.$$

$$37. a = \sqrt[3]{3\sqrt{2}V \cotg\alpha} = 4,641;$$

$$s = \frac{a\sqrt{2}}{2\cos\alpha} = \sqrt[3]{\frac{3V}{\sin 2\alpha \cdot \cos\alpha}} = 8,820.$$

$$38. a \pm b = \sqrt{4s^2 \cos\alpha^2 \pm \frac{6V}{s \cdot \sin\alpha}}; a = 3,0002,$$

$$b = 2; (1,9999).$$

$$39. \tan\varphi = 24V \cdot \sin\frac{180^\circ}{n} : na^3 \cdot \cotg\frac{180^\circ}{n}.$$

$$40. \frac{2}{16}R^3\sqrt{3} = 36\sqrt{3}; \tan\varphi = 2; \varphi = 63^\circ 26', 1.$$

$$41. V = \frac{1}{3}a^3; O = a^2(\sqrt{5} + 1); \text{Winkel an den Grund-}$$

$$\text{kanten: } \tan\alpha = 2; \alpha = 63^\circ 26' 5'', 7; \text{Winkel an den}$$

$$\text{Seitenkanten: } \sin\frac{1}{2}\beta = \frac{1}{10}\sqrt{15}; \beta = 45^\circ 34' 22''.$$

$$42. V = \frac{1}{3}a^3; O = a^2(\sqrt{2} + 1); \alpha = 45^\circ; \sin\frac{1}{2}\beta = \frac{1}{4}\sqrt{3};$$

$$\beta = 51^\circ 19' 4''.$$

$$43. V = \frac{1}{3}a^3; O = a^2(2 + \sqrt{2}); \alpha = 90^\circ \text{ und } 45^\circ;$$

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 90^\circ; \beta_4 = 120^\circ.$$

44. $a = 2\sqrt[3]{k \cdot \cotg \alpha} = 2,82847 = \sqrt[3]{8};$
 $F = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4 \cos \alpha} = 6; O = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4 \cos \alpha} (1 + \cos \alpha + 2 \sin \alpha) = 9,26188;$
 $\varphi = \frac{a \sqrt{3}}{4 \cos \alpha} \tan \frac{1}{2} \alpha (1 + \cos \alpha - \sin \alpha) = 0,8355.$
45. $k = u : (p + q + r);$
 $a = pk = 20, b = qk = 48, c = rk = 52;$
 $s = \frac{1}{2} u = 60;$
 $F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 480;$
 $\varphi = F : s = 8; p = \sqrt{h^2 + r^2} = 10;$
 $V = \frac{1}{3} Fh = 960; O = F + ps = 1280;$
 $\tan \alpha = h : \varphi; \alpha = 36^\circ 52', 2.$

§. 21.

1. $\alpha) 1887; \beta) 135,9; \gamma) 0,0441.$
2. $\frac{1}{3} p \left(G \sqrt{\frac{G}{g}} - g \right); \alpha) 326403; \beta) 0,04965; \gamma) 3899,3136.$
3. $a + b + c = 2s = 16; G = 12; g = \frac{a^2}{a^2} G = 9,72;$
 $R = \frac{abc}{4G} = \frac{25}{8}, r = \frac{a'}{a} R = \frac{45}{16};$
 $h = \sqrt{d^2 - (R - r)^2} = \frac{3}{4}; V = 8,13.$
4. $V = \frac{1}{12} \sqrt{3} \cdot h \cdot (a^2 + ab + b^2) = 543;$
 $p = \frac{ah}{b-a} = 1,319657.$
5. $\frac{3V}{h} - \frac{1}{2} G - \sqrt{3G \left(\frac{V}{h} - \frac{1}{2} G \right)};$
 $\alpha) 129 - 72 \sqrt{3} = 4,294; \beta) 26,01.$
6. $\frac{vgVg}{GVG - gVg} = 3,743513.$
7. $u^2 : (U^2 + Uu + u^2) = M = \frac{1}{11}; a + b = \frac{1}{2} u;$
 $a - b = \sqrt{\frac{1}{4} u^2 - \frac{12VM}{h}} = 1; A = \frac{aU}{u}, B = \frac{bU}{u},$
 $a = 3, b = 2, A = 12, B = 8; c = \frac{1}{2} \sqrt{117}.$
8. $g = \frac{3V}{h} - \frac{1}{2} G - \sqrt{3G \left(\frac{V}{h} - \frac{G}{4} \right)} = 0,05;$
 $p = \frac{hVg}{VG - Vg} = 0,48; x = \frac{1}{3} gp = 0,008.$

9. $V = \frac{G^3 + Gg\sqrt{Gg}}{G^3 - g^3}.$
10. $G = \frac{1}{2} \left[S + \sqrt{\left(\frac{6V}{h} - S\right) \left(3S - \frac{6V}{h}\right)} \right] = 2,89;$
 $g = \frac{1}{2} \left[S - \sqrt{\left(\frac{6V}{h} - S\right) \left(3S - \frac{6V}{h}\right)} \right] = 1,69;$
 $p = \frac{h\sqrt{G}}{\sqrt{G} - \sqrt{g}} = 4,875; V_1 = \frac{1}{3} \frac{hG\sqrt{G}}{\sqrt{G} - \sqrt{g}} = 6,14125.$
11. $\frac{1}{2} \left(\frac{4V}{h} + d \right) \pm \sqrt{\frac{V^2}{h^2} - \frac{1}{12} d^2}$ und
 $\frac{1}{2} \left(\frac{4V}{h} - d \right) \pm \sqrt{\frac{V^2}{h^2} - \frac{1}{12} d^2}.$
12. $\sqrt{\frac{8p}{1000hs}} - \frac{3}{4} a^2 - \frac{1}{2} a = 1,05557.$
13. $9^{dc}, 16^{dc}, 303,1733 \square^{dc}.$
14. $\frac{1}{24} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} \cdot \sqrt{s^2 - (r-q)^2} \cdot (r^2 + r q + q^2) = 66,57401.$
15. $m^3 : (n^3 - m^3).$ 16. $1 : (\sqrt[3]{n} - 1) = 1 : 1.$
17. a) $\sqrt[3]{2} : 1,$ b) $1 : (\sqrt[3]{2} - 1).$
18. $\frac{1}{\frac{8}{V^2}} \cdot \sqrt{a^2 - \frac{1}{4} (b^2 + c^2)} = 2,00005.$
19. $\frac{h}{\frac{8}{V^3}} = 4,8536; h \cdot \frac{\sqrt[3]{2} - 1}{\frac{8}{V^3}} = 1,2615; h \cdot \frac{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}}{\frac{8}{V^3}} = 0,8849.$
20. $\frac{7a^2 + 4ab + b^2}{a^2 + 4ab + 7b^2} = \frac{247}{11}.$
21. $x = \sqrt[3]{\frac{1}{2}(a^3 + b^3)}; m : n = (x - b) : (a - x).$
22. $H - \frac{1}{2} h \pm \sqrt{\frac{H^2 V}{hG} - \frac{1}{12} h^2};$ 34.
23. $\frac{1}{147} r^2 h (10 - \sqrt{2}).$
24. $\frac{19}{162} a^2 \sqrt{b^2 - \frac{1}{2} a^2} = 67\frac{1}{2}.$ 25. $\frac{2}{3} h(R^2 + Rr + r^2).$
26. $r = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2} = 1,95; p = \frac{2r^2 h}{r^2 + h^2}; \log p = 0,26662;$
 $V = \frac{1}{3} p a b \left[1 - \frac{r^2 - h^2}{r^2 + h^2} + \left(\frac{r^2 - h^2}{r^2 + h^2} \right)^2 \right]$
 $= \frac{1}{3} \frac{p a b}{h^2} (3h^2 - 3hp + p^2) = 2,6023.$

27. $\frac{1}{11} a^3 \sqrt{38430 - 3510 \sqrt{5}}$.
 28. $\frac{1}{11} a^3 \sqrt{470 + 210 \sqrt{5}}$.
 29. $2 : 1$ oder $\sqrt{13} : 5$. 30. Sie sind gleichgross.
 31. $G = 21$; $g = a_1^2$. $G : a^2 = \frac{2}{3}$; $h = s \cdot \sin \varphi = 25$;
 $V = 217$.
 32. $\tan \alpha = \frac{3 \sqrt{V^2}}{a^3 - b^3} = \frac{2}{3} \sqrt{2}$; $\tan \beta = \frac{6 \sqrt{V}}{a^3 - b^3} = \frac{2}{3}$,
 $\alpha = 72^\circ 33' 13''$, $\beta = 77^\circ 28' 16''$.
 33. $G = \frac{2}{3} \sqrt{35}$, $g = \frac{49}{121} G$, $\alpha = 33^\circ 40'$.
 34. $G = 4,5 a^2 \cotg 10^\circ = 12,81$; $\varrho_1 = \frac{1}{2} a : \sin 10^\circ = 2,04$;
 $p = \sqrt{r^2 - \varrho_1^2} = 2,53$; $q = h - p = 3,23$;
 $\varrho_2 = \sqrt{r^2 - q^2} = 0,36$;
 $g = G \varrho_2^2 : \varrho_1^2 = \frac{6,57}{17}$; $V = 29,542$.
 35. $\frac{2}{3} r^3 \cdot \frac{3n^2 - 3n + 1}{n^3} \cdot \tan \varphi \cdot \sin 40^\circ = 1900$.

§. 22.

1. Tetraëder: $\frac{1}{11} a^3 \sqrt{2}$, Oktaëder: $\frac{1}{3} a^3 \sqrt{2}$, Ikosaëder:
 $\frac{5}{11} a^3 (3 + \sqrt{5})$, Hexaëder: a^3 , Dodekaëder: $\frac{1}{4} a^3 (15 + 7\sqrt{5})$.
 2. $1 : \sqrt{2}$. 3. $a^2 \sqrt[3]{3} = 100$. 4. $\frac{1}{8} h^3 \sqrt[3]{3} = 125$.
 5. $\frac{u^3 \sqrt{6}}{32 \pi^3} = 835$. 6. $\frac{1}{4} a^3$. 7. $\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{36 V^2} = 70,7$.
 8. $\frac{1}{6} a^3$. 9. $\sqrt{2} : \sqrt[3]{3}$. 10. $4r^3 \sqrt{3}$.
 11. $\frac{5}{3} a^3 \sqrt{2}$. 12. $9 : 64$. 13. $3 \sqrt[3]{4} - 2 = 2,7622$.
 14. $a \sqrt[3]{6 \sqrt{2} + 5} = 169$.
 15. — $h (\sqrt[3]{2} - 1)$, also auf der Höhe selbst, statt auf der
 Verlängerung.
 16. $1 : 27$.
 17. a) $\sqrt{3} : 9$; b) $\sqrt{3(125 + 58 \sqrt{5})} : 45$; c) $\sqrt{3} : 9$;
 d) $\sqrt{3(85 - 38 \sqrt{5})} : 45$.
 18. $\frac{2}{3} V \sqrt{3} = 384,9$. 19. $8r^3 \sqrt{3}$; $4r^3 \sqrt{3}$.
 20. $\frac{1}{3} r \sqrt[3]{2} = 2,65$. 21. $\frac{2}{31} r^3 \sqrt{2}$.

22. $121,5 \cdot a^3 = 36$. 23. $2r^3 \sqrt[3]{6}$.
 24. $27(5\sqrt{2} - 7) : 1$.
 25. Es ist ein regelmässiges Tetraëder, und die Volumina verhalten sich wie 1 : 4.
 26. $26 : 7$. 27. $1 : (\sqrt[3]{4} - \frac{1}{4}) : (\sqrt[3]{9} - \frac{1}{4}\sqrt[3]{4} + \frac{1}{4})$.
 28. $\frac{1}{27} a^3 \sqrt{2}$ und $\frac{5}{108} a^3 \sqrt{2}$. 29. $r \cdot \sqrt[3]{2}$.
 30. $(5 - \sqrt{5}) : 4$. 31. $48(\sqrt{5} - 2) : 5$.
 32. $\frac{5}{12} a^3 \sqrt[3]{108} \cdot (49 + 38\sqrt{5})$.
 33. $3(25 + 9\sqrt{5}) : 49$. 34. $3(5 - \sqrt{5}) : 10$.
 35. $(7\sqrt{5} + 15) : 6 = 5,108744 : 1$ oder $\frac{3\sqrt{5}-5}{6} \left(\frac{\sin 54^\circ}{\sin 18^\circ} \right)^3$.
 36. $\frac{2}{3} \sqrt{\frac{F^2}{3\sqrt{6}} (\sin \alpha + \sqrt{2} \cdot \cos \alpha)^3} = 64$.
 37. $\frac{1}{3} a^3 (\sqrt{2} + \tan \alpha) = 729$.
 38. $\tan \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha = 54^\circ 44' 7'', 8$.

§. 23.

1. a) 765; b) 999; c) 4,24. 2. $9\pi = 28,274334$.
 3. 64,34. 4. $u^2 h : 4\pi = 56,5$. 5. $b : a$.
 6. $h = V : r^2 \pi$; α) 3; β) 4; γ) $150^{mm}, 43$.
 7. $2\sqrt{\frac{V\pi}{h}} = 400$.
 8. $r = \sqrt[3]{\frac{nV}{2m\pi}} = 2,331$; $h = \frac{2m}{n} r = \sqrt[3]{\frac{4m^2 V}{n^2 \pi}} = 2,797$.
 9. $AB : \pi \delta \varepsilon : \left(2\sqrt{\frac{A}{\pi \delta}} - \varepsilon \right) = 192$.
 10. $r(2h - r) : h = 4,8$. 11. $r : h = 3 : 2$, $x = r : \sqrt{3}$.
 12. $r : h = 1 : 2$, $x = r\sqrt{3}$. 13. $(R+r)(R-r)\pi h = 800$.
 14. $R - \sqrt{R^2 - \frac{V}{\pi h}} = 2$.
 15. $r = \frac{2V}{M} = 2$, $h = \frac{M^2}{4V\pi} = 3$.
 16. $\frac{M}{4} \sqrt{\frac{nM}{m\pi}} = 100$.

$$17. (2m + n) \sqrt[3]{\frac{2V^2\pi}{m^2n}} = 64\pi = 201,0619.$$

$$18. \frac{O-M}{2} \cdot \frac{M}{\sqrt{2(O-M)\pi}} = 1000. \quad 19. 4^m.$$

$$20. V + 2\sqrt{V V_1} + V_1 = 2,43. \quad 21. F = \frac{a^2}{2\pi}, \quad V = \frac{a^2 V_2}{16\pi}.$$

$$22. r \sqrt{\frac{2}{1109}} = 5,63. \quad 23. 232,973 \text{ Kgr.}$$

$$24. \frac{1}{2}d - \sqrt{\frac{1}{4}d^2 - \frac{p}{1000\pi \cdot as}} = 0^m,00355;$$

$$250ad^2\pi - \frac{p}{s} = 520,14 \text{ Kgr.}$$

$$25. (a^2 - \frac{1}{4}d^2\pi)h = 400.$$

$$26. 12\sqrt{101} : 5\sqrt{577} : 13;$$

$$(48\sqrt{101} + 101) : (20\sqrt{577} + 577) : 728;$$

$$1212 : 2885 : 338.$$

$$27. \frac{a^3 V_2}{12r^2\pi} = 0,29307. \quad 28. \frac{3}{4}r^3\pi.$$

$$29. 2r^3\pi \sqrt{2 \cdot \frac{m+n \pm \sqrt{m^2+2mn-4n^2}}{5m}}.$$

$$\frac{(4n-m) \pm \sqrt{m^2+2mn-4n^2}}{5m} = 783,12.$$

$$30. 1 : 6. \quad 31. 16 : 27. \quad 32. 4 : 3.$$

$$33. (\text{Vergl. §. 19, 33.}) F = 216; r^2 = \frac{468 \cdot 582 \cdot 432}{16F^2}, \quad V = 4304\frac{3}{4}.$$

$$34. G = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 330;$$

$$r = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}} = 6,6; h = K : G; V = 100.$$

$$35. r^2 h \left(\frac{\pi}{6} - \frac{V_3}{4} \right) = 36,609; r^2 h \left(\frac{5\pi}{6} + \frac{V_3}{4} \right) = 1233,03.$$

$$36. \frac{1}{8}F \sqrt{\frac{1}{2}F\pi} = 1,5.$$

$$37. a^2\pi; a^2(2\pi - \sqrt{3}); \frac{1}{2}a^3(\pi - \sqrt{3}).$$

$$38. \frac{1}{2}(S + s)r^2\pi = 295. \quad 39. 6ar^2\pi.$$

$$40. ar^2\pi \cdot \sin \alpha = 214. \quad 41. a \sin \alpha \sqrt[3]{4 : \pi} = 1,35.$$

$$42. a \sqrt{\frac{h \sin \alpha}{s\pi \sin \beta}}. \quad 43. f^2\pi : 4a \sin \alpha = 105 (104,998).$$

44. $\cos \varphi = d : r = \cos 40^\circ$;
 $r h \left(\frac{r \pi \varphi}{180^\circ} - d \sin \varphi \right) = 48000 \text{ (47998).}$
45. $\frac{V \pi}{2 \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma} = 2,21.$
46. Cylinder: $2 r^3 \pi \cdot \frac{\sin \beta \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha} = 75760$;
 Prisma: $4 r^3 \sin \beta^2 \sin \gamma^2 = 27640.$
47. $\frac{V}{2 \pi} \cdot n \cdot \sin \frac{360^\circ}{n} = 79.$ 48. $\tan \alpha = \frac{q}{p+q} \cdot \frac{h}{r}$; $\alpha = 45^\circ.$
49. $\frac{a d \alpha \pi}{360^\circ} \left(d + \frac{c^2 + \frac{1}{4} b^2}{c} \right) = 71$; $\sin \alpha = \frac{4 b c}{b^2 + 4 c^2}.$

§. 24.

1. $\alpha) 235,62$; $\beta) 1,5928$; $\gamma) 2537940.$
2. $\sqrt[3]{3 V : \pi h} = 3.$ 3. $3 V : r^2 \pi = 22,6.$
4. 1 Thlr. 17 Sgr. 7 Pf.
5. $\frac{1}{3} r^2 \pi \sqrt{s^2 - r^2}.$ $\alpha) 15394$; $\beta) 28,743$; $\gamma) 32.$
6. $\frac{1}{3} \pi h (s^2 - h^2) = 700.$ 7. $\sqrt{r^2 + \frac{9 V^2}{r^4 \pi^2}} = 7,45.$
8. $\frac{1}{3} r \sqrt{M^2 - r^4 \pi^2}$; $\alpha) 247,537$; $\beta) 0,24618.$
9. $\frac{M^2}{3 s^2 \pi} \sqrt{s^2 - \frac{M^2}{s^2 \pi^2}} = 20.$
10. $\frac{1}{3} \pi h \left(\sqrt{\frac{M^2}{\pi^2} + \frac{h^4}{4}} - \frac{h^2}{2} \right) = 91,292.$
11. $\sqrt{r^6 \pi^2 + 9 V^2} : r = 185.$
12. $\sqrt[3]{3 V (3 V + \pi h^3)} : h = 89,46.$
13. $\frac{1}{3} r \sqrt{O^2 - 2 O r^2 \pi} = 2.$
14. $\frac{\pi}{3} \left[\frac{O}{\pi} + \frac{s^2}{2} - s \sqrt{\frac{O}{\pi} + \frac{s^2}{4}} \right].$
 $\sqrt{\frac{s^2}{2} - \frac{O}{\pi} + s \sqrt{\frac{O}{\pi} + \frac{s^2}{4}}} = 9509.$
15. $\frac{1}{3} \frac{O^2 h}{2 O + h^2 \pi} = 111.$
16. $\sqrt[3]{\frac{3 V \pi}{h}} \left(\sqrt[3]{\frac{3 V}{\pi h} + h^2} + \sqrt[3]{\frac{3 V}{\pi h}} \right) = 2099,43.$
17. $\frac{1}{3} r^3 \pi \sqrt[3]{3} = 3500.$ 18. $\frac{1}{3} F \sqrt[3]{f \pi} = 50.$
19. $\frac{1}{3} a \pi \sqrt[3]{\frac{1}{3} a \sqrt[3]{3}} = 26.$

20. $O = \frac{2}{3} r^2 \pi$; $V = \frac{2}{3} r^3 \pi$. 21. 0,9 h .
22. $r = \frac{1}{2} (\sqrt{2s^2 - d^2} - d) = 39$.
 $M = \frac{1}{2} s \pi (\sqrt{2s^2 - d^2} - d) = 10904,4$;
 $V = \frac{1}{12} \pi (s^2 - d^2) (\sqrt{2s^2 - d^2} - d) = 127421$.
23. $r = \sqrt{\frac{1}{4} \sigma^2 \pm \sqrt{\frac{1}{4} \sigma^4 - \frac{6K\sigma}{\pi}}} = 11,866$ oder 4,8;
 $h = \frac{1}{2\sigma} (\sigma^2 - r^2) = 0,9$ oder 5,5;
 $s = \frac{1}{2\sigma} (\sigma^2 + r^2) = 11,9$ oder 7,3;
 $M = \frac{r\pi}{2\sigma} (\sigma^2 + r^2) = 443,61$ oder 110,08;
 $O = \frac{r\pi}{2\sigma} (\sigma + r)^2 = 885,94$ oder 182,46.
24. $\frac{m h^2 \pi}{n^2} \sqrt{m^2 - n^2}$, $\frac{h^3 \pi}{3 n^2} (m^2 - n^2)$.
25. Beide wie $a : b$. 26. $2\sqrt{3} : 6 : 3$.
27. $r^6 - \frac{M^2}{\pi^2} r^2 + \frac{9V^2}{\pi^2} = 0$; $r = 1,5$, $h = 2$.
28. $\frac{M}{3n} \sqrt{\frac{n^2 - 1}{n\pi}} \cdot M$.
29. $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{\pi\sqrt{n^2 - 1}}} = 1$, $h = r\sqrt{n^2 - 1} = \sqrt{3} = 1,73205$;
 $s = nr = 2$.
30. $\frac{1}{3} m^2 h^3 \pi : (n^2 - m^2) = 1231,51$.
31. $\frac{97 \pm 20\sqrt{22}}{3}$ mal. 32. $9(R^2 + H^2) = R^2 \cdot H^2$.
33. $\frac{1}{162} a^3 \pi \sqrt{15} = 2250$. 34. $\frac{1}{3} \sqrt[3]{35 F^3 : \pi} = 100$.
35. $2\sqrt[3]{V : \pi \sqrt{11}} = 48$.
36. $\sqrt[3]{3V : (3V + h^3 \pi)} \cdot 360^0 = 45^0$.
37. $138^0 27' 41'', 54$. 38. $K - \frac{p\pi}{3q} \left(\sqrt[3]{\frac{3qK}{p\pi}} - b \right)^3 = 124$.
39. $R = \frac{1}{2} \left[\sqrt[3]{\frac{1}{3} \left(\frac{4V\sqrt{3}}{\pi d} - d^2 \right)} + d \right] = 4$;
 $r = \frac{1}{2} \left[\sqrt[3]{\frac{1}{3} \left(\frac{4V\sqrt{3}}{\pi d} - d^2 \right)} - d \right] = 3$.
40. $\sqrt[3]{6} : 2$. 41. $\sqrt[3]{18} : 3$.

42. $\frac{1}{2} r \sqrt{2}$; der Mantel wird ebenfalls halbt.

43. $r \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$. 44. $x^3 + h x^2 = h^3$.

45. $O = \pi \sqrt{s+r} \cdot (r \sqrt{s+r} + \varrho \sqrt{s-r}) = 87,9646$;
 $V = \pi \sqrt{s^2 - r^2} \cdot (\frac{1}{3} r^2 - \frac{1}{3} \varrho^2) = 31,4159$.

46. $\frac{3}{4} h$. 47. $\frac{R r \pi}{(R+r)^2} (r \sqrt{R^2 + h^2} + R \sqrt{r^2 + h^2})$; $\frac{R^2 r^2 h \pi}{3(R+r)^2}$.

48. $O = 9 \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3 a^2 : \pi}$; $V = 3 a \sqrt{3} : \pi$.

49. $\frac{1}{3} K \pi \sqrt{3} = 552$.

50. Nach den Formeln für §. 19, 33 ist $F = 27$,
 $r = \sqrt{41 : 481} : 32$, $V = 192,59$.

51. $\frac{1}{27} a^3 \pi \sqrt{6}$; $\frac{1}{108} a^3 \pi \sqrt{6}$; $4 : 1$. 52. $\sqrt[3]{3} \cdot \pi : 2$.

53. Die Volumina wie $1 : 7 : 12$, die Oberflächen wie $1 : 3$.
 Die des Doppelkegels für $r : h = \sqrt{15} : 1$, die des an
 deren Körpers für $r : h = \sqrt{7} : 3$. 54. $8 : 1$.

55. $O = \frac{1}{4} r^2 \pi (3 + 2 \sqrt{3}) = 3750080 \square \text{ Meilen}$,
 $V = \frac{1}{8} r^3 \pi = 249300000 \text{ Cub.-Ml.}$

56. $\frac{2\pi}{3} \cdot \frac{R r^4}{r^3 - R^3} = 96$.

57. $r = \sqrt[3]{\frac{3 n^3 K}{\pi (n+m) (n^2 - m^2)}} = 4,0966$;
 $\varrho = \frac{r}{n} \sqrt{n^2 - m^2} = 3,0535$.

58. $\frac{R^2 c \pi (c + R - r)}{(R - r) (c - R + r)}$; $\frac{\pi}{3} \cdot \frac{R^3 (c + R - r)^2}{(R - r) (c - R + r)}$.

59. $(2\pi - 3 \sqrt{3}) : (10\pi + 3 \sqrt{3}) = 108703 : 3661208$.

60. $\frac{1}{3} r^3 \pi \cotg \frac{1}{2} \alpha = 165$. 61. $\frac{1}{3} s^3 \pi \cdot \cos \beta^2 \cdot \sin \beta = 638$.

62. $S + s + 2r = \sigma$; $F = \sqrt{\sigma(\sigma - S)(\sigma - s)(\sigma - 2r)}$;
 $h = F : r$; $V = \frac{1}{3} r^2 \pi h$, oder
 $\cos \beta = (S^2 + 4r^2 - s^2) : 4rS$; $h = S \cdot \sin \beta$, etc.
 α) $F = 1020$; $h = 40$; $\cos \beta = \frac{2}{3}$; $\sin \beta = \frac{4}{3}$;
 $V = 27237,5$. β) $F = \frac{9}{50}$; $h = \frac{3}{10}$; $\cos \beta = \frac{7}{10}$;
 $\sin \beta = \frac{3}{10}$; $V = 0,023562$.

63. $r^2 = \frac{1}{2} (S^2 + s^2 - a^2) = 64$; h (wie in 62) $= \frac{3}{4} \sqrt{231}$;
 $V = \frac{1}{3} r^2 \pi h = 764$.

64. $\sqrt[3]{\frac{9 V^2 \pi}{\cos \alpha \cdot \sin \alpha^2}} = 140$.

65. $243,89 \square dm.$ 66. $\frac{\pi}{3} \cdot \frac{a^2 \sin \frac{1}{2} \alpha^2 \cdot \sin \frac{1}{2} \beta^2}{\sin \frac{1}{2} (\beta - \alpha)^2} = 36.$
67. $\frac{p\pi}{12 \cos \alpha \cdot \sin \alpha^2} \cdot (3d^2 \sin \alpha^2 - 6dp \sin \alpha + 4p^2) = 264.$
68. $h = \frac{p}{2\pi} \cotg \frac{1}{2} \alpha = 1,1789; s = \frac{p}{2\pi \sin \frac{1}{2} \alpha} = 9,0768;$
 $M = \frac{p^2}{4\pi \sin \frac{1}{2} \alpha} = 256,635;$
 $V = \frac{p^3}{24\pi^2} \cotg \frac{1}{2} \alpha = 100 (99,998).$
69. $\text{tang } \varphi = \frac{2 \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin (\beta - \alpha)}; \varphi = 59^\circ 52' 55'', 8;$
 $V = \frac{\pi}{3} \cdot a^3 \cdot \frac{\sin \alpha^2 \cdot \sin \varphi}{\sin (\varphi - \alpha)^2} = 66,9.$
70. $\text{tang } \varphi = \frac{2 \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin (\beta - \alpha)}; \varphi = 49^\circ 23' 46'', 0;$
 $V = \frac{\pi}{3} \cdot S^3 \cdot \frac{\sin \alpha^2 \cdot \sin (\varphi - \alpha)}{\sin \varphi^2} = 59,89.$
71. $\sin \beta = \frac{S \sin \varphi \sin \alpha}{a}, V = \frac{a^2 S \pi \sin (\varphi + \beta)}{12 \sin \alpha^2} = 76,852.$
72. $D = \frac{1}{4} V \pi = 94,91; b = \sqrt[3]{\frac{3V}{2 \cos \alpha^2 \sin \alpha}} = 9,1538.$
73. $V \pi \cdot \text{tang } \frac{1}{2} \alpha^2 \cdot \cotg \alpha = 400.$
74. $r^2 = \frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s} = \frac{225}{4};$
 $\frac{1}{3} r^2 d\pi \sin \delta = 8000,2.$
75. $\frac{\pi}{3} \cdot \frac{h^3 \text{tang } \frac{1}{2} \beta^2}{\sin \alpha^2} = 12.$
76. $\sin \varphi = \frac{t}{4r} \cdot \sin \alpha \pm \sin \frac{1}{2} \alpha \sqrt{1 + \frac{t^2}{4r^2} \cos \frac{1}{2} \alpha^2};$
 $V = \frac{1}{3} \pi r^2 t \sin \varphi.$
77. $2 R \pi : \sqrt{3 \cdot \sin \alpha^3} = 32,31.$
78. $2,6399 : 1,2255 : 5,9683 : 3,5810.$

§. 25.

1. $\alpha) 500; \beta) 0,02.$
2. $\sqrt{\frac{3V}{\pi h} - \frac{1}{4} R^2 - \frac{R}{2}} = 2.$
3. $3 V : \pi (R^2 + Rr + r^2) = 100.$
4. $\frac{\pi}{3} (R^2 + Rr + r^2) \cdot \sqrt{s^2 - (R - r)^2} = 263365.$

5. $\frac{1}{12} \pi h \cdot \left(\frac{3M^2}{s^2 \pi^2} - s^2 + h^2 \right) = 128,491.$
6. $\frac{1}{3} \frac{M^2}{s^2 \pi} \cdot \frac{p^2 + pq + q^2}{(p+q)^2} \cdot \sqrt{s^2 - \frac{M^2}{s^2 \pi^2} \cdot \frac{(p-q)^2}{(p+q)^2}} = 334.$
7. $\sqrt{\frac{3V}{\pi h(m^2 + mn + n^2)}} = A; r = n \cdot A; R = m \cdot A;$
 $\alpha) r = 6, R = 18; \beta) r = 4, R = 6.$
8. $R = \sqrt{\frac{V}{\pi h} - \frac{1}{12} d^2} + \frac{1}{2} d = 7;$
 $r = \sqrt{\frac{V}{\pi h} - \frac{1}{12} d^2} - \frac{1}{2} d = 5.$
9. $h = \frac{a^2 - b^2}{2b} = 264; s = \frac{a^2 + b^2}{2b} = 265;$
 $r = \sqrt{\frac{V}{\pi h} - \frac{1}{12} a^2} - \frac{a}{2} = 107;$
 $R = \sqrt{\frac{V}{\pi h} - \frac{1}{12} a^2} + \frac{a}{2} = 130;$
 $M = 2 s \pi \sqrt{\frac{V}{\pi h} - \frac{1}{12} a^2} = 197309.$
10. $S + s + 2(R - r) = 2\sigma;$
 $F = \sqrt{\sigma(\sigma - S)(\sigma - s)(\sigma - 2R + 2r)};$
 $h = F : (R - r) \text{ u. s. w. } \alpha) 95818; \beta) 3808450;$
 $\gamma) 6,21614.$
11. $F = 0,36; h = 0,8; R = 1,3; r = 0,85.$
12. $\frac{2h - 3e}{3e - h} = m; r = \sqrt{\frac{3V}{\pi h} : (m^2 + m + 1)} = 4; R = mr = 5.$
13. $\frac{g}{3} \cdot \sqrt{\frac{3g}{\pi}} \cdot (n + \sqrt{n} + 1) = 700.$
14. $M = \frac{1}{3} d^2 \pi; 1 : 1, V = \frac{1}{12} d^3 \pi (3\sqrt{3} - 1).$
15. Der Sector eines Kreisrings mit den Radien $\sigma = \frac{rs}{R-r} = 24;$
 $S = \frac{Rs}{R-r} = 30$ und dem Centriwinkel
 $\alpha = \frac{R-r}{s} \cdot 360^\circ = 300^\circ$, wenn $s = \sqrt{h^2 + (R-r)^2},$
 $h = 3V : \pi (R^2 + Rr + r^2)$ ist.
16. $\varphi = \sqrt{\frac{1}{2} (R^3 + r^3)} = 8,25483; x = \frac{\varphi - r}{R - r} \cdot h = 7,81159.$
17. $12 a^2 h q : [p \pi \sqrt{s^2 - \frac{1}{4} (D-d)^2} \cdot (D^2 + Dd + d^2)] = 100.$
18. $\frac{a}{2\pi} \cdot \left(\frac{U^2 + Uu + u^2}{6} - \frac{u^2}{\pi} \right) = 0,0678033 \text{ Cbm.}$

$$19. \frac{1}{2} h (R^2 + Rr + r^2) (\pi - 2) = 31,2343.$$

$$20. \frac{7\pi a^3 \sqrt{6}}{864}. \quad 21. \frac{V \sqrt{3}}{2\pi} = 20000. \quad 22. \frac{1}{4} V \pi = 71.$$

$$23. \frac{1}{12} \pi h (R - r)^2.$$

$$24. \frac{1}{3} \pi (R^2 + Rr + r^2 - 3x^2) \sqrt{s^2 - (R - r)^2} = 144.$$

$$25. 4 : 1. \quad 26. \frac{3(D^2 - d^2)l}{a^2 + ab + b^2} = 31\frac{5}{6}\frac{2}{3}.$$

$$27. r = \sqrt{\frac{V}{\pi h} - \frac{1}{12} d^2} - \frac{1}{2} d = 4; \quad \frac{rh}{d} = 8.$$

$$28. \frac{r^2 \pi h}{6} (3 - \sqrt{2}). \quad 29. \frac{1}{2} r (\sqrt{3} - 1) = 1.$$

$$30. \frac{1}{2} r (\sqrt{3} - 1) = 5;$$

$$\frac{r(\sqrt{3}+1)}{2} \cdot \pi \cdot \sqrt{4h^2 + \frac{2}{3}r^2(2 - \sqrt{3})} = 775,517.$$

$$31. x = \frac{a(\sqrt{3h(4p-h)}-h)}{4(h-3p)};$$

$$n\pi \{(\frac{1}{2}a+x)\sqrt{h^2 + (\frac{1}{2}a-x)^2} + 2px\}.$$

$$32. \frac{1}{24} c^2 \pi (7a + 17b) = 440000.$$

$$33. r \left(\sqrt{\frac{3n}{m} - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}} \right) = 2(\sqrt{205} - 1) = 26,6391; 4 : 1.$$

$$34. 0,0582913. \quad 35. 16 \text{ und } 4^m.$$

$$36. \frac{R^3 + 2R^2r + 2Rr^2 + r^3}{R^3 + r^3} = \frac{1}{2}. \quad 37. \frac{1}{3} r^3 \pi (3\sqrt{2} + 2) = 1000.$$

$$38. R = r \left(\frac{2}{3} \sqrt{3} + \frac{1}{2} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \sqrt{6} \right); \quad \varrho = \frac{1}{2} r (\sqrt{6} - \sqrt{2});$$

$$h = 2r \left(1 + \sqrt{\frac{2}{3}} \right); \quad s = r (\sqrt{6} + 2);$$

$$M = 2r^2 \pi (3 + \sqrt{2} + \frac{2}{3} \sqrt{3} + \sqrt{6});$$

$$V = \frac{2}{3} r^3 \pi (7 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \frac{2}{3} \sqrt{6}).$$

$$39. Gh - \sqrt{G\pi} \cdot h^2 \cotg \alpha + \frac{1}{3} \pi h^3 \cotg \alpha^2 = 3,5.$$

$$40. \frac{1}{2} \pi s \cdot \sin \alpha \cdot \left\{ \frac{M^2}{s^2 \pi^2} + \frac{1}{3} s^2 \cos \alpha^2 \right\} = 1000.$$

$$41. R = \sqrt{\frac{V}{\pi d} \cdot \cotg \alpha - \frac{1}{12} d^2} + \frac{1}{2} d = 6;$$

$$r = \sqrt{\frac{V}{\pi d} \cdot \cotg \alpha - \frac{1}{12} d^2} - \frac{1}{2} d = 2.$$

$$42. \frac{M \cdot \sin \alpha \cdot (p^2 + pq + q^2)}{3(p+q)} \cdot \sqrt{\frac{M \cos \alpha}{\pi(p^2 - q^2)}}; \quad \alpha) 400; \quad \beta) 357.$$

$$43. \frac{2}{3} \pi \cdot \frac{R^3 - r^3}{\cotg \alpha + \cotg \beta} = 800.$$

$$44. \tan \alpha = \frac{24 K \pi^2}{P^3 - p^3}; \alpha = 40^\circ.$$

$$45. \left(\frac{F^2}{c} + \frac{1}{12} c^3 \cotg \alpha^2 \right) \pi = 10000.$$

$$46. \sqrt[3]{\frac{3V}{7\pi} \cdot \cotg \frac{1}{2} \alpha^2} = 1.$$

$$47. \frac{m^2 (\cotg \frac{1}{2} \alpha^2 + 3 \cotg \frac{1}{2} \alpha + 3)}{n^2 \cotg \frac{1}{2} \alpha^2 + 3 m n \cotg \frac{1}{2} \alpha + 3 m^2} = \frac{1}{3}.$$

§. 26.

$$1. \alpha) 2000; \beta) 7650; \gamma) 2659750000 \text{ Cub.-Meilen.}$$

$$2. \sqrt[3]{3V : 4\pi}; \alpha) 5; \beta) 6; \gamma) 7.$$

$$3. \frac{1}{6} \sqrt[3]{O^3 : \pi}; 0,03352; 0,2681; 523,6.$$

$$4. 2 \sqrt[3]{4,5 \cdot V^2 \pi} = 555. \quad 5. \sqrt[3]{r_1^3 + r_2^3} = 5.$$

$$6. \sqrt[3]{O_1^3 + 2 O_1 O_2 \sqrt[3]{O_1 O_2} + O_2^3} = 36.$$

$$7. \frac{4}{3} \pi \sqrt[3]{\left(a^2 + \frac{u^2}{4\pi^2}\right)^3} = 3640.$$

$$8. 1,55514 \text{ Kgr.} \quad 9. 0^{dc}, 92638. \quad 10. 2,0348 \text{ Grm.}$$

$$11. r = \frac{1}{2} d = \sqrt[3]{\frac{3a(1-s)}{4\pi(s_1-1)}} = 4^{cm}, 265.$$

$$12. r(1 - \sqrt[3]{\frac{89}{74}}) = 0^{dc}, 0461.$$

$$13. \frac{1}{2} d \left(1 - \sqrt[3]{1 - \frac{s}{s_1}} \right) = 1^{dc}, 67325;$$

$$\text{Gewicht: } \frac{1}{6} \pi d^3 s = 1000 \text{ Kgr.}$$

$$14. 6a : d^3 s \pi = 2620. \quad 15. 0^{dc}, 25.$$

$$16. R - \sqrt[3]{R^3 - r^3 + (r-a)^3} = 3.$$

$$17. R = \sqrt{\frac{a}{4b\pi} - \frac{b^2}{12}} + \frac{b}{2} = 3; r = \sqrt{\frac{a}{4b\pi} - \frac{b^2}{12}} - \frac{b}{2} = 1.$$

$$18. \frac{\pi}{3d} (3\varrho^4 + d^4).$$

$$19. R : r = (\sqrt{6} \pm 2) : 2; O : o = (5 \pm 2\sqrt{6}) : 2;$$

$$V : v = (9\sqrt{6} \pm 22) : 4.$$

$$20. 4r^3(2 - \frac{1}{3}\pi) = 100. \quad 21. 1 : 2 : 3.$$

$$22. r \sqrt[3]{12}. \quad 23. 4 : 7; 2 : 9.$$

24. $\frac{1}{3} \sqrt{0 : \pi} = 1,13.$ 25. $3(2m - n) : 4n; 7 : 6.$
 26. $h \sqrt[3]{6K\pi^2} = 1,79.$ 27. $\frac{1}{3} r \sqrt[3]{3}.$
 28. $x^3 + 3bx^2 = 12a : \pi; x^3 + 15x^2 = 14000; x = 20.$
 29. $x^3 - 6ax^2 + 4a^3 = 0.$ Setze $x = z \cdot a;$
 $z^3 - 6z^2 = -4; z = y + 2; y^3 - 12y - 12 = 0;$
 y nahezu gleich $-1,1158; x = 3,537.$
 30. $r^3 \pi (\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \sqrt{2}) = 8.$ 31. $\frac{4}{3} \pi (r^2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}}.$
 32. $\frac{1}{3} O \sqrt{6} = 89.$ 33. $\frac{1}{12} d^2 s \pi (3h - d) = 225 \text{ Kgr.}$
 34. $\frac{1}{2} r \sqrt{2}.$ 35. $h + \frac{2a^3}{3d^2} = 2.$
 36. $O_1 : O_{11} = (m^2 + n^2)^2 : mn^2 (m + \sqrt{m^2 + n^2}) = 625 : 384;$
 $V_1 : V_{11} = (m^2 + n^2)^3 : 2m^2 n^4 = 15625 : 4608.$
 37. $r \sqrt[3]{4(n^2 - 1)} = 12.$ 38. $4 : 9.$
 39. $32 : 9.$ 40. $5929 : 780.$
 41. $\frac{4}{3} \pi \cdot \left[\frac{1}{h} \sqrt[3]{\frac{3V}{\pi h}} \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{3V}{\pi h}} + h^2 - \sqrt[3]{\frac{3V}{\pi h}} \right) \right]^3 = 3,22643.$
 42. $h = 24$ oder $8; r = \sqrt{12}$ oder $6.$
 43. $9 : 4 : 3; 18 : 8 : 3 \sqrt{2}.$ 44. $1 : 2.$
 45. $\frac{1}{3} \pi \cdot \left[(s^2 - h^2)h - \frac{4}{h^3} (s \cdot \sqrt{s^2 - h^2} - s^2 + h^2)^3 \right] = 19877.$
 46. $h^4 : h \left[h - \frac{2r}{h} (\sqrt{r^2 + h^2} - r) \right]^3 : 4r [\sqrt{r^2 + h^2} - r]^3 =$
 $1 : (9 - 4\sqrt{5}) : 2(\sqrt{5} - 2) = 1 : 0,0557281 : 0,4721359.$
 47. $\frac{2\pi}{3} \cdot \frac{r^2 h^3}{4r^2 + 3h^2}; 2 : 1.$
 48. $(2n - \sqrt{n^2 + 4}) : \sqrt{n^2 + 4}; 1 : 5; 11 : 13.$
 49. $r \sqrt[3]{15} = 15.$
 50. $\rho = r \sqrt[3]{\frac{4n}{m}}; h = \frac{m}{n} r \sqrt[3]{\frac{4n}{m}}; 4 : 1.$
 51. $n(2m + n) : 2(m + n)^2 = 33 : 98,$
 bzw. $m(2n + m) : 2(m + n)^2 = 20 : 49.$
 52. $\frac{2}{9} F \sqrt[3]{\frac{F}{3\pi}} = 32,2454;$
 $\frac{2}{3} F (5 - \sqrt{3}) = 2,17863 F = 27,3781.$

53. $2\sqrt{5} : 5, 2\sqrt{3} : 3.$

54. Sind R, h, s bezüglich die Längen des Radius, der Höhe und der Seitenlinie des Kegels, so ist $\varphi = \frac{h^2 R}{s(R+h)}$ und das gesuchte Verhältniss gleich $4Rh\sqrt{R^2 + h^2} : (R+h)^3.$

55. $4 : 1.$ 56. $h^3 - 2rh^2 + \frac{4}{n}r^3 = 0;$

$h^3 - 12h^2 + 243 = 0, h_1 = 9; h_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{117} + 3) = 6,90835.$

57. $\frac{1}{2}a(\sqrt{3} + 1) = 571.$ 58. $32(\sqrt{5} - 2) : 5.$

59. $\sqrt{\frac{h}{12} \cdot \frac{R^2 + Rr + r^2}{R+r} - \frac{(R+r)^2}{12}} = A;$

$x = \frac{R+r}{2} - A = 4; y = \frac{R+r}{2} + A = 6.$

60. $O = 4\pi^2; V = \frac{4}{3}\pi^2\sqrt{\pi}.$

61. $R_1 = \frac{1}{2}r(\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-3}) = 4;$

$R_2 = \frac{1}{2}r(\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-3}) = 1.$

62. $4 : 7.$

63. $\left. \begin{matrix} R \\ r \end{matrix} \right\} = \frac{1}{8}d\left(\sqrt{\frac{11+V_{105}}{2}} \pm \sqrt{\frac{31-3V_{105}}{2}}\right) = \begin{matrix} 2,71442 \\ 2,17463. \end{matrix}$

64. $\frac{1}{8}R^3\pi.$ 65. $(r^2 + 3a^2) : 3(r^2 - a^2) = 1 : 2.$

66. $5 : 2.$ 67. $r = \frac{3}{4}a\sqrt{2}.$

68. $\frac{a}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3(V_2+1)}{\pi}} = 5,0554.$

69. $6^{cm}, 4320; 1^{cm}, 9563.$ 70. $2,5632 \text{ Kgr}.$

71. $\frac{1}{108} : \frac{2}{81} : \frac{\sqrt{3}}{76}.$ 72. $1 : 1 : \sqrt{3}.$

73. $V = \frac{1}{8}a^3; \varphi = \frac{1}{12}a\sqrt{51}; O = \frac{1}{12}a^2\pi;$

$V_1 = \frac{1}{432}a^3\sqrt{51}.$

74. $9\sqrt{2} : \pi; \frac{2}{3}; \frac{3}{16}; \frac{65}{11}; \frac{36}{11}; \frac{55}{11}.$

75. $\frac{2}{16}V; \frac{3\sqrt{3}}{13\pi}V.$

76. $\frac{3}{16}V(9 + \sqrt{3}); \frac{3V}{26\pi}(9 + \sqrt{3}).$

77. Wie $\sqrt{3} : 1.$ Die Grundflächen der Cylinder theilen jedesmal die Diagonalaxe des Würfels in 3 gleiche Theile und berühren die Diagonalen der Würfelflächen.

78. $7 : 4$. 79. $\frac{1}{3} a \sqrt[3]{4 \sqrt{6}}$. 80. $3 : 1$.
 81. $(6 \sqrt{3} - 10) : 1$. 82. 2654,2.
 83. $r \sqrt[3]{\frac{3\pi+1}{2\pi}}$. 84. 8023.
 85. $\frac{1}{2} \left[\sqrt[3]{\frac{3}{4\pi}(ac+b)} \pm \sqrt{(ac+3b) : \sqrt[3]{48\pi^2(ac+b)}} \right] = 5; 4$.
 86. $\cos \alpha = 1 - F \sqrt[3]{2 : 9 V^2 \pi}; \alpha = 36^\circ;$
 $b = \sqrt[3]{6 V \pi^2} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} = 3,76991$.
 87. $\frac{1}{2} V \cdot \sin \alpha^2 \cdot \cos \frac{1}{2} \alpha^2 = 800$.
 88. $\sqrt[3]{\frac{1}{4}(R^3 - r^3) \tan \alpha} = 8,796$.
 89. $\frac{1}{4} s^3 \pi \cdot \sin \alpha = 1000; 3 : 2 \sin \alpha^2 = 1 : 0,47426$.
 90. $2r\pi : \sqrt[3]{\frac{1}{2} \sin \alpha^2 \cdot \cos \alpha} = 100$.
 91. $V = \frac{1}{6} a^3 \pi \left(\cotg \frac{180^\circ}{n} \right)^3 (\sqrt{m^2 + 1} - 1)^3 : m^3 = 4,0662 a^3;$
 $O = a^2 \pi (m^2 \cos \alpha^2 + 1)^2 : m^2 \sin 2 \alpha^2 = 67,635 a^2$.
 92. $\frac{1}{6} \pi c^3 \sqrt{(1 + \cos \alpha^2 \cdot \tan \beta^2)^3} = 42$.
 93. Die Seiten der Grundfläche sind gleich 40; 13; 37;
 der Inhalt derselben ist gleich 240, die ganze Oberfläche
 gleich 865,8; $V = 2395,5$.
 94. $\frac{1}{6} a^3 (1 + \tan \alpha) [\pi(1 + \tan \alpha)^2 - 6] = 500$.

§. 27.

1. $\frac{2}{3} \pi (\varrho^2 + h^2) (\sqrt{\varrho^2 + h^2} - h) = 353,96$.
 2. $\frac{1}{3} r^3 \pi; 1 : 4$. 3. $\frac{m^2}{n^2} V = 68,6$.
 4. $\frac{P^2}{12 \pi^2} (P \mp \sqrt{P^2 - p^2}); \frac{P^3}{30 \pi^2}$ oder $\frac{2 P^3}{15 \pi^2}$.
 5. $\frac{1}{3} \pi h^2 (3r - h); \alpha) 300; \beta) 400$.
 6. $\frac{V}{\pi h^2} + \frac{1}{3} h = 5$.
 7. $h^3 - 3r h^2 + \frac{3V}{\pi} = 0; h^3 - 6h^2 + 5 = 0; h = 1$.
 8. $\frac{1}{6} \pi h (3\varrho^2 + h^2) = 80$.
 9. $\frac{1}{3} \pi h^2 \left(\sqrt[3]{\frac{O}{\pi}} - h \right) = 20$.

10. $\frac{a^3 - 3ah^2 + 2h^3}{a^3} = 0,896.$
11. $\frac{1}{24\pi^2} \cdot [2b^3 + (2b^2 + a^2)\sqrt{b^2 - a^2}] = 52,7 \text{ Grm.}$
12. $\frac{2}{3} r^3 \pi \cdot 1,15 \text{ gr.} = 29,9 \text{ Kgr.}$
13. $\frac{1}{6} \pi \cdot \left[\left(\frac{O}{\pi} - a^2 \right) \sqrt{\frac{2O}{\pi} + a^2 + a^3} \right] = 2200,6; 5100,11.$
14. $h = \frac{3}{2} r = 9,50765; V = \frac{2}{3} r^3 \pi = 900.$
15. $\frac{1}{2} r (3 - \sqrt{5}).$ 16. $\sqrt[3]{\frac{8Vn^3}{4\pi(n-1)^2(n+2)}} = \sqrt[3]{\frac{3V}{2\pi}} = 7.$
17. $\frac{4}{3} r^3 \pi \cdot \frac{m^2(m+3n)}{(m+n)^3} = 435,63; \frac{4}{3} r^3 \pi \cdot \frac{n^2(3m+n)}{(m+n)^3} = 3753,18.$
18. $x^3 - 3r^2x + 2r^3 \cdot \frac{n-m}{n+m} = 0;$
 $x^3 - 3r^2x + \frac{1}{8} r^3 = 0; x_1 = \frac{1}{2} r.$
19. $d = \frac{1}{2} r; V = \frac{5}{24} r^3 \pi.$
20. $r = \sqrt[3]{\frac{O}{6\pi}} = 3; V = \frac{2}{3} r^3 \pi = 190,852.$
21. $r = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 6,5;$
 $\frac{1}{3} \pi (r - \frac{1}{2} a)^2 \cdot (2r + \frac{1}{2} a) = 379,61;$
 $\frac{1}{3} \pi (r + \frac{1}{2} a)^2 \cdot (2r - \frac{1}{2} a) = 770,74.$
22. $7 : 20.$ 23. $(43 - 24\sqrt{3}) : 11.$ 24. $(43 - 24\sqrt{3}) : 11.$
25. $\frac{4}{9} a^3 \sqrt{2} - \frac{2}{81} a^3 \pi (14\sqrt{6} - 27).$
26. $\frac{1}{2} r^3 \pi \sqrt{2}; \frac{1}{3} r^3 \pi \sqrt{2}$ und zweimal $\frac{1}{12} r^3 \pi (8 - 5\sqrt{2}).$
27. $\frac{1}{6} r (9 - \sqrt{33}).$
28. $\frac{4}{3} r^3 \pi \left(1 - \frac{n-m}{n} \sqrt{\frac{n-m}{n}} \right) = \frac{2}{3} \pi (8 - 3\sqrt{3}) = 39,639.$
29. $\frac{1}{3} h^2 \pi \left(3 \sqrt{\frac{O}{6\pi}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{2}} - h \right) = 20.$ 30. $\sqrt[3]{2,8} : 2.$
31. $\frac{1}{2} r (\sqrt{3} - 1).$ 32. $8 : (8 - 3\sqrt{3}).$ 33. $1^{ae}, 04.$
34. $V = \frac{1}{12} \pi \cdot [(a^2 + ab + b^2)c + (\frac{1}{2}b^2 + 2h^2)h] = 9550;$
 $O = \pi \cdot \left(\frac{b^2}{4} + h^2 + \frac{a+b}{2} \cdot \sqrt{c^2 + \frac{(a-b)^2}{4}} \right) = 1820,33.$
35. $(2a^3 - 3a^2r + r^3) : (2a^3 + 3a^2r - r^3) = 13 : 112.$

36. $r = \frac{V}{\pi h^2} + \frac{h}{3} = 3,19433$; $x = \frac{4r^3}{2rh - h^2} = 17,0362$;
 $s = \sqrt{x^2 + 2rh - h^2} = 17,2592$;
 $M = \sqrt{2rh - h^2} \cdot s\pi = 150$; (149,997).
37. $\frac{4}{3} r^3 \pi \cdot \frac{(p^2 - q^2)^2 \cdot (p^2 + 2q^2)}{p^6} = 9923$.
38. a) $\frac{r^2 \pi}{(p - q)^2} \sqrt{q(8p^3 - 32p^2q + 42pq^2 - 18q^3)}$
 $= \frac{2}{5} \pi \sqrt{30} = 47,798$; b) $2r^2 \pi \cdot \frac{2p - 3q}{p - q} = \frac{5}{8} \pi = 52,36$.
39. $r \cdot \frac{\sqrt{17} + 1}{4} = 4$. 40. $\frac{4R^3 r^2 \pi}{3(4R^2 + r^2)^3} (32R^4 + 12R^2 r^2 + r^4)$.
41. $9 : 25$. 42. $\frac{5}{12} r^3 \pi$; $5 : 16$. 43. $\frac{1}{3} r$.
44. $r - \sqrt[3]{r^3 - \frac{1}{4} h^2 (3r - h)} = \sqrt[3]{3}$.
45. $(2m + n - 3\sqrt[3]{m^2 n}) : 4n = 1 : 4$.
46. $x^3 - 3r^2 x + r^3 = 0$.
47. $r = (\frac{1}{4} d^2 + h^2) : 2h = 9,51175$; $x = r - h = 4,75585$;
 $R = \sqrt{(a + \frac{1}{2} d)^2 + x^2} = 11,9689$; $H = R - x = 7,2130$;
 $V = \frac{1}{3} \pi [H^2 (3R - H) - h^2 (3r - h)] = 1000$ (nahezu).
48. $r \sqrt{\frac{n-m}{n}} = \frac{r}{5} \sqrt{21}$.
49. $2r^3 \pi (66\sqrt{5} - 125) : 75 = V$; $\frac{4}{3} r^3 \sqrt{3} - V$.
50. $\frac{1}{3} \pi h \cdot [3r^2 - 3p^2 - h^2 + 3hp] = 0,42564$; $0,3$.
51. $\frac{1}{3} \pi (\sqrt{R^2 - q^2} + \sqrt{R^2 - r^2}) \cdot [R^2 + r^2 + q^2 + \sqrt{(R^2 - q^2)(R^2 - r^2)}]$;
 17507 und 44277 .
52. $\frac{1}{3} \pi h [3r^2 - h^2 + \frac{3}{2} (r^2 - q^2 - h^2)] = 285463$ und 142250 .
53. $(3r^2 - h^2) : 2h(3r - 2h) = 13 : 12$.
54. $\sqrt{r^2 - \frac{1}{12} h^2 - \frac{4r^3}{3\pi h} + \frac{1}{2} h} = \frac{1}{2} r$.
55. $h\pi(q^2 - \frac{1}{12} h^2)$; $(q^2 + \frac{1}{4} h^2) : h$.
56. $236 : 7$. 57. $a^3 = \frac{6}{125} r^3 \pi = 677,1$; $a = 8,7812$.
58. $\frac{3}{2} a^2 h \sqrt{3} + \frac{1}{3} m h (\frac{3}{4} a^2 + \frac{3}{2} a \sqrt{f} + f) +$
 $\frac{h\pi}{24} \cdot [3a^2(5 + 6n) - 2h^2(1 + 3n) + a \sqrt{9a^2 - 3h^2}]$.
59. Die Zweiecke $= \frac{1}{12} a^3 [1 + \pi (\sqrt{3} + 2)]$,
 die Abschnitte $= \frac{1}{2} a^3 [\pi(4 - \sqrt{3}) - 4]$.

60. $\frac{4}{3} r^3 \pi \cdot \sin \frac{1}{4} \alpha^2 = 3320$. 61. $\sqrt[3]{3V : 4\pi \cdot \sin \frac{1}{4} \alpha^2} = 10$.
 62. $V \cdot \sin \frac{1}{4} \alpha^2 = 19$. 63. $4 h^3 \pi \cdot \sin \frac{1}{4} \alpha^2 : 3 \cos \alpha^3 = 10$.
 64. $\sqrt{\frac{b}{4\pi \sin \frac{1}{4} \alpha^2} - \frac{1}{12} \alpha^2} - \frac{1}{2} \alpha = 30$. 65. $103^\circ 39' 15'', 6$.
 66. $\cos \varphi = \cos \frac{1}{2} \alpha^2$; $\varphi = 60^\circ$.
 67. 34962300 Kubik-Meilen.
 68. $\frac{1}{3} r^3 \pi \cdot (1 - \cos \frac{1}{2} \varphi)^2 \cdot (2 + \cos \frac{1}{2} \varphi) = 35$.
 69. $\cos \alpha^3 - 3 \cos \alpha = \frac{4V}{K} - 2 = -\frac{11}{8}$; $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, $\alpha = 60^\circ$.
 70. $137^\circ 3' 30''$; $\sqrt[3]{3} : 1$.
 71. $r^3 \pi (1 - \sin \frac{1}{4} \alpha)^2 : 3 \sin \frac{1}{4} \alpha = 48,9$.
 72. $\alpha = \frac{m}{m+n} \cdot 180^\circ$; $V = \frac{4}{3} r^3 \pi (1 + \cos \alpha - \cos \alpha^2)$
 $= \frac{5}{3} r^3 \pi = 4000$.
 73. $\frac{2}{3} r^3 \pi \cdot \sin \frac{1}{4} \alpha \cdot (3 - \sin \frac{1}{4} \alpha^2) = 510$.
 74. $\frac{1}{3} r^3 \pi \cdot [3 \cos \frac{1}{2} \beta - 3 \cos \frac{1}{2} \alpha - \cos \frac{1}{2} \beta^3 + \cos \frac{1}{2} \alpha^3] = 85$.
 75. $V_1 = V + \frac{1}{6} \pi h^3 \cdot \operatorname{cosec} \alpha^2 = 351,308$;
 $V_2 = V - \frac{1}{6} \pi h^3 (5 - \cotg \alpha^2)$
 $+ 2\pi h^2 \cotg \alpha \sqrt{\frac{V}{\pi h} - \frac{1}{12} h^2 \cotg \alpha^2} = 512,038$.
 76. $\frac{4}{3} h^3 \pi \sin \alpha^4 \tan \alpha^2$.

§. 28.

1. $\frac{2}{3} r^3 \alpha \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 43,8$. 2. $\sqrt[3]{\frac{3V}{2\alpha} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}} = 1$.
 3. $\frac{3V}{2r^3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 60^\circ$. 4. $\frac{r^3 \pi}{3} \cdot \frac{\alpha + \beta + \gamma - 180^\circ}{180^\circ} = 70,5$.
 5. $\frac{1}{3} r^3 \pi \cdot [\alpha + \beta + \gamma + \delta + \dots - (2n - 4)90^\circ] : 180^\circ$.
 6. $a^3 (\frac{1}{24} \sqrt{2} + \frac{1}{432} \pi \sqrt{6}) = 0,290500 a^3 = 2324$.
 7. $\frac{1}{3} Fr$. 8. $\frac{1}{64} r^3 \pi (65 \sqrt{3} - 108) = 0,084876 r^3 \pi$.
 9. $\sin \frac{1}{2} \alpha = m : n = 0,86$; $\alpha = 118^\circ 38'$; $1 : 6$.
 10. $\sin \frac{1}{2} \alpha = \sqrt[3]{\frac{m}{n}} = \frac{1}{2}$; $\alpha = 60^\circ$; $\sqrt[3]{\frac{m^3}{n^2}} : 1 = 1 : 4$.
 11. $\frac{2}{3} r^3 \sin \frac{1}{2} \alpha \cdot \beta \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 4990$.
 12. 1213,05. 13. 932680.

14. $\frac{1}{3} r^3 \pi \cdot [3 (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) - (\cos \alpha^3 + \cos \beta^3 + \cos \gamma^3) - 2] = 18,4.$
 15. $\frac{1}{3} a \pi \cdot [3 r^2 (\sin \alpha + \sin \beta) - a^2 (\sin \alpha^3 + \sin \beta^3)].$

§. 29.

2. $D_1 = -\frac{1}{8} h(a-b)^2$; $D_2 = \frac{1}{12} h(a-b)^2$; 4,15 und 2,07 M.
 3. $\frac{1}{3} h \cdot \left(\frac{a+a_1}{2} \cdot \frac{b+b_1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{a-a_1}{2} \cdot \frac{b-b_1}{2} \right)$;
 $\alpha) 1029$; $\beta) 0,022.$
 4. $h \cdot \left(\frac{a+a_1}{2} \cdot \frac{b+b_1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{a-a_1}{2} \cdot \frac{b-b_1}{2} \right)$; $\alpha) 560\frac{3}{4}$; $\beta) 54963.$
 5. $h \cdot \left[\left(\frac{a+a_1}{2} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{a-a_1}{2} \right)^2 \right]$; $\alpha) 148$; $\beta) 5244.$
 6. $h \cdot \left(\frac{a+a_1}{2} \cdot \frac{b+b_1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{a-a_1}{2} \cdot \frac{b-b_1}{2} \right)$; $\alpha) 1700$; $\beta) 68,04.$
 7. $O = 175,157$; $V = 149\frac{1}{4}.$ 9. $\frac{3}{4} a^2 h \sqrt{3}.$
 10. $\frac{a+b+c+d}{4} \cdot F.$ 12. $\frac{1}{3} h G \cdot \frac{m^2+mn+n^2}{m^2}.$
 13. $\frac{3F(\sqrt{m}+\sqrt{n})^2}{4(m+\sqrt{mn}+n)} = 18\frac{3}{4} \square^{cm}.$
 15. $\frac{1}{6} b(2a+c) \sqrt{a^2 - \frac{1}{4} b^2} = 2,53.$ 16. $\frac{3}{2} a^2 h \sqrt{3}.$
 17. $\frac{2}{3} a^2 \sqrt{b^2 - \frac{1}{4} a^2}.$ 18. $\frac{2}{3} abc$; $\frac{2}{3} a^3.$ 19. $\frac{1}{6} a^3 \sqrt{2}.$
 20. $\frac{1}{6} b h(a+c).$ 21. $\frac{1}{3} V.$ 22. $\frac{1}{8} a^3 \sqrt{2}.$
 23. $\frac{1}{3} a^2 h \sqrt{3} = 790.$ 24. $\frac{1}{3} a^2 h(2 + \sqrt{2}).$
 25. $\frac{1}{6} a^3(5 + 2\sqrt{5}) = \frac{1}{6} a^3 \cotg 18^{02}.$
 26. $\frac{1}{6} b h [4a + (3a^2 + b^2)(a^2 + b^2)^{-\frac{1}{2}}].$ 27. $\frac{5}{6} a^2 h.$
 28. a) $\frac{1}{12} a^2 h(5 + 2\sqrt{2})$; b) $\frac{1}{3} h(a^2 + b^2 + ab\sqrt{2}) = 500.$
 29. $\frac{5}{3} abh.$ 30. $\frac{1}{3} h[a^2 + ac + c^2 + b^2 + (2a+c)b\sqrt{2}] = 836.$
 31. $\frac{1}{4} ah(b+c+d) = 1080.$ 32. $\frac{1}{8} a^2 h \sqrt{3}.$
 33. $\frac{1}{3} \sqrt{3(a^2 + ab + \frac{3}{2} b^2)} \sqrt{c^2 - (a-b)^2}.$
 34. $\pi h \left[\left(\frac{r+r_1}{2} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{r-r_1}{2} \right)^2 \right] = 4047.$
 35. $2r\sqrt{\pi}$; $2r\sqrt{1 + \frac{1}{2}\pi}.$
 36. $\frac{1}{3} h^2 \pi(3r-h)$; $\frac{1}{3} h \pi(3\rho^2 + h^2).$
 37. $\frac{1}{2} h \pi(\rho_1^2 + \rho_2^2) + \frac{1}{6} h^3 \pi.$ 38. $\frac{1}{3} h \pi(r^2 + 2R^2).$

39. $\frac{2}{3} r^2 s$. 40. Zweimal $\frac{2}{3} r^2 h$ und $r^2 h(\pi - \frac{4}{3})$.
 41. $\frac{1}{2} h \cdot [(3ab + 3a'b' + 2ab' + 2a'b) \sin \alpha + (3cd + 3c'd' + 2cd' + 2c'd) \sin \beta] = 382289$. Nein; es können zwei Seiten des einen Vierecks aus den beiden anderen und den durch das zweite Viereck bestimmten Winkeln berechnet werden.
 42. $\frac{1}{12} b^2 \cdot \tan \beta \cdot (3a + b \cotg \frac{1}{2} \alpha) = 5000$.

§. 30.

1. $O = a^2 \sqrt{3} \pi = 54,6525$; $V = \frac{1}{4} a^3 \pi = 25$.
 2. $O = a \pi (a \sqrt{3} + 6b) = 74,7633$;
 $V = \frac{1}{4} a^2 \pi (a + 2b \sqrt{3}) = 20$.
 4. $O = \pi [a(b_1 + c_1) + b(c_1 + a_1) + c(a_1 + b_1)]$;
 $V = \frac{1}{3} \pi (a_1 + b_1 + c_1) \cdot [p(c_1 - a_1) + q(c_1 - b_1)]$;
 a) $a = \sqrt{(b_1 - c_1)^2 + p^2}$; $b = \sqrt{(c_1 - a_1)^2 + q^2}$;
 $c = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (p + q)^2}$; b) $p = \sqrt{a^2 - (b_1 - c_1)^2}$;
 $q = \sqrt{b^2 - (c_1 - a_1)^2}$; $c = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (p + q)^2}$;
 c) $F = \frac{1}{2} p(c_1 - a_1) - \frac{1}{2} q(b_1 - c_1)$;
 $V = \frac{2}{3} (a_1 + b_1 + c_1) \pi F$. Bei zu einer Seite paralleler
 Axe ist $O = \pi [(a + b)(a_1 + c_1) + 2a_1 c]$;
 $V = \frac{1}{3} \pi (2a_1 + c_1)(c_1 - a_1)(p + q)$, und für $a_1 = 0$
 ist $O = \pi(a + b) \cdot c_1$; $V = \frac{1}{3} \pi c_1^2 (p + q)$.
 5. $\frac{a+b}{c} : \frac{a+c}{b} : \frac{b+c}{a} ; \frac{1}{c} : \frac{1}{b} : \frac{1}{a}$. 6. $2a\pi \cdot F = 2000$.
 7. $\frac{4ab\pi(a+b)}{\sqrt{a^2+b^2}} = 7461,7$; $\frac{2a^2b^2\pi}{\sqrt{a^2+b^2}} = 38219$.
 8. $a^3\pi = 800$. 9. $\frac{7}{12} a^3\pi\sqrt{3} = 77$.
 10. $\frac{a^3\pi}{2} \cdot \frac{2m^2 + 3mn + 2n^2}{(m+n)\sqrt{m^2 + mn + n^2}}$.
 11. $\frac{1}{6} a^3\pi(4 + 3\sqrt{2})\sqrt{2 + \sqrt{2}}$; $\frac{1}{12} a^3\pi(15 + 11\sqrt{2})$.
 12. $O = \frac{1}{4} a^2\pi$; $V = \frac{1}{8} a^3\pi\sqrt{3}$; Ja!
 13. $O = \frac{5}{2} a^2\pi\sqrt{2}$; $V = \frac{1}{2} a^3\pi\sqrt{2}$.
 14. $7a^2\pi$; $a^2\pi$; $\frac{3}{2} a^3\pi\sqrt{3}$. 16. Vergl. 4 c.
 17. $\sqrt[3]{m} : (\sqrt[3]{m} - \sqrt[3]{n}) = 1 : 1$.
 18. $O = 6a^2\pi\sqrt{3}$; $V = \frac{3}{2} a^3\pi$.

19. $O = \pi \sqrt{c^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2} \cdot (a^2 + b^2 + ac + bc) : c;$
 $V = \frac{1}{4} \pi (a^2 + ab + b^2) (c^2 - \frac{1}{4}[a-b]^2) : c.$
20. $(2n - m) : (2m - n) = 5 : 2.$
21. $\frac{1}{4} a^3 \pi (7 - 4\sqrt{2}) = 10.$
22. $\frac{1}{3} \pi \cdot a^2 b^2 \sin \gamma^2 : \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma} = 40,384.$
23. $O = \frac{a^2 \pi \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma \cdot \cos \frac{1}{2}(\beta - \gamma)}{\sin \alpha \cdot \cos \frac{1}{2}(\beta + \gamma)} = 9,0456;$
 $V = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{a^3 \sin \beta^2 \sin \gamma^2}{\sin \alpha^2} = 1,527.$
24. $O = \pi c \sin \alpha (c + 2b + \sqrt{(a-b)^2 - 2(a-b)c \cos \alpha + c^2}) = 6,648;$
 $V = \frac{1}{3} \pi c^2 \cdot \sin \alpha^2 \cdot (a + 2b) = 0,72.$
25. $q = \frac{a \sin \beta \sin \gamma}{\sin \alpha} - e; x = \frac{e}{\sin \beta}, y = \frac{ae}{e + e}, z = \frac{e}{\sin \gamma};$
 $O = q \pi (x + 2y + z) = 3,5665;$
 $V = \frac{1}{3} q^2 \pi (a + 2y) = 0,7015.$
26. $O = 2 a^2 \pi \sqrt{3} \cdot \sin (30^\circ + \alpha) = 275,85;$
 $V = \frac{1}{3} a^3 \pi \cdot \sin (30^\circ + \alpha) = 250,02.$
27. $\frac{4\pi}{3} (1 + \cos \alpha^2) \sqrt{\frac{F^3}{\sin 2\alpha}} = 6328,7.$
28. $O = \frac{ab\pi \sin \gamma}{2m} (2a + b + 3c) = 42922;$
 $V = \frac{a^2 b^2 \pi \sin \gamma^2}{2m} = 339520.$
29. $r = a \cdot \sin (\alpha + \gamma - \delta) = 2,00167;$
 $q = b \cdot \sin (\alpha - \delta) = 1,00166;$
 $O = \pi [(a + c) r + (b + c) q] = 984,96;$
 $V = \frac{1}{3} \pi (r + q) ab \cdot \sin \gamma = 355,77.$
30. $2F \cdot d\pi.$ 31. $2U \cdot d\pi.$ 32. $2ar^2\pi^2; 4ar\pi^2.$
33. $O = 2r^2\pi \cdot (2 \sin \frac{1}{2} \alpha + \cos \frac{1}{2} \alpha) = 147,92;$
 $V = \frac{4}{3} r^3 \pi \cdot \sin \frac{1}{2} \alpha = 80.$
34. $O = 4r^2\pi \cdot \sin \frac{1}{2} \alpha (1 + \cos \frac{1}{2} \alpha);$
 $V = \frac{4}{3} r^3 \pi \cdot \sin \frac{1}{2} \alpha^3.$ Für $\alpha = 180^\circ$ ist $O = 4r^2\pi,$
 $V = \frac{4}{3} r^3 \pi;$ für $\alpha = 90^\circ$ ist $O = 2r^2\pi (\sqrt{2} + 1),$
 $V = \frac{1}{3} r^3 \pi \sqrt{2};$ für $\alpha = 60^\circ$ ist $O = r^2\pi (2 + \sqrt{3}),$
 $V = \frac{1}{6} r^3 \pi.$
35. $O = s\pi \cos \alpha \cdot (2r + \sqrt{4r^2 - s^2});$
 $V = \frac{s^3 \pi}{6} \cos \alpha.$

$$36. \frac{1}{3} a^3 \pi^2.$$

$$37. \frac{r^3 \pi}{3} \sin \alpha^2; \frac{4 r^3 \pi}{3} \sin \frac{1}{2} \alpha^4; \frac{2 r^3 \pi}{3} \sin \frac{1}{2} \alpha^2 \tan \frac{1}{2} \alpha^2;$$

$$\alpha = 90^\circ; 1 : 1 : 4.$$

§. 31.

1. Der grösste hat den durch jenen Punkt gehenden Durchmesser, der kleinste die auf letzterem senkrechte Sehne zur Grundlinie.

2. Man ziehe diejenigen Sehnen von der gegebenen Länge, welche zu dem Neigungsschenkel senkrecht sind, und lege durch sie die Schnitte.

3. Er ist ein regelmässiges Sechseck und halbirt den Abstand der beiden parallelen Oktaëderflächen.

4. Er ist ein regelmässiges Sechseck und halbirt den Abstand der beiden parallelen Schnittflächen.

5. Er ist ein Quadrat, und seine Eckpunkte halbiren vier Kanten des Tetraëders.

6. Seine Grundfläche ist ein Quadrat.

7. Der Radius der Grundfläche des Kegels ist gleich r , die Seitenlinie gleich $3r$; Grundfläche und Mantel theilen sich also in die gegebene Oberfläche im Verhältniss $1 : 3$.

$$8. \frac{2}{3} r a^3 \pi \sqrt{3}.$$

9. Die Höhe des Cylinders ist gleich dem Durchmesser seiner Grundfläche, der Axenschnitt also ein Quadrat. $r = \sqrt{O : 6 \pi}$.

$$10. \text{Wie vorher. } r = \sqrt[3]{V : 2 \pi}.$$

11. Der Radius des Grundkreises ist gleich $\frac{1}{3} r \sqrt{6}$, die Höhe gleich $\frac{2}{3} r \sqrt{3}$. Durchmesser des Grundkreises und Höhe verhalten sich also wie Diagonale und Seite eines Quadrats. Das dem Cylinder einbeschriebene gerade quadratische Prisma ist ein Würfel.

$$12. r^3.$$

$$13. r = \frac{1}{3} d \sqrt{6}, h = \frac{1}{3} d \sqrt{3}, V = \frac{1}{18} d^3 \pi \sqrt{3}.$$

14. Die Höhe des Kegels ist gleich $\frac{4}{3} r$, sein Schwerpunkt fällt also mit demjenigen der Kugel zusammen.

15. $\frac{3}{4} r^3$; ($a = h$). 16. $\varphi = \frac{1}{3} r$.

17. Er hat den grössten Mantel, aber nicht die grösste Gesamt-Oberfläche.

18. Die Höhe des Kegels, welcher den kleinsten Mantel hat, ist gleich dem Durchmesser einer Kugel von gleichem Rauminhalt. Es verhalten sich die Quadrate des Radius, der Höhe und der Seitenlinie des Kegels wie 1 : 2 : 3.

19. $\sqrt[3]{2V} = 2$; $\sqrt[3]{\frac{1}{4}V} = 1$.

20. $x = y = \sqrt{V:h} = 3^{cm}$; $40 \left(\frac{V}{h} + 2 \sqrt{Vh} \right)$ Pf. = 18 M.

21. Das kleinste Volumen hat ein Kegel, dessen Höhe gleich dem doppelten Durchmesser der Kugel ist. Der Durchmesser seiner Grundfläche verhält sich zur Höhe, wie die Seite eines Quadrats zu seiner Diagonale. Das Volumen des Kegels ist doppelt so gross als das der Kugel. Derselbe Kegel hat die kleinste Gesamt-Oberfläche; dagegen ist für denjenigen, welcher den kleinsten Mantel hat, die Höhe gleich $r \cdot (2 + \sqrt{2})$.

22. $h = \frac{2}{3} r = \frac{1}{3} a \sqrt{6}$.

23. Der Radius der Grundfläche ist gleich $\frac{2}{3} r$, die Höhe gleich $2h$, der Rauminhalt das $4\frac{1}{3}$ fache des Volumens des gegebenen Kegels.

24. Der gesuchte Punkt schneidet von demjenigen Punkte aus, welcher die Spitze des entstehenden Kegels wird, $\frac{2}{3}$ der Hypotenuse ab.

25. a) Wie vorher. b) Ist die als Drehungsaxe dienende Kathete gleich a , die andere gleich b , so ist der Radius der Grundfläche des Cylinders gleich $\frac{ab}{2(a-b)}$, und es muss $b < \frac{1}{2} a$ sein.

26. Die Grundfläche ist gleich $\frac{4}{9}$ der Fläche des in die Kegelbasis einbeschriebenen regelmässigen Sechsecks, die Tiefe gleich $\frac{1}{3}$ der Kegelhöhe.

27. Die Centrallinie wird durch den Punkt im Verhältniss $R\sqrt{R} : r\sqrt{r}$ getheilt.

28. $\alpha = 360^\circ \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = 293^\circ 56' 24''$.

29. Die Höhe der Calotte ist gleich der Hälfte der Höhe der Pyramide.

§. 32.

11. Wie 1 : 2 und 1 : 1. Die Umfänge sind beide Male gleich $3a\sqrt{2}$, die Flächeninhalte bezüglich gleich $\frac{1}{2}a^2\sqrt{3}$ und $\frac{1}{2}a^2\sqrt{3}$.

12. Bezeichnet a die Länge einer jeden der längeren, b die der kürzeren Seite, c die von der anderen halbirte, d die halbirende Diagonale, sodass also $d = \sqrt{a^2 - \frac{1}{4}c^2} + \sqrt{b^2 - \frac{1}{4}c^2}$ ist, so sind die durch die Oktaeder-Ecken gehenden Axen gleich $c\sqrt{2} + 2\sqrt{a^2 - \frac{1}{4}c^2}$, die durch die Würfel-Ecken gehenden gleich $2 \cdot (c\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{b^2 - \frac{1}{4}c^2})$, die durch die übrigen Ecken gehenden gleich $2c$. Für die Kantenwinkel zwischen den Seiten a ist $\sin \frac{1}{2}\alpha = c : 2a$, für diejenigen zwischen den Seiten b ist $\sin \frac{1}{2}\gamma = c : 2b$, für die übrigen $\beta = 90^\circ - \frac{1}{2}(\alpha + \gamma)$. Für die Flächenwinkel an b ist $\sin \frac{1}{2}\varphi = f : 2b \sin \gamma$, für die Flächenwinkel an a ist $\sin \frac{1}{2}\psi = c\sqrt{2} : 2a \sin \alpha$. Die Oberfläche ist gleich $12cd$, das Volumen gleich $\frac{8c^2d}{\sqrt{4a^2 - c^2}} (\frac{1}{2}c\sqrt{2} + \sqrt{a^2 - \frac{1}{4}c^2})$.

$$13. (a + b)(c + d - 2h) \cdot h.$$

$$14. O = ab\pi = 180\pi; V = \frac{1}{12}\pi(b - 2c)^2(3a - b - 4c) \\ = \frac{15529}{48}\pi.$$

$$15. 4ab^2 - b^3\sqrt{2}. \quad 16. 9ab^2\sqrt{3}.$$

17. a) Eine gerade quadratische Doppelpyramide (ein quadratisches Oktaeder), deren Randkanten gleich a , deren Seitenkanten gleich $\frac{1}{2}a\sqrt{3}$ sind, und deren Spitzen die Entfernung a von einander haben. $O = 2a^2\sqrt{2}$; $V = \frac{1}{3}a^3$.

b) Ein von zwölf Rhomben begrenzter Körper (ein regelmässiges Rhombendodekaeder); seine Kanten sind gleich $\frac{1}{2}a\sqrt{3}$, die längeren Diagonalen der Rhomben gleich $\frac{1}{2}a\sqrt{2}$, die kürzeren gleich $\frac{1}{2}a$; $O = \frac{3}{2}a^2\sqrt{2}$; $V = \frac{1}{4}a^3$.

18. Eine doppelte abgestumpfte Pyramide, deren Endflächen Quadrate mit bezüglich den Seiten a und $2a$, und deren Seitenflächen Trapeze mit den parallelen Seiten a und $2a$ und der Höhe a sind. Für den gemeinschaftlichen Körper ist $O = 14a^2$, $V = \frac{7}{3}a^3\sqrt{3}$, für das Kreuz $O = 2a(3a\sqrt{3} - 7a^2 + 6b)$, $V = a^2\sqrt{3}(3b - \frac{7}{3}a)$.

19. Ein gerades Prisma, dessen Grundfläche ein Quadrat mit der Seite $a\sqrt{3}$, und dessen Höhe gleich a ist, und zwei auf die Grundflächen aufgesetzte gerade Pyramiden, deren Höhen einzeln gleich $\frac{1}{2}a$ sind. Für den gemeinschaftlichen Körper ist $O = 8a^2\sqrt{3}$, $V = 4a^3$, für das Kreuz $O = 2a(6b - a\sqrt{3})$, $V = a^2(3b\sqrt{3} - 4a)$.

20. Ein gerades, quadratisches Prisma, auf dessen Grundflächen congruente gerade Pyramiden aufstehen. Die Höhe des Prismas ist gleich $\frac{1}{2}e$, seine Grundkante gleich $\frac{1}{2}d$, die Höhe einer Pyramide gleich $\frac{1}{4}e$, jede Seitenkante derselben gleich $\frac{1}{4}\sqrt{e^2 + d^2}$; $O = d \cdot e + \frac{1}{2}d \cdot \sqrt{e^2 + d^2}$; $V = \frac{1}{6}d^2e$. Für $d = e\sqrt{3}$ übereinstimmend mit 19.

21. a) Der Körper besteht aus zwei symmetrischen dreiseitigen Pyramiden, welche eine Seitenfläche gemeinsam haben; die Grundflächen sind gleichseitige Dreiecke mit der Seite a , die nicht gemeinschaftliche Seitenkante steht jedesmal senkrecht zur Grundfläche und ist gleich $\frac{1}{2}a\sqrt{3}$; $O = \frac{3}{2}a^2\sqrt{3}$; $V = \frac{1}{4}a^3$.

b) Eine gerade vierseitige Pyramide, deren Grundfläche ein Quadrat mit der Kante a , und deren Höhe gleich der Höhe der Grundflächen der Prismen ist. $O = 3a^2$; $V = \frac{1}{6}a^3\sqrt{3}$.

$$22. O = 16r^2; V = \frac{1}{6}r^3.$$

$$23. \frac{1}{2}Op. \left(\sqrt[n]{\frac{3m}{n}} - 1 \right) : \left(\sqrt[n]{\frac{3m}{n}} + 1 \right) = \frac{1}{6}Op.$$

$$24. \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{R^2 r^2}{R + r}.$$

$$25. \frac{\pi q^2(a-q)^2}{3a}; \frac{\pi}{3} \left[\frac{r^3}{q} \sqrt{a^2 - q^2} - \frac{q^2}{a}(a+q)^2 \right];$$

$$q \sqrt{\frac{r^3 \sqrt{32q^6 + r^6} - 8q^6 - r^6}{2(4q^6 - r^6)}}.$$

$$26. (26 - 15\sqrt{3}) : 1 = 0,0194 : 1 \text{ oder nahezu wie } 97 : 5000.$$

$$27. \text{a) Ebenso, b) } 1 : 8.$$

$$28. O = 12a^2(2 - \sqrt{2}); V = 2a^3(2 - \sqrt{2}).$$

$$29. O = \frac{3}{2}a^2(3 + 2\sqrt{6}); V = \frac{3}{2}a^3.$$

$$30. O = 3a^2(2 + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}); V = \frac{1}{2}a^3(\sqrt{2} - 1).$$

$$31. \frac{1}{12}a^3 \cdot (4\sqrt{2} - 1).$$